

XIII Simpósio da Pós-graduação XII Seminário de Iniciação Científica PIBIC/CNPq da FAMEMA VII Simpósio da REPRINTE

“Formação profissional, cuidado à saúde
e o envelhecimento populacional”

LIVRO DE RESUMOS

27 28 29
novembro

2024

Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA
Diretoria de Pós-graduação

XIII Simpósio de Pós-graduação da FAMEMA,
XII Seminário de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq da FAMEMAe
VII Simpósio da Rede de Programas Interdisciplinares em Envelhecimento (REPRINTE)

"Formação profissional, cuidado à saúde e o envelhecimento populacional"

27 a 29 de novembro de 2024
Local: Associação Paulista de Medicina (APM)
Marília-SP

Livro de resumos

Marília
Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA
2024

REALIZAÇÃO

O XIII Simpósio de Pós-graduação, XII Seminário de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq da FAMEMA e VII Simpósio da Rede de Programas Interdisciplinares em Envelhecimento (REPRINTE). São eventos de natureza científica realizados pelos Programas de Pós-graduação em Ensino em Saúde - Mestrado Profissional em Saúde e Envelhecimento – Mestrado Acadêmico, em conjunto com o Comitê Institucional do PIBIC/CNPq da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília.

S612L Simpósio de Pós-graduação (13. : 2024 : Marília, SP).
Livro de resumos do XIII Simpósio de Pós-graduação da FAMEMA, XII Seminário de Iniciação Científica PIBIC/CNPQ da FAMEMA e VII Simpósio da REPRINTE [recurso eletrônico] : Formação profissional, cuidado à saúde e o envelhecimento populacional, 27 a 29 de novembro de 2024 / Organizado por Vanessa Casagrande...et al. – Marília : Faculdade de Medicina de Marília, 2024.
4,1 Mb.

ISBN: 978-65-88632-12-3

1. Pesquisa. 2. Publicações científicas e técnicas. 3. Resumo de reunião. I. Vanessa Casagrande. II. Anapaula Massinatori Peres. III. Osni Lázaro Pinheiro.

APOIO

Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA
Diretoria de Pós-graduação da FAMEMA
Rede de Programas Interdisciplinares em Envelhecimento (REPRINTE)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes
Associação Paulista de Medicina de Marília – APM



COMISSÃO ORGANIZADORA

Diretor de Pós-graduação da FAMEMA e Coordenador Institucional de Iniciação Científica da FAMEMA

Prof. Dr. Osni Lázaro Pinheiro

Assistente Técnico da Diretoria de Pós-graduação da FAMEMA

Dra. Vanessa Casagrande

Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde - Mestrado Profissional da FAMEMA (PPGES)

Profa. Dra. Luzmarina Aparecida Doretto Bracciali

Profa. Dra. Magali Aparecida Alves de Moraes

Coordenação do Programa de Pós-graduação em Saúde e Envelhecimento - Mestrado Acadêmico da FAMEMA (PPGSE)

Profa. Dra. Maria Angélica Spadella

Prof. Dr. Agnaldo Bruno Chies

Assistente Técnico da Coordenação de Pós-graduação *Stricto Sensu* da FAMEMA

Mestre Anapaula Massinatori Peres

Coordenador do Comitê Institucional PIBIC/CNPq da FAMEMA

Prof. Dr. Agnaldo Bruno Chies

Membros da Pós-graduação da FAMEMA

Prof. Dr. Antônio Carlos Siqueira Júnior

Prof. Dr. Edson Luís Maistro

Prof. Dra. Elza de Fátima Ribeiro Higa

Profa. Dra. Danielle Abdel Massih Pio

Prof. Dra. Ieda Francischetti

Prof. Dra. Luciamáre Perinetti Alves Martins

Prof. Dr. Pedro Marco Karan

Profa. Dra. Sílvia Franco da Rocha Tonhom

Profa. Dra. Teresa Prado da Silva

Discente Suellen de Oliveira Suez - PPGES

Discente Sophiade Castro Bremer - PPSE

Secretaria de Pós-graduação

Ana Claudia Stabolito Barbieri (secretária)

Ester Sumie Souza Lima (secretária)

Iraci de Fátima da Silva Martinez (secretária)

Maria Neusa Pegorari Molaro (secretrária)



2024



Programação

27 DE NOVEMBRO SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

18h30: Palestra - Desafios da Iniciação Científica.

Palestrante: Prof. Dr. Agnaldo Bruno Chies – FAMEMA

Moderador: Profa. Dra. Joana Maira Valentini Zacarias Santim

19h00 – 21h00: Apresentação Oral dos Trabalhos de Iniciação Científica - Bolsistas PIBIC/CNPq

21h00 – 22h00: Coffee-break científico com apresentação de pôsteres dos trabalhos de Iniciação Científica – Ensino Médio (Bolsistas PIBIC-EM)

28 DE NOVEMBRO 8:00 ABERTURA OFICIAL DO EVENTO

Diretor Geral da FAMEMA: Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz

Vice-Diretora da FAMEMA: Profa. Dra. Haydée Maria Moreira

Superintendente do HCFamema: Dr. Tarcísio Adilson Ribeiro Machado

Diretor de Pós-graduação da FAMEMA: Prof. Dr. Osni Lázaro Pinheiro

Diretor de Graduação da FAMEMA: Prof. Dr. Carlos Alberto Lazarini

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Saúde e Envelhecimento da FAMEMA: Profa. Dra. Maria Angélica Spadella

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde da FAMEMA: Profa. Dra. Luzmarina Aparecida Doretto Bracciali

Presidente do Comitê Institucional PIBIC/CNPq da FAMEMA: Prof. Dr. Agnaldo Bruno Chies

Presidente da REPRINTE: Profa. Dra. Adriana Machado Saldiba de Lima



2024



Programação

28 DE NOVEMBRO 9:00 CONFERÊNCIA DE ABERTURA

9h00 – 09h50: Palestra - Envelhecimento, intergeracionalidade e a sociedade contemporânea

Palestrante: Prof. Dr. José Luís Sepúlveda Ferriz – Universidade Católica de Salvador– vídeo transmissão

Moderador: Profa. Dra. Maria Angélica Spadella

9h:50 – 10h:30: Colóquio

10h30 – 11h20: Palestra - A arte do convívio das gerações no meio acadêmico: impactos no ensino, na pesquisa e na assistência à saúde.

Palestrante: Prof. Dr. Hugo Tourinho Filho – USP/Ribeirão Preto

Moderador: Profa. Dra. Adriana Machado Saldiba de Lima

11h20-12h00: Colóquio

12h00 – 13h00: Coffee-break científico e Apresentação de pôsteres

28 DE NOVEMBRO MESA REDONDA: PRODUTOS EDUCACIONAIS (14H00 – 16H30)

14h00 – 14h50: Palestra 1 - Produtos educacionais em Saúde para a população que envelhece: da concepção ao uso.

Palestrante: Profa. Dra. Almira Alves dos Santos – Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL)

14h50 – 15h40: Palestra 2 - Proteção intelectual de produtos educacionais em saúde: como e por quê?

Palestrante: Profa. Dra. Paula dos Passos Menezes – Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Moderador: Profa. Dra. Ieda Francischetti

15h40 – 16h30: Colóquio

RELATO DE EXPERIÊNCIA (16H:30 – 17H00)

16:30 - 17:00: Relato - As possibilidades da gamificação para educação em saúde com a população idosa

Palestrante: Profa. Me. Juliana Ribeiro da Silva Vernasque – Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

Moderador: Profa. Dra. Maria José Sanches Marin

12h00 – 13h00: Coffee-break científico e Apresentação de pôsteres

18:15 - 19:30: Assembleia da REPRINTE*

***SOMENTE para Professores e Estudantes dos Programas integrantes da REPRINTE**



2024



Programação

29 DE NOVEMBRO

MESA REDONDA: VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA (8H00 – 10H00)

8h00 – 8h50: Palestra 1 - Organização dos serviços para a assistência à saúde frente à vulnerabilidade da pessoa idosa

Palestrante: Profa. Dra. Patrícia Krieger Grossi – PUC/RS – vídeo transmissão

8h50 – 9h40: Palestra 2 - Desafios da formação interdisciplinar para o cuidado da pessoa idosa

Palestrante: Profa. Dra. Maria Liz Cunha de Oliveira – Universidade Católica de Brasília (UCB) e Programa de Mestrado Profissional da FEPECS-DF

Moderador: Profa. Dra. Marta Ferreira Bastos

09:40 – 10h:00: Colóquio

RELATOS DE EXPERIÊNCIA (10H00 - 11H00)

10h:00 – 10h30: Relato 1 - Idosos em situação de rua

Palestrante: Profa. Me. Aline Pereira de Souza – Egressa do PPG em Saúde e Envelhecimento (Famema)

10h:30 – 11h00: Relato 2 - Efeitos da Dança Sênior® em pessoas idosas com e sem declínio cognitivo.

Palestrante: Profa. Me. Giovana Xavier Pinto Piazzentin– Egressa do PPG em Saúde e Envelhecimento (FAMEMA)

Moderador: Profa. Dra. Joyce Fernanda Soares Albino Ghezzi

11h00 – 12h00: Coffee-break científico e Apresentação de pôsteres

14h00 – 15h00: Palestra - O futuro da "Ciência Aberta": ponto de vista de um editor de revista científica.

Palestrante: Prof. Dr. Antônio de Pádua Python Cyrino - Universidade Estadual Paulista, (UNESP). Editor Chefe da Revista Interface: Comunicação, Saúde e Educação.

Moderador: Prof. Dr. Eduardo Federighi Baisi Chagas

15h00 – 15h30: Colóquio

15h30 – 17h30: Coffee-break científico, Apresentação dos Pôsteres e Encerramento

15h30 – 17h00: Coffee-Break Científico e Apresentação dos Pôsteres

17h00 – 17h:30: Premiação do melhor trabalho PIBIC/CNPq e PIBIC-EM (vigência 2023/2024)

17H30 - ENCERRAMENTO DO EVENTO

Sumário

RESUMOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR (PIBIC/CNPq - Ensino Médio)..... 18

01 - AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EMULSÕES A BASE DE CURCUMINA SUBMETIDAS À LUZ ULTRAVIOLETA..... 18

02 - AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO INTERIOR PAULISTA 19

03 - CARACTERÍSTICAS PLAQUETÁRIAS DE PACIENTES PORTADORES DE LEISHMANIOSE VISCERAL, MORADORES DO CENTRO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 20

04 - FACES DO ENVELHECIMENTO: PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS SOBRE A PESSOA IDOSA 21

RESUMOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC/CNPq)..... 22

05 – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO DURANTE INFECÇÃO POR COVID-19: UMA SÉRIE DE CASOS RETROSPECTIVOS 22

06 - ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA DISPERSÃO DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - SP, NO PERÍODO DE 2000 - 2020..... 23

07 - ASSOCIAÇÃO ENTRE EVENTOS DE TROMBOSE VENOSA E A PREVALÊNCIA DO POLIMORFISMO RS4343 DO GENE DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA 24

08 - CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE GERIATRIA: ANTES E APÓS A PANDEMIA DE COVID-19..... 25

09 - DOENÇA RENAL DO DIABETES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EM MARÍLIA/SP: EVOLUÇÃO TEMPORAL, INDICADORES E FATORES ASSOCIADOS 26

10 - EFEITOS DA EPIDIDIMITE INDUZIDA POR LIPOSSACARÍDEO NA MORFOLOGIA DO EPIDÍDIMO EM DIFERENTES TEMPOS PÓS-INDUÇÃO 27

11 - USO DE SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS E/OU MINERAIS: POTENCIALIDADES E RISCOS 28

RESUMOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA..... 29

12 - A CONTRADIÇÃO ENTRE A LEI ANTIDROGAS E A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE: A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ESTÁ ENCARCERANDO OS PRINCÍPIOS DO SUS?..... 29

13 - A EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA NO AMBIENTE PRÉ-HOSPITALAR ATRAVÉS DO USO DE MÍDIAS DIGITAIS 30

14 - A INFLUÊNCIA DA SAÚDE MENTAL MATERNA DURANTE O PUERPÉRIO NA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ 31

15 - A RESPOSTA IMUNOLÓGICA: UMA REVISÃO ATUALIZADA DA LITERATURA	32
16 - ABORTAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DA SOCIEDADE	33
17 - ADOECIMENTO PSÍQUICO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA PRISIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.....	34
18 - ALERGIA ALIMENTAR ASSOCIADA À INTRODUÇÃO DOS ALIMENTOS NOS LACTENTES	35
19 - ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS E MORFOMÉTRICAS NAS VESÍCULAS SEMINAIS DE RATOS NA FASE AGUDA DA ARTRITE POR ADJUVANTE (AIA)	36
21 - ANÁLISE DA ABORDAGEM DOS CUIDADOS PALIATIVOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA EM SÃO PAULO	38
22 - ANÁLISE DOS DISCURSOS SOBRE A ESCOLHA PELA PROFISSÃO DE PRIMEIRANISTAS DO CURSO DE MEDICINA DE UMA FACULDADE PÚBLICA PAULISTA	39
23 - ATITUDES E CRENÇAS DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA SOBRE DOR LOMBAR – UM PROJETO DE PESQUISA..	40
24 - ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DA CORRENTE SANGUÍNEA RELACIONADA A CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UTI PEDIÁTRICA E NEONATAL	41
25 - ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO E DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM RECÉM-NASCIDOS NO PRONTO SOCORRO	42
26 - AUTOIMAGEM E AUTOCUIDADO EM RELAÇÃO A OSTOMIAS INTESTINAIS E O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	43
27 - AVALIAÇÃO DAS VIAS DE SENSIBILIZAÇÃO SUBCUTÂNEA E INTRANASAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO ANIMAL PARA ASMA ALÉRGICA	44
28 - AVALIAÇÃO DO USO DE ADJUVANTES NA MELHORA DA RESPOSTA IMUNE FRENTE A ALÉRGENOS	45
29 - CANABIDIOL E SEUS EFEITOS SOBRE ANSIEDADE E DEPRESSÃO: REVISÃO LITERÁRIA	46
30 - CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE PRIMEIROS SOCORROS REALIZADAS NO AMBIENTE ESCOLAR	47
31 - CITOMEGALOVÍRUS NA GESTAÇÃO/PARTO/PUERPÉRIO: CONSEQUÊNCIAS PARA O RECÉM-NASCIDO E LACTENTE E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO – UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	48
32 - COMPARAÇÃO ENTRE INTERNAÇÕES DE MENINGITE VIRAL NO ESTADO DE SÃO PAULO E NA CIDADE DE MARÍLIA, ENTRE OS ANOS DE 2019 A 2024	49

33 - COMPREENDENDO O TERRITÓRIO COMO PRODUTOR DE SAÚDE	50
34 - COMPREENDENDO OS EFEITOS DO FORMOTEROL NA PRESSÃO ARTERIAL: PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA	51
35 - COMPREENSÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DAS MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO CICLO GRAVÍDICO PUERPERAL	52
36 - CONCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS DE MÃES E FAMILIARES SOBRE CUIDADO CENTRADO NA FAMÍLIA NA UNIDADE NEONATAL: ABORDAGEM QUALITATIVA	53
37 - CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA SOBRE NEUROFISIOLOGIA DA DOR - UM PROJETO DE PESQUISA	54
38 - CONHECIMENTO DOS PACIENTES EM RELAÇÃO À TERAPÊUTICA ANTICOAGULANTE ORAL E ADESÃO AO TRATAMENTO	55
39 - CONHECIMENTO DE MULHERES SOBRE A MENOPAUSA E O CLIMATÉRIO E SEUS SINTOMAS RELACIONADO A ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E ESTADO MENOPAUSAL: ANÁLISE QUANTITATIVA POR MEIO DE INQUÉRITO POPULACIONAL DE MULHERES NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA	56
40- CONTRIBUIÇÕES DE UMA LIGA ACADÊMICA DE CUIDADOS PALIATIVOS EM FACULDADE DE MEDICINA NO INTERIOR PAULISTA.	57
41 - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E RASTREIO DE AVALIAÇÕES DE PRONTIDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO FÍSICO DE ATLETAS: ANÁLISE POR SEXO	58
42 - DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA PARA ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE	59
43 - DIGNIDADE E INCLUSÃO NO CUIDADO À SAÚDE PARA PESSOAS IDOSAS PRIVADAS DE LIBERDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	60
44 - DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E PRINCIPAIS FATORES DE RISCO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.....	61
45 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRÁTICA TERAPÊUTICA PARA IDOSOS NA MICROREGIÃO DE ADAMANTINA.....	62
46 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PRÁTICA DE ENFERMEIROS NA PROMOÇÃO DA AMAMENTAÇÃO: REVISÃO INTEGRATIVA.....	63
47 - EFEITOS DO LASER Nd:YAG 1064nm DE PICOSEGUNDOS NO REJUVENESCIMENTO CUTÂNEO, UMA AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA	64
48 - EFEITOS DO TRATAMENTO COM <i>CURCUMA LONGA</i> SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL E ESTRESSE OXIDATIVO RELACIONADOS À ARTRITE INDUZIDA POR ADJUVANTE.....	65
49 - ELABORAÇÃO DE CARTILHA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS.....	66
50 - ESCOLHA PROFISSIONAL PELA CARREIRA MÉDICA: UM OLHAR SOB DISCURSOS DE DISCENTES DO PRIMEIRO ANO DE UMA FACULDADE PÚBLICA DO INTERIOR PAULISTA	67

51 - EXPERIÊNCIA E PRÁTICA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM VIVÊNCIA DO LUTO PERINATAL: UMA REVISÃO DE ESCOPO.....	68
52 - FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA FUMAR EM ADULTOS BRASILEIROS: VIGITEL 2019-2023.....	69
53 - FATORES DE RISCO E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO PARA ACIDENTES DOMÉSTICOS EVITÁVEIS NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA: REVISÃO DE LITERATURA.....	70
54 - FATORES QUE LEVAM A PROCURA INADEQUADA DE ATENDIMENTOS NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA INFANTIL: REVISÃO DA LITERATURA	71
55 - HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL DE UMA EQUIPE DE SAÚDE DE UMA UNIDADE INTENSIVA ADULTA.....	72
56 - <i>HELICOBACTER PYLORI</i> : UMA ANÁLISE SOBRE A INFLUÊNCIA DOS POLIMORFISMOS DAS REGIÕES S, C, D, M E I DO GENE VACA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER GÁSTRICO	73
57 - HIPERCOLESTEROLEMIA: ENVOLVIMENTO DO EXTRATO DE ARROZ VERMELHO FERMENTADO (RED YEAST RICE) NA DIMINUIÇÃO DOS NÍVEIS DE COLESTEROL SANGUÍNEO COMPARADOS ÀS ESTATINAS	74
58 - HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS: UMA REFLEXÃO SOBRE OS AGRAVOS E A HOSPITALIZAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DAS DOENÇAS.....	75
59 - IMPACTOS BIOPSISSOCIAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA.....	76
60 - IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 EM UMA ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS.....	77
61 - INCIDÊNCIA DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL EM PACIENTES TABAGISTAS MAIORES DE 60 ANOS.....	78
62 - INFLUÊNCIA DO USO DA RIVASTIGMINA NO ESTRESSE OXIDATIVO CAUSADO PELA CEPA QM2 DE <i>TRYPANOSOMA CRUZI</i>	79
63 - INSATISFAÇÃO CORPORAL NO CICLO GRAVÍDICO PUERPERAL E A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO: REVISÃO INTEGRATIVA.....	80
64 - INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM NEONATOLOGIA: REVISÃO DA LITERATURA	81
65 - JOGOS EDUCATIVOS VOLTADOS PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA.....	82
66 - METACOGNIÇÃO NA EDUCAÇÃO MÉDICA	83
67 - MIASTENIA GRAVIS: MÉTODOS DE TRATAMENTO E A MEDICINA PERSONALIZADA	84
68 - NEAR MISS NEONATAL: DEFINIÇÕES, PROBLEMÁTICAS E RELEVÂNCIA NA SAÚDE NEONATAL	85

69 - O ENFERMEIRO E O BRINQUEDO TERAPÊUTICO PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS DE TRÊS A CINCO ANOS: REVISÃO INTEGRATIVA.	86
70 - O USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA.....	87
71 - OBSTÁCULOS ENFRENTADOS PELAS MÃES NO ÂMBITO DA SAÚDE OCUPACIONAL EM SEUS ESFORÇOS PARA PROMOVEREM A AMAMENTAÇÃO MATERNA ENQUANTO OCUPAM UM EMPREGO FORMAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	88
72 - PANORAMA DO CONHECIMENTO E INTERESSE DOS PROFISSIONAIS E ACADÊMICOS DA SAÚDE NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	89
73 - PAPEL DA INTERLEUCINA-6 E FATOR DE NECROSE TUMORAL- α NAS ALTERAÇÕES INFLAMATÓRIAS DO PVAT PROMOVIDAS PELA ARTRITE	90
74 - PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS DE ESTUDANTES DE MEDICINA E ENFERMAGEM COM CIGARROS ELETRÔNICOS.....	91
75 - PERFIL DAS IMUNOGLOBULINAS NAS DIFERENTES FASES DO LEITE HUMANO: COLOSTRO, LEITE DE TRANSIÇÃO E LEITE MADURO	92
76 - PERFIL DE CITOCINAS NAS DIFERENTES FASES DO LEITE HUMANO: COLOSTRO, LEITE DE TRANSIÇÃO E LEITE MADURO	93
77 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE EM UMA CIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO.....	94
78 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS EM UMA ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER: PERCEPÇÃO DOS PACIENTES	95
79 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DURANTE O PARTO.....	96
80 - PREVALÊNCIA DO USO DE E-CIGS ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE.....	97
81 - RASTREIO DE AVALIAÇÕES DE PRONTIDÃO FÍSICA E PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE ATLETAS MASTER BRASILEIROS	98
82 - SABER CUIDAR: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO APLICATIVO PARA PREVENIR A VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA.....	99
83 - SÍFILIS GESTACIONAL NO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE IX DO ESTADO DE SÃO PAULO ENTRE 2014 E 2023: ESTUDO DE CASO-CONTROLE.....	100
84 - TENDÊNCIA TEMPORAL E ESPACIAL DA SÍFILIS GESTACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS: ESTUDO ECOLÓGICO MISTO.....	101
85 - TRATAMENTO DA SÍFILIS GESTACIONAL: A VISÃO DAS MÃES DE CRIANÇAS COM SÍFILIS CONGÊNITA.....	102

86 - TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL E TRANSTORNO ALCOÓLICO FETAL E ATUAÇÃO DE ENFERMEIROS..	103
87 - UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE PERSONALIDADE MYERS – BRIGGS (MBTI) EM NÍVEL SUPERIOR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.	104
88 - VERIFICAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO EFEITO WARBURG NA EVOLUÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS.....	105
RESUMOS DO XIII SIMPÓSIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FAMEMA e VII SIMPÓSIO DA REPRINTE	106
89 - A ATUAÇÃO DE RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE MENTAL NO SERVIÇO DE ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA EM UM HOSPITAL GERAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	106
90 - A CURCUMINA COMO ADJUVANTE NO TRATAMENTO OU PREVENÇÃO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS AO ENVELHECIMENTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	107
91 - A EXPERIÊNCIA DO HOMEM CONTEMPORÂNEO COM A CONSTRUÇÃO DA PATERNIDADE.....	108
92 - A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO NA (RE)INTEGRAÇÃO DA PESSOA IDOSA NO COTIDIANO.....	109
93 - A PESSOA IDOSA E A CRIAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS COM ANIMAIS DOMÉSTICOS.....	110
94 - A PRODUÇÃO INTELECTUAL FEMINISTA REVISITADA POR MULHERES: DIÁLOGOS LITERÁRIOS INTERGERACIONAIS NO CÍRCULO DE CULTURA.....	111
95 - A RELAÇÃO ENTRE O USO EXCESSIVO DE TELAS E O DESENVOLVIMENTO DE ANSIEDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA.....	112
96 - ACOLHIMENTO NA PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.....	113
97 - ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL PARA A LÍNGUA PORTUGUESA DE UM QUESTIONÁRIO SOBRE ANTIBIOTICOTERAPIA E RESISTÊNCIA BACTERIANA.....	114
98 - ANÁLISE DA CITOGENOTOXICIDADE DE FORMULAÇÃO À BASE DE N TOSILINDOL EM CÉLULAS HUMANAS	115
99 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	116
100 - ANÁLISE DO CONHECIMENTO E AUTOCUIDADO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 MAIORES DE 60 ANOS	117
101 - ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOS: UMA ABORDAGEM ENTRE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	118
102 - AS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DOS TESTES GENÉTICOS PREDITIVOS NA PERSPECTIVA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	119

103 - ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO AMBIENTE HOSPITALAR: PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DE UNIDADE PEDIÁTRICA.....	120
104 - ATITUDES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO.....	121
105 - ATIVIDADE FÍSICA, QUALIDADE DO SONO E VARIABILIDADE GLICÊMICA EM CRIANÇAS COM DIABETES TIPO 1: UM ESTUDO TRANSVERSAL	122
106 - ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO INTERIOR DE SÃO PAULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	123
107 - AUMENTO DE CONHECIMENTO DE GESTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE AO USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO PARA QUALIFICAÇÃO SOBRE O USO DA AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL	124
108 - AVALIAÇÃO DAS REPERCUSSÕES DO EFEITO WARBURG DURANTE A EVOLUÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS.....	125
109 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA IDOSOS COM DIABETESMELLITUS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO.....	126
110 - AVANÇOS CIENTÍFICOS NO CONTEXTO DA COVID-19: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA DA UFSCAR	127
111 - CENTRO DIA DO IDOSO E EDUCAÇÃO PERMANENTE: ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS EM EQUIPE.....	128
112 - COMPORTAMENTO DA GLICEMIA AO LONGO DE 12 SEMANAS DE EXERCÍCIO EM IDOSOS COM DIABETES TIPO 2: COMPARAÇÃO ENTRE TREINAMENTO RESISTIDO E COMBINADO	129
113 - COMPREENSÃO DOS ESTUDANTES DO INTERNATO DE MEDICINA SOBRE PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE	130
114 - CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS BASAIS E ESPECIES REATIVAS DE OXIGENIO NA PROTEÇÃO DA BARREIRA HEMATO-EPIDIDIMÁRIA EM ANIMAIS SUBMETIDOS À RESTRIÇÃO PROTEICA MATERNA	131
115 - CUIDADOS PALIATIVOS: PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA TERAPIA INTENSIVA	132
116 - DESFECHOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES, ECONÔMICOS E SOCIAIS DE PESSOAS IDOSAS NA TELERREABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	133
117 - DIETA COM BAIXA INGESTÃO DE IODO – MANUAL DE ALIMENTOS	134
118 - DISFAGIA EM IDOSOS: COMPREENSÃO E PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	135

119 - DO SERTÃO AO ASFALTO: A FORÇA DA RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE NA TRAJETÓRIA DO ENVELHECER DE MIGRANTES NORDESTINOS	136
120 – EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DE ENDOCRINOLOGISTAS PEDIÁTRICOS NOS PRIMEIROS DOIS ANOS DE DIABETES TIPO 1 – CUIDANDO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL.....	137
121 - EFEITOS DO TREINAMENTO MULTIMODAL E DA SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D NA FUNÇÃO MUSCULAR EM MULHERES IDOSAS COM BAIXA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA: ESTUDO RANDOMIZADO, DUPLO-CEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, DE 12 SEMANAS, COM ACOMPANHAMENTO DE 6 MESES	138
122 – EFETIVIDADE DO TRATAMENTO ATIVO DIRECIONADO VERSUS CUIDADO PALIATIVO EM PACIENTES COM CANCER TERMINAL: REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE	139
123 - EFICÁCIA DA CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO NA PREVENÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM QUADROS RESPIRATÓRIOS HIPOXÊMICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	140
124 - ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE E-BOOK INTERATIVO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE ANTIBIOGRAMAS VISANDO PRESCRIÇÃO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS	141
125 - ENVELHECIMENTO E MERCADO DE TRABALHO: ESTIGMAS, DIFICULDADES E POTENCIALIDADES NA ERA DA TECNOLOGIA	142
126 - ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE TRIAGEM E DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO EM IDOSOS	143
127 - ESTUDO RETROSPECTIVO DO PROCESSO DE ADOECIMENTO/ACIDENTES DE PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DA ÁREA HOSPITALAR	144
128 - ESTUDO SOBRE DELIRIUM EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: ANÁLISE DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS	145
129 - EXERCÍCIO FÍSICO ASSOCIADO A CORREÇÃO DA DIETA PROMOVE MELHORA DOS PARÂMETROS ESPERMÁTICOS EM CAMUNDONGOS OBESOS.....	146
130 - EXPRESSÃO DE GENES DO CICLO CELULAR E MARK4 EM AMOSTRAS DE CÉREBRO DE PACIENTES COM DOENÇA DE ALZHEIMER E CONTROLES.....	147
131 - FORTALECIMENTO DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA: INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL	148
132 - GRUPO OPERATIVO COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA IDOSOS DIABÉTICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA .	149

133 - IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS IDOSAS QUE RECEBEM VISITAS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA.....	150
134 - IMPACTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NA QUALIDADE DE VIDA, AUTOCUIDADO E SAÚDE MENTAL DE PESSOAS IDOSAS: UM ESTUDO DESCRITIVO.....	151
135 - IMPACTO DA SOLIDÃO NA SAÚDE FÍSICA, COGNITIVA E EMOCIONAL DA PESSOA IDOSA	152
136 - IMPLEMENTAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA TRIAGEM REUMATOLÓGICA: OTIMIZAÇÃO E VALIDAÇÃO CLÍNICA	153
137 - INCIDÊNCIA DA DENGUE DE ACORDO COM AS FAIXAS ETÁRIAS NA REGIÃO DE SAÚDE DE ASSIS-SP– NO PERÍODO DE 2014 A 2024	154
138 - INCIDÊNCIA DE HOSPITALIZAÇÕES POR DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS DA REDE REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE X: UMA ANÁLISE DE DEZ ANOS	155
139 - INCORPORAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: PERSPECTIVA DE PROFISSIONAIS.....	156
140 – INFLUÊNCIA DA DIETA HIPERLIPÍDICA E DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE O SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA PRESENTE NO TECIDO ADIPOSEO	157
141 - INFLUÊNCIA DA RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE NA ADEÇÃO À TERAPIA ANTIRRETROVIRAL	158
142 - INTERVENÇÕES VOLTADAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO DE ESCOPO	159
143 - LEGALIZAÇÃO DO TESTAMENTO VITAL NO BRASIL COMO GARANTIA DA DIGNIDADE E AUTONOMIA DA VONTADE DA PESSOA IDOSA: PROJETO DE PESQUISA	160
144 - MULHERES 40+ E TRANSIÇÃO DE CARREIRA: REVISÃO DE LITERATURA	161
145 - MULHERES 60+ E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: A INVISIBILIDADE, O ENVELHECIMENTO E OS DESAFIOS DE INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO.....	162
146 - NECESSIDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO DOMICILIAR.....	163
147 - O CUIDADO AO COMPORTAMENTO SUICIDA DE HOMOSSEXUAIS EM SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA.....	164
148 - O ESTRESSE OCUPACIONAL EM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA	165
149 - O MEDO DO MOVIMENTO ESTÁ ASSOCIADO AO MEDO DE CAIR EM PESSOAS IDOSAS COM DOR CRÔNICA MUSCULOESQUELÉTICA	166
150 - O TEMPO COMO DEMARCAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PRÓPRIA VIDA NO ENVELHECER.....	167

151 - OS EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA NO EEG NO AUTISMO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	168
152 - PAPEL DOS RECEPTORES DE MINERALOCORTICOIDES NAS ALTERAÇÕES DO TECIDO ADIPOSEO PERIVASCULAR EM RATOS ACOMETIDOS PELA ARTRITE	169
153 - PERCEPÇÃO DAS MULHERES SOBRE OS EFEITOS COLATERAIS DA BRAQUITERAPIA NO TRATAMENTO DO CÂNCER GINECOLÓGICO	170
154 - PERCEPÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES SOBRE A SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS: CONTRIBUIÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	171
155 - PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SOBRE O PROGRAMA AGITA ASSIS: UMA FERRAMENTA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE.....	172
156 - PERCEPÇÃO DOS PACIENTES SOBRE O PRÉ-OPERATÓRIO ...	173
157 - PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE INSERIDOS NO CONTEXTO HOSPITALAR SOBRE O MANEJO DA DOR	174
158 - PERSPECTIVA DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM E DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS SOBRE MÉTODO ATIVO DE ENSINO-APRENDIZAGEM	175
159 - PLANEJAMENTO PARA APOSENTADORIA DE TRABALHADORES TRANSGÊNERO: REVISÃO DE LITERATURA	176
160 - POLIFARMÁCIA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UM ESTUDO DESCRITIVO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NO INTERIOR PAULISTA	177
161 - PRODUTOS DE GLICAÇÃO AVANÇADA EM PESSOAS IDOSAS COM DOENÇAS CRÔNICAS QUE FREQUENTAM CENTRO DE CONVIVÊNCIA	178
162 - PROFICIÊNCIA DE PESSOAS IDOSAS COMUNITÁRIAS SOBRE O USO DE SMARTPHONES	179
163 - PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NO CAPS AD: RELATOS DA COMPREENSÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CUIDADO	180
164 - RELACIONAMENTO SORODIFERENTE: PERCEPÇÃO DE ESTIGMAS SOCIAIS NO ENVELHECIMENTO DO PARCEIRO SORONEGATIVO.....	181
165 - RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A COLETA DE DADOS REFERENTE À ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE	182
166 - REPERCUSSÕES DO PROJETO ASAS DO FUTURO PARA A APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO MOTOR DOS ESTUDANTES NA PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES	183
167 - REQUALIFICAÇÃO DE DEMANDA DE PSICOLOGIA EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA.....	184
168 - RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE ENTRE OS ENTES FEDERADOS: PROPOSTA DE SOLUÇÃO	

SISTEMÁTICA A PARTIR DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.....	185
169 - RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS IDOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	186
170 - REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA E A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE A ALTA HOSPITALAR RESPONSÁVEL	187
171 - SATISFAÇÃO DE GESTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) FRENTE AO USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO PARA QUALIFICAÇÃO SOBRE O USO DA AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL	188
172 - SEXUALIDADE NA MULHER IDOSA: DEFINIÇÕES, PARADIGMAS E TABUS.....	189
173 - UMA PERSPECTIVA RACIAL DO ENVELHECIMENTO	190
174 - VALIDAÇÃO DA ESCALA PARA AVALIAÇÃO DA AUTOPERCEPÇÃO DO ENVELHECIMENTO	191

RESUMOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR (PIBIC/CNPq - Ensino Médio)

01 - AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EMULSÕES A BASE DE CURCUMINA SUBMETIDAS À LUZ ULTRAVIOLETA

Santos, E.V.A.N.¹; Andrade, B. A. S. S. R.¹; Casagrande, V.²; Chies, A. B.²

1. Escola Estadual Vereador Sebastião Mônico

2. Faculdade de Medicina de Marília

emillyalvesnevesantos@gmail.com

INTRODUÇÃO: Os efeitos nocivos devido ao aumento da exposição às radiações ultravioleta em decorrência da diminuição da camada de ozônio podem ocasionar lesões na pele, a aceleração dos processos relacionados ao fotoenvelhecimento e até o desencadeamento do câncer. Estes efeitos podem ser inibidos pelo uso de formulações tópicas composta por substâncias com propriedades antioxidantes e fotoprotetoras. Para que essas formulações possam ser comercializadas, no entanto, é preciso assegurar que suas propriedades antioxidantes sejam mantidas quando expostas à radiação ultravioleta. **OBJETIVO:** Avaliar a atividade antioxidante de emulsões O/A do tipo Pickering a base de curcumina, e detectar eventuais modificações dessa atividade decorrentes da exposição a essa luz ultravioleta B (UVB). **MÉTODO:** As emulsões, após preparadas, foram espalhadas em placas de petri e expostas à uma sessão única de irradiação por luz UVB de 2,98 J/cm², emitida por uma lâmpada fluorescente posicionada à uma distância de 15 cm. Decorrido 30, 60, 180 e 360 minutos do início da exposição, uma alíquota da emulsão foi retirada e foi avaliada a atividade antioxidante por meio do método de sequestro do radical 2,2- difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). **RESULTADOS:** Todas as formulações apresentaram atividade antioxidante superior a 30%. **CONCLUSÃO:** A atividade antioxidante das emulsões não foi modificada com a exposição à luz UVB, sugerindo que o sistema de solubilização da curcumina manteve as suas propriedades antioxidantes.

Agradecimento: O presente projeto foi desenvolvido com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio da concessão de bolsa de iniciação científica (PIBIC- EM). Processo nº 145791/2023-8.

02 - AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO INTERIOR PAULISTA

MOSQUETT, S.A.S.¹; MACIEL, M.P.²; JANUARIO, S.C.V.²; CAPUTO, G.D.²; BARBOSA, D.³; TONHOM, S.F.R.⁴; REZENDE, M.S.⁵; TAKEDA, E.⁴

1 Estudante bolsista do PIBIC Ensino Médio

2 Professoras da Escola Estadual Vereador Sebastião Mônaco

3 Estudante de Nutrição

4 Docentes da FAMEMA

5 Nutricionista da FAMEMA

sarahsantana89247531@gmail.com

INTRODUÇÃO: Adolescentes de uma maneira geral não se alimentam adequadamente, frequentemente ingerem alimentos muito calóricos, com excesso de gorduras e açúcares, são sedentários, estressados, possuem hábitos e estilo de vida que propiciam o aparecimento de obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis como diabetes e hipertensão. **OBJETIVO:** Avaliar o estado nutricional de estudantes de uma escola pública do interior paulista. **MÉTODO:** Trata-se de pesquisa não experimental, transversal, descritiva, com enfoque quantitativo realizada em uma escola estadual do interior paulista com 134 escolares que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa por meio de uma “Feira de saúde”, momento em que se aplicou o instrumento de coleta de dados elaborado e adaptado de Brasil (2015) e de Brasil (2019). Excluiu-se os escolares que não compareceram no dia da coleta, os que não aceitaram participar ou que não realizaram todas as coletas. **RESULTADOS:** Participaram do estudo 134 estudantes do Ensino Médio, (55,2%) eram homens, e (43,3%) mulheres; 35,8% brancos, (34,3%) pardos, (20,9%) negro e (9%) amarelo; 16,4% da segunda série C; 15,7% da segunda série A; (38,8%) tinham 15 anos; 91%, jantam; 89,6% almoçam e 55,2% tomam café da manhã; (61,2%) lancham a tarde; (28,4%) lancham de manhã; 9% ceiam; 23,9% comeram feijão no dia anterior; 59% consomem verduras/legumes; 64,9% não comem frutas; 23,9% consomem frutas; 84,3% consomem bebidas adoçadas, 76,9% consomem biscoitos recheados/doces e 69,4% consomem hambúrguer/salgadinhos. **CONCLUSÃO:** Pode se afirmar que a dieta desses estudantes tem um elevado consumo de alimentos ultraprocessados como hambúrguer, embutidos, bebidas adoçadas e doces, enquanto o consumo de frutas e feijão foi relativamente baixo. O consumo de verduras e legumes foi mais alto do que o de frutas, mas ainda há espaço para melhorias. Esses dados ajudam a identificar áreas para intervenção nutricional, como incentivar o consumo de frutas, feijão e a redução de alimentos ultraprocessados.

Agradecimento: O presente projeto foi desenvolvido com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio da concessão de bolsa de iniciação científica (PIBIC- EM). Processo nº 139448/2023-3.

03 -CARACTERÍSTICAS PLAQUETÁRIAS DE PACIENTES PORTADORES DE LEISHMANIOSE VISCERAL, MORADORES DO CENTRO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

SILVA, G.P.¹; JANUARIO, S. C. V.¹; SUZUKI, R. B.²; MARTINS, L. P. A.³

1. Escola Estadual Vereador Sebastião Mônaco

2. Universidade de Marília

3. Faculdade de Medicina de Marília

00001106357450sp@al.educacao.sp.gov.br

INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral americana (LVA) é uma doença infecciosa causada pelo protozoário *Leishmania infantum chagasi* (*L. infantum chagasi*). Apresenta uma ampla distribuição geográfica e alto potencial de letalidade, sendo considerada problema de saúde pública devido ao grande número de casos novos, principalmente em grandes centros urbanos. Leishmanioses compreendem uma das dez endemias mundiais de prioridade absoluta e está entre as doenças negligenciadas, pois atinge em sua maioria, populações mais pobres. A transmissão humana ocorre pela picada da fêmea do mosquito flebotomíneo *Lutzomyia longipalpis* e *Lutzomyia cruzi* infectado pela *L. infantum chagasi*. **OBJETIVO:** Avaliar os parâmetros da série plaquetária de pacientes suspeitos de leishmaniose visceral moradores da região centro oeste do Estado de São Paulo atendidos pelo Hospital das Clínicas de Marília. **MÉTODOS:** Foi realizada análise dos resultados de hemogramas dos pacientes suspeitos de LVA atendidos no Hospital das Clínicas obtendo-se números de plaquetas sendo os dados organizados em planilhas do Excel. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** Os resultados obtidos no presente estudo mostraram variações entre os pacientes, sendo possível observar que no início, a doença pode apresentar contagem normal de plaquetas, porém durante a evolução pode ocorrer a plaquetopenia. O sexo masculino foi mais acometido pela LVA, porém crianças e idosos apresentaram uma diminuição mais significativa na contagem de plaquetas. Segundo a literatura, eles são mais suscetíveis a evoluir para a forma mais grave da doença, devido à fragilidade do sistema imunológico. **CONCLUSÃO:** O delineamento do estudo permitiu observar a importância do diagnóstico precoce e que a manifestação e gravidade da LV respeita uma relação parasita-hospedeiro, sendo necessárias estratégias efetivas para demonstrar as alterações hematológicas frequentes da LVA. A contagem de plaquetas após o tratamento é um indicativo positivo de resposta terapêutica, sendo, portanto, um parâmetro relevante no acompanhamento clínico dos pacientes com LVA.

Agradecimento: O presente projeto foi desenvolvido com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio da concessão de bolsa de iniciação científica (PIBIC- EM). Processo nº 139260/2023-4.

04 - FACES DO ENVELHECIMENTO: PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS SOBRE A PESSOA IDOSA

PAULA, K.Y.M.¹; CAPUTO, G.D.¹; JUSTINO, Y.A.C.²; GHEZZI, J.F.S.A.^{2,3}
MONTENOTE, M.C.²; SPADELLA, M.A.²

1- Escola Estadual Vereador Sebastião Mônico, Marília/SP

2-Programa de Pós-Graduação em Saúde e Envelhecimento - PPGSE, Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, Marília/SP

3-Curso de Enfermagem, Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF, Garça/SP

mitsukakenji2@gmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida observado no Brasil, são fenômenos que refletem diretamente na convivência familiar multigeracional. A relação com pessoas idosas, pode influenciar a forma como as crianças consideram essa população na sociedade e, conseqüentemente, o adulto/idoso que se tornará no futuro. Assim, é crucial entender o envelhecimento do ponto de vista infantil. **OBJETIVOS:** Identificar a percepção de crianças sobre a pessoa idosa e o envelhecimento, por meio de desenhos. **MÉTODOS:** Pesquisa qualitativa exploratória com crianças de escolas públicas de ensino fundamental I (EF-I) e II (EF-II), de um município de médio porte do interior paulista. A coleta de dados ocorreu, após aprovação do CEP/Famema, em duas escolas de EF-I e três de EF-II, sendo solicitado às crianças a produção de um desenho, a partir do disparador: “Faça um desenho da imagem que vem à sua cabeça, quando você pensa em uma pessoa idosa e no envelhecimento”. Uma folha padrão e materiais escolares foram fornecidos para garantir a homogeneidade de condições. A análise dos desenhos se deu por abordagem psicológica da Gestalt terapia. **RESULTADOS:** O total de 271 crianças participaram do estudo, sendo 137 do EF-I e 134 do EFII. A maior parte do EF-I tinha oito anos, enquanto no EF-II, a maioria relatou ter 11 anos. Cento e vinte e três crianças eram do gênero feminino e 148 do masculino. Os desenhos coletados foram categorizados em 12 elementos representativos. Independentemente da fase escolar, os elementos de maior representatividade do envelhecimento na visão das crianças foram natureza, ciclo da vida, felicidade/amor, como também pessoas idosas expressando dor, sofrimento e debilidade. Poucos desenhos mostraram a pessoa idosa em atividades funcionais. **CONCLUSÕES:** Embora a percepção infantil do envelhecer traga elementos positivos; a fragilidade e a incapacidade da pessoa idosa estão fortemente presentes. Estes achados oferecem subsídios para intervenções educacionais/sociais com as crianças, desde as primeiras fases de desenvolvimento, de modo a promover uma visão mais positiva e inclusiva da pessoa idosa na sociedade.

Agradecimento: O presente projeto foi desenvolvido com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio da concessão de bolsa de iniciação científica (PIBIC- EM). Processo nº 139401/2023-7. PDPG - Pós-Doutorado Estratégico (PDPG-POSDOC) - nº Processo CAPES - 88887.799298/2022-00

RESUMOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC/CNPq)

05 – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO DURANTE INFECÇÃO POR COVID-19: UMA SÉRIE DE CASOS RETROSPECTIVOS

EVANGELISTA, L.C.R.; BORBA, R.A.P.; STEFANO, L.H.S.S.; HIGA, E.F.R.

Faculdade de Medicina de Marília

larissacanelaruiz30@gmail.com

INTRODUÇÃO: A COVID-19 afeta o trato respiratório superior e pode causar lesões em órgãos-alvo. O vírus SARS-CoV-2 se liga aos receptores de angiotensina II, amplamente expressos nos tecidos pulmonar, endotelial e nervoso. O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi) é uma das principais complicações neurológicas da COVID-19, associado a distúrbios de coagulação, disfunção endotelial e resposta hiper-inflamatória. **OBJETIVOS:** Analisar as características clínicas de pacientes que apresentaram AVCi durante a infecção por SARS-CoV-2. **MÉTODOS:** Pesquisa documental secundária retrospectiva com delineamento TRANSVERSAL, coletando dados de dez casos de pacientes com AVC isquêmico agudo durante COVID-19, internados em um hospital-escola de alta complexidade. Foram analisados 2013 prontuários eletrônicos de pacientes internados por COVID-19 entre 2020 e 2023, selecionando apenas aqueles com AVC isquêmico agudo durante a infecção e excluindo casos de AVCi ocorridos após a internação ou com teste RT-PCR negativo. As variáveis analisadas incluíram idade, sexo, fatores de risco, comorbidades, manifestações clínicas, gravidade, tratamentos, neuroimagens e desfecho clínico, com análise estatística realizada pelo software Jamovi. **RESULTADOS:** Entre 2013 pacientes internados com COVID-19, 10 (0,50%) apresentaram AVC isquêmico. A idade média foi de 63 anos, com 70% do sexo feminino. A maioria (90%) tinha COVID-19 grave, com fatores de risco significativos como hipertensão e diabetes. O tempo médio entre o início da COVID-19 e o AVC foi de 7,6 dias. A classificação etiológica mostrou 30% dos AVCs como cardioembólicos e 30% indeterminados. Dentre os pacientes, 80% apresentaram síndrome da circulação anterior parcial e 30% tiveram transformação hemorrágica. A taxa de mortalidade foi de 30%. **CONCLUSÕES:** Apesar da baixa incidência de AVCi em pacientes com COVID-19, a gravidade dos casos é notável, enfatizando a importância do manejo rigoroso dos fatores de risco e investigações diagnósticas detalhadas. A elevada mortalidade indica a necessidade de monitoramento contínuo e estratégias de tratamento para otimizar os desfechos clínicos.

Agradecimento: O presente projeto foi desenvolvido com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio da concessão de bolsa de iniciação científica (PIBIC). Processo nº119918/2023-4.

06 - ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA DISPERSÃO DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - SP, NO PERÍODO DE 2000 - 2020

PONTIM, N. S. M.; SASSAQUI, L. K. S.; RANCAN, E. A; CHAGAS, E. F. B.; SUZUKI, R. B.; MARTINS, L. P. A.

Faculdade de Medicina de Marília

nscaff54@gmail.com

INTRODUÇÃO:A dengue é uma doença infecciosa aguda com variados quadros clínicos. O vírus da Dengue (DENV), agente da febre da Dengue (FD), é a arbovirose mais significativa, transmitida pela picada de mosquitos fêmeas do gênero Aedes, que habitam regiões tropicais e subtropicais, expondo quase um terço da população mundial ao risco de infecção (CHEN, 2011). Municípios de pequeno e médio porte são cruciais, pois concentram maior número de casos; assim, o município de Marília, com 238.605 habitantes segundo o IBGE de 2010, é relevante neste contexto. **OBJETIVO:** Analisar a dispersão espaço-temporal da dengue em Marília – SP, no período de 2000 a 2020. **MÉTODOS:** A área de estudo é Marília, avaliando casos de dengue por meio de uma análise quantitativa observacional, longitudinal e retrospectiva, utilizando dados da Secretaria Municipal de Saúde de 2000 a 2020. Os dados serão estratificados pelo CNES e ano da notificação, permitindo georreferenciamento preciso. A proporção de casos por ano será analisada pela razão de incidência e intervalos de confiança de 95% (IC95%), utilizando o teste do Qui-quadrado para proporções. O nível de significância adotado será de 5% ($p \leq 0,05$) e os dados analisados no software SPSS versão 19.0. A incidência será examinada por área, utilizando a razão entre a população da região e a distribuição dos casos confirmados (razão Kernel), considerando a população de Marília segundo o IBGE de 2010. **RESULTADOS:** Os resultados indicam que a doença mantém taxas de incidência semelhantes em todo o município, com destaque para a macrorregião Oeste, que apresenta maior fragilidade socioambiental. **CONCLUSÃO:** Portanto, essa macrorregião deve ser alvo de ações públicas para melhorar o controle da arbovirose no município.

Agradecimento: O presente projeto foi desenvolvido com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio da concessão de bolsa de iniciação científica (PIBIC). Processo nº 147423/2023-6.

07 - ASSOCIAÇÃO ENTRE EVENTOS DE TROMBOSE VENOSA E A PREVALÊNCIA DO POLIMORFISMO RS4343 DO GENE DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA

CHERAIN, L.M.A.; JÚNIOR, W.B.; CECÍLIO, R.C.

Faculdade de Medicina de Marília

luanamariaac27@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) tem um importante papel no Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) e na cascata de coagulação promovendo aumento do estado pró-trombótico. O gene da ECA está localizado no cromossomo 17q23 e possui o polimorfismo ECA G2350A (rs4343). **OBJETIVOS:** Associar a prevalência do polimorfismo rs4343 do gene da ECA em indivíduos com eventos prévios de Tromboembolismo Venoso (TEV) e demais variáveis relacionadas. **MÉTODOS:** Foram analisadas 100 amostras de DNA de doadores de sangue e 66 de pacientes com história de TEV, atendidos nas dependências do Hemocentro de Marília. Foi usada a técnica de genotipagem em tempo real (Real Time). Para análise estatística, foram utilizados o teste t Student com correção de Welch, teste de Levene e teste de associação do Qui-quadrado. O nível de significância adotado foi de 5% e os dados foram analisados no software SPSS (versão 27.0) **RESULTADOS:** Foi ratificada a associação entre a idade mais avançada e eventos de TEV. Ademais, houve maior prevalência de mulheres (63,6%) que homens (36,4%) no grupo exposto a TEV. Não demonstrou significância estatística referente à prevalência do Polimorfismo da ECA e do genótipo heterozigoto do Fator V de Leiden em pacientes e também entre os diferentes genótipos. Entretanto, o genótipo heterozigoto da mutação da Protrombina se mostrou mais frequente entre os pacientes. Somado a isso, essa pesquisa não encontrou diferença estatisticamente significativa da prevalência entre os sexos quando se analisa a distribuição dos polimorfismos da ECA, genótipo heterozigoto (G/A) do Fator V de Leiden e da Protrombina. **CONCLUSÕES:** O projeto continuará sendo realizado no Hemocentro do Hospital das Clínicas de Marília, adicionando-se outras variantes descritas na literatura como relacionadas a eventos de trombose venosa, tais como Fator V de Leiden, Protrombina e demais polimorfismos ao longo da cadeia de reações do SRAA, inclusive o rs 4343 da ECA.

Agradecimento: A equipe do projeto agradece ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Processo no 146761/2023-5) e à Faculdade de Medicina de Marília pelo fomento à pesquisa e desenvolvimento científico por meio de bolsas para discentes.

08 - CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE GERIATRIA: ANTES E APÓS A PANDEMIA DE COVID-19

SILVA, L.O.¹; KOMATSU, C.¹; KOMATSU, R.S.²

1.Faculdade de Medicina de Marília

2.Polícia Científica Civil - SP

layanaenf@gmail.com

INTRODUÇÃO: A pandemia de COVID-19 impactou drasticamente a saúde dos idosos, implicando em mudanças no que diz respeito aos hábitos alimentares, convivência familiar e consultas médicas. Utilizamos, então, a seguinte questão norteadora: “Qual a influência da pandemia de COVID-19 na caracterização dos idosos?”. **OBJETIVOS:** Investigar, de forma quantitativa e qualitativa, as consequências da pandemia de COVID-19 no processo de envelhecimento dos idosos atendidos no Ambulatório de Geriatria da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). **MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa de levantamento de dados e ex post-facto aplicada, com abordagem quantitativa e objetivo descritivo. **RESULTADOS:** No período anterior à pandemia, a amostra analisada totalizou 131 idosos, sendo 91 mulheres e 40 homens, com média de idade de 77 anos e de escolaridade de apenas três anos. A média de pontos do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) foi 19 e da Escala de Avaliação Clínica de Demência (CDR), um. Após a pandemia, a amostra analisada totalizou 51 pacientes, sendo 34 mulheres e 17 homens, com média de idade de 78,09 anos e de escolaridade de 3,93 anos. A média de pontos do MEEM foi 20,25 e da CDR, 0,78. **CONCLUSÕES:** A pandemia de COVID 19 pode ter influenciado parcialmente a caracterização dos idosos, indicando que mais pesquisas são necessárias para examinar os efeitos pandêmicos ao longo do tempo.

Agradecimento: O presente projeto foi desenvolvido com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio da concessão de bolsa de iniciação científica (PIBIC). Processo nº 119962/2023-3.

09 - DOENÇA RENAL DO DIABETES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EM MARÍLIA/SP: EVOLUÇÃO TEMPORAL, INDICADORES E FATORES ASSOCIADOS

SANTOS, M.S.¹; NONATO, A.C.²; CALEMAN, G.³

1. Discente do curso de Medicina da FAMEMA e bolsista PIBIC/CNPq;
2. Professora voluntária da FAMEMA;
3. Docente do Núcleo de Saúde Coletiva da FAMEMA e consultor do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual do SUS.

may.suzano@gmail.com

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus (DM) é a principal causa de Doença Renal Crônica (DRC) em todo mundo. Considerando a importância da Atenção Primária à Saúde (APS) no cuidado destes pacientes, tem-se como hipótese que perfil sociodemográfico, condições ambientais e organização dos serviços de saúde influenciam os indicadores de DRC na população diabética de Marília/SP. **OBJETIVO:** analisar os aspectos clínico-epidemiológicos de pacientes com DRC secundário a DM e determinar a força de associação entre as duas condições e fatores associados. **MÉTODOS:** Realizou-se um estudo observacional transversal retrospectivo que incluiu pacientes diabéticos maiores de 20 anos em acompanhamento regular na APS de Marília, através de dados fornecidos pela Secretaria Municipal, de 2018 a 2023. Além de DM, DRC e IR, foram avaliadas características clínicas como idade, sexo, cor e comorbidades associadas. Os dados foram analisados para determinar indicadores epidemiológicos e força de associação. **RESULTADOS:** Identificou-se aumento progressivo da prevalência de DM (6,13-6,77%), com queda no ano de 2021, condizente com a pandemia de Covid-19. A população estudada foi composta por 68% pessoas brancas, 60% sexo feminino e 80% maiores de 55 anos. 63% dos diabéticos do município também apresentam hipertensão e 7% são tabagistas. Verificou-se associação estatisticamente significativa entre a DM e a Insuficiência Renal (IR) por meio da Razão de Prevalência (RP) que variou de 6,27 a 7,36 e Odds Ratio (OR) entre 6,32 e 7,42, ambos com $p < 0,05$. **CONCLUSÃO:** Houve associação entre DM e IR, porém demonstrou-se que a DM não é o único fator de influência para IR no município, podendo estar correlacionado com outras comorbidades, como a hipertensão, hábitos de vida e tabagismo. Portanto, é importante que sejam propostas medidas para adequação do rastreio, diagnóstico e notificação da DRD, assim como para controle glicêmico rigoroso e das demais comorbidades para mitigar complicações e melhorar o cuidado.

Agradecimento: O presente projeto foi desenvolvido com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio da concessão de bolsa de iniciação científica (PIBIC). Processo nº 146794/2023-0.

10 - EFEITOS DA EPIDIDIMITE INDUZIDA POR LIPOSSACARÍDEO NA MORFOLOGIA DO EPIDÍDIMO EM DIFERENTES TEMPOS PÓS-INDUÇÃO

DIAS, B.C.¹; ANDRADE, A.D.²; SILVA, E.J.R.²; SPADELLA, M.A.³

1. Discente curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA (Marília)
2. Departamento de Biofísica e Farmacologia - I.B. Unesp (Botucatu)
3. Docente da Faculdade de Medicina de Marília, Laboratório de Embriologia Humana - FAMEMA (Marília)

biancacostadias8@gmail.com

INTRODUÇÃO: O epidídimo, órgão tubular, é responsável pela maturação dos espermatozoides, processo essencial para fertilidade masculina. A epididimite, comum em homens, tem como principal causa a ascensão retrógrada de bactérias Gram-negativas; levando à quadro agudo de dor e edema escrotal; o que pode levar à infertilidade. Poucos estudos têm elucidado suas consequências aos segmentos do epidídimo: segmento inicial-SI (apenas roedores), cabeça-CB, corpo-CO e cauda-CA. **OBJETIVOS:** Avaliar as alterações morfológicas no epidídimo (SI/CB/CO/CA) em modelo experimental de epididimite em diferentes tempos pós-indução. **MÉTODOS:** Epidídimos de camundongos adultos C57BL/6 (n=3/grupo), submetidos à indução da epididimite com LPS ultrapuro de E. coli via intersticial-SI ou intravasal-deferente, foram fixados em glutaraldeído 2%-paraformaldeído 4% por 24h, após eutanásia em 6, 24 e 72h da indução. Grupos Controle receberam salina pelas mesmas vias. Após, os epidídimos foram processados e incluídos em parafina. Secções em Hematoxilina-Eosina foram submetidas à morfometria, sendo mensurados (µm): diâmetro do ducto (DD) e lúmen (DL), espessura da parede (EP) e altura do epitélio (AE), por segmento epididimário, via e tempo da indução. Colágeno total foi quantificado em secções coradas por Masson, por contagem de pontos. Teste t student, adotando-se $p < 0,05$ foi empregado. **RESULTADOS E CONCLUSÕES:** Na indução intersticial, ductos do CO epididimário no grupo LPS-6h mostraram aumento do DL ($p=0,0456$) e diminuição da AE no SI ($p=0,0422$) e CB ($p=0,0154$). Houve aumento de colágeno no SI 24h pós-indução, porém não significativo. Na indução intravasal, aumento do DD da CB foi observado em LPS-6h ($p=0,0444$). No LPS-72h, observou-se aumento da EP da CB ($p=0,0475$) e, no LPS-24h, houve aumento do colágeno na CA ($p=0,0496$). Ambas as vias de indução promoveram alterações morfoestruturais no epidídimo; sendo mais precoces na via intravasal. Maior deposição de colágeno ocorreu no local da indução, corroborando a literatura. Estes dados trazem uma melhor compreensão da resposta desse órgão à epididimite e, seus impactos na saúde reprodutiva masculina.

Agradecimento: O presente projeto foi desenvolvido com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio da concessão de bolsa de iniciação científica (PIBIC). Processo nº 119891/2023-9.

11 - USO DE SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS E/OU MINERAIS: POTENCIALIDADES E RISCOS

IKUNO, C.M.; TABATA, L.T.; NAKAZATO M.Y.A.; REZENDE, K.T.A.; TONHOM, S.F.R.

Faculdade de Medicina de Marília

carolmayumi101@gmail.com

INTRODUÇÃO: O uso de suplementos vitamínicos e/ou minerais tornou-se uma prática comum em populações enfermas e/ou saudáveis, muitas vezes independente de sua prescrição, pois, frequentemente, sua utilização é recomendada por familiares e amigos ou mesmo pelos meios de comunicação. Foram descritas as seguintes substâncias: cálcio, magnésio, ferro, potássio, zinco, equivalentes de retinol e vitaminas D, E, K, B12 e C. Apesar da necessidade de suplementação em alguns casos, dependendo do tipo e procedência do suplemento, existem riscos para a saúde e sobrecarga para o sistema. **OBJETIVOS:** Analisar a concepção dos discentes do curso de Medicina da FAMEMA em relação ao uso de suplementos vitamínicos e/ou minerais; identificar e analisar quais são os mais utilizados, o perfil das pessoas que os consomem e as fontes de sua indicação, além dos motivos e resultados esperados do uso desses suplementos, bem como suas implicações, na visão destes discentes. **MÉTODO:** Abordagem qualitativa, com entrevistas semi-estruturadas, sendo os dados obtidos interpretados pela análise de conteúdo, modalidade temática. **RESULTADOS:** A partir do conteúdo coletado, elaborou-se cinco classes temáticas. Entendimentos convergentes e complementares sobre o assunto, atribuindo o uso a cinco aspectos, além de apontar os meios de divulgação; O perfil dos consumidores, com certas divergências de opiniões; Suplementos mais utilizados e seus motivos de consumo (fácil acesso, influência da mídia, estética, recomendação médica, entre outros). Utilização de grande variedade de suplementos pelos estudantes, como vitamina C, D, complexo B, ferro, arsênio, magnésio e zinco e, por fim, registros das experiências familiares e de conhecidos de uso. **CONCLUSÕES:** Evidenciou-se olhares críticos dos participantes quanto às formas de uso, indicações e influências para tal consumo e a relação destes compostos com a busca constante por saúde e/ou estética na vida das pessoas.

Agradecimento: O presente projeto foi desenvolvido com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) por meio da concessão de bolsa de iniciação científica (PIBIC). Processo nº 119975/2023-8.

RESUMOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

12 - A CONTRADIÇÃO ENTRE A LEI ANTIDROGAS E A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE: A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ESTÁ ENCARCERANDO OS PRINCÍPIOS DO SUS?

DOMINGUES, B.B.¹; 2EVEDOVE, A.U.D.¹

1. Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA

beabalazina@gmail.com

INTRODUÇÃO: A legislação que regulamenta o uso de drogas no Brasil contradiz a Constituição Nacional sobre a saúde e os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua redação permite que a prisão seja arbitrária, negligenciando o cuidado em saúde dos usuários por não diferenciá-los de traficantes, superlotando os sistemas prisionais, impossibilitando condições dignas de sobrevivência e contribuindo com a dispersão de doenças transmissíveis, sobretudo em pessoas idosas privadas de liberdade que tem aumentado a população carcerária devido ao envelhecimento populacional brasileiro. Estes fatores divergem dos princípios do SUS por não garantirem a universalidade (saúde direito de todos e dever do Estado), integralidade (pessoas devem ser consideradas como um todo e serem atendidas em todas as suas necessidades) e igualdade (assistência à saúde garantida para todo cidadão, sem preconceitos ou privilégios). **OBJETIVO:** analisar a legislação antidrogas vigente no Brasil e sua relação com os princípios do SUS. **MÉTODOS:** Projeto de pesquisa qualitativa que utilizará a análise documental da legislação sobre o uso de drogas no país. A análise de conteúdo temática de Bardin será utilizada para identificar e analisar temas observados na coleta dos dados. As seguintes etapas serão realizadas: 1. Pré-análise por meio de leitura flutuante dos documentos para aproximação com o tema, identificação da pertinência sobre a utilização dos mesmos para a pesquisa e organização dos dados; 2. Exploração do material por meio da codificação, agrupamento dos dados e contextualização; 3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação por meio da classificação dos dados, interpretação, síntese e discussão. Os resultados serão confrontados com os princípios do SUS. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que os resultados contribuam com: 1. Fortalecimento de uma formação profissional crítica e reflexiva, considerando os princípios do SUS; 2. Planejamento e implementação de ações de cuidado à saúde que reduzam as inequidades – desigualdades consideradas injustas e evitáveis – relacionadas às pessoas privadas de liberdade, sobretudo as pessoas idosas.

13 - A EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA NO AMBIENTE PRÉ-HOSPITALAR ATRAVÉS DO USO DE MÍDIAS DIGITAIS

CARDOSO, M.F.; SILVA, K.D.; FARIAS, K.C.A; TAKEDA, E.; TONHOM, S.F.R.

Faculdade de Medicina de Marília

mariuryfonsecacardoso@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Atenção pré-hospitalar (APH) exerce função essencial nos desfechos dos atendimentos de urgência e emergência, principalmente os que necessitam de intervenção imediata. Desse modo, o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é solicitado a fim de socorrer a vítima que está vulnerável ao risco de lesão permanente e potencial risco de morte. Além dos riscos físicos e psicológicos que as vítimas podem vivenciar durante o seu atendimento, também deve se levar em consideração o risco de exposição por meio de fotos e filmagens na cena do acidente. Tais situações se tornaram cada vez mais frequentes e isso se deve ao avanço tecnológico e a popularização de aparelhos celulares. **OBJETIVO:** Identificar o manuseio de smartphone ou similares pela população no ambiente de APH. Ademais, analisar a compreensão dos profissionais acerca do uso das mídias digitais. **MÉTODO:** Trata-se de uma pesquisa descritiva-exploratória com abordagem qualitativa, sendo utilizada a Análise de Conteúdo Modalidade Temática. Esse estudo utilizará um formulário previamente validado em um espaço amostral que será definido por saturação das falas de profissionais do SAMU de Pompéia-SP e Marília SP. Todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visando à posterior divulgação dos resultados obtidos. Os critérios de inclusão serão: ser profissional do SAMU, assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e autorizar a gravação da entrevista. O formulário será aplicado por estudantes previamente capacitados em entrevistas presenciais e individuais. As falas dos funcionários serão gravadas após prévia autorização dos mesmos, os áudios serão transcritos para análise temática das falas e então será feito o agrupamento por categorias para posterior análise dos conteúdos. **RESULTADOS:** Após a análise dos dados, foram elencados em três categorias: Percepção dos Profissionais Acerca do Uso de Smartphones ou Similares no contexto do APH; Ações de Proteção à Vítima no APH; Aspectos Positivos do Registro do Atendimento Pré-Hospitalar.

14 - A INFLUÊNCIA DA SAÚDE MENTAL MATERNA DURANTE O PUERPÉRIO NA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ

MARQUES, J.P.M.; SANTILONI, A.F.P.; OTANI, M.P.

Faculdade de Medicina de Marília

jumurari10@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde mental materna é um fator crítico que impacta não só o bem-estar da mãe, mas também sua capacidade de cuidar de si e do bebê. No puerpério, as mães podem enfrentar desafios emocionais significativos, que não afetam apenas a saúde da mulher, mas também repercutem no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional da criança. Estudos mostram que essas condições podem levar a desfechos adversos, dificultando comportamentos exploratórios e a formação de vínculos saudáveis do bebê. Assim, compreender a saúde mental materna é fundamental para criar intervenções que beneficiem mãe e bebê.

OBJETIVOS: Investigar a relação entre a saúde mental materna e o desenvolvimento infantil, destacando suas implicações clínicas após a gestação.

MÉTODOS: Este estudo utilizará a revisão integrativa da literatura para investigar os efeitos da saúde mental materna no desenvolvimento do bebê e suas implicações clínicas. A pergunta norteadora foi formulada com base na estratégia PEO (Population, Exposure, Outcome): "Qual é a influência da saúde mental materna durante a gestação e o pós-parto na saúde e desenvolvimento do bebê, considerando efeitos, intervenções e implicações clínicas identificadas?". A busca será realizada em bases como PubMed, CINAHL, LILACS e Web of Science, utilizando os descritores: "saúde mental", "saúde materna" e "desenvolvimento infantil" e operadores booleanos. Os resultados serão filtrados no EndNote e Rayyan para seleção dos estudos elegíveis. Dois revisores independentes avaliarão os estudos segundo critérios de inclusão e exclusão. Um formulário adaptado será utilizado para extrair dados relevantes, e os achados serão sintetizados, enfatizando os efeitos da saúde mental materna e as implicações clínicas.

RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que os resultados reforcem a necessidade de suporte psicológico materno no puerpério e contribuam para a formação de profissionais de saúde sobre a relevância da saúde mental materna no desenvolvimento infantil

15 - A RESPOSTA IMUNOLÓGICA: UMA REVISÃO ATUALIZADA DA LITERATURA

CALAMITA, Z.; MINAMI, A. S. K.

Faculdade de Medicina de Marília

amanda.minami123@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Sistema Imunológico, visando proteger o corpo humano contra patógenos, utiliza-se de uma série de mecanismos. Barreiras físicas; alterações de temperatura; e a participação de leucócitos e de citocinas são alguns dos recursos protagonistas na inflamação. Após o reconhecimento de Padrões Moleculares Associados a Patógenos e a Danos por Receptores de Reconhecimento de Padrões de células sentinelas, são acionadas, quase que concomitantemente, duas vias de resposta imunológica: a Inata e a Adaptativa. A Inata, primeira linha de defesa, independe de estímulo prévio e possui atuação de defesas mecânicas, de variações fisiológicas e de substâncias químicas. Nela, acontecem os processos da vasodilatação e da diapedese. Já a Adaptativa, é específica e atua mediante estímulo preliminar. Esta se subdivide em duas rotas de atuação: Adaptativa Humoral, mediada por linfócitos B e Adaptativa Celular, por linfócitos T. Nesse sentido, a resposta imunológica compreende estratégias coordenadas frente ao abalo, na tentativa de restabelecer a homeostase corporal e de perpetuar a sobrevivência da espécie humana. **OBJETIVOS:** Revisão literária atualizada, nítida e objetiva sobre a cronologia da resposta imunológica humana frente a um agente invasor, permeando os processos de expansão e diferenciação celular dos linfócitos T e B; mecanismos de produção e liberação de mediadores químicos e a relação destes com sintomas constitucionais da inflamação. Efetuar uma associação mais evidente e realista entre as Respostas Inata e Adaptativa. **MÉTODOS:** Revisão Literária com informações advindas de livros de Imunologia, periódicos, artigos científicos e, inclusive, outras revisões literárias. Os critérios de inclusão contemplarão obras datadas a partir dos anos 2000 e escritas em língua portuguesa ou inglesa. O banco de dados será proveniente de plataformas como "Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde" (LILACS); "Pub Med"; "Scientific Electronic Library Online" (SciELO) e "Europe PMC". **RESULTADOS ESPERADOS:** Revisão Literária atualizada, didática, precisa e centrada na cronologia da resposta imunológica humana e suas vertentes correlacionadas.

16 - ABORTAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DA SOCIEDADE

FERNANDES, B. O.; SILVA, B. B. G.; FONSECA, C. M. B.; GARCIA, G. R.; REZENDE, K.T.A; TONHOM, S.R.F.

Faculdade de Medicina de Marília

cauembf@gmail.com

INTRODUÇÃO: O abortamento inseguro, vitima anualmente, aproximadamente, 22 milhões de mulheres no mundo. Esses altos índices evidenciam a dificuldade de acesso ao procedimento, devido a sua criminalização e objeção de consciência de profissionais da saúde. Assim, questiona-se como a opinião da população pode influenciar no desenvolvimento de políticas públicas acerca do assunto. **OBJETIVO GERAL:** Analisar a compreensão da sociedade acerca do abortamento e sua interferência na formulação de políticas. **MÉTODO.** Realizou-se pesquisa com abordagem qualitativa. Participaram dessa, uma Unidade Básica de Saúde por região – norte, sul, leste e oeste - do município. Empregou-se entrevista semi-estruturada com as pessoas que aguardavam atendimento na sala de espera, sendo considerados aptos os indivíduos dos sexos feminino e masculino com idade superior a 18 anos, sem o prejuízo de funções cognitivas. Ademais, participaram o ginecologista/obstetra e enfermeiro assistencial presentes na unidade de saúde. A interpretação dos dados se deu por meio da Análise de Conteúdo, Modalidade Temática. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. **RESULTADOS.** Explicita-se que o aborto provocado constitui homicídio. Também, defende-se que somente a mulher tem poder de decidir interromper a gestação. Quanto as situações de aborto atualmente legalizadas, verifica-se o posicionamento favorável e o desfavorável. O aborto deveria ser legalizado em qualquer situação e, uma vez permitido, obrigatoriamente, o SUS se responsabiliza, como também, mesmo legalizado, não deveria ser ofertado pelo SUS, pois onera o sistema. Porém, evidencia-se que o aborto não deveria ser legalizado, por entender que esse ato estimularia a prática. A concepção da sociedade interfere na criação de políticas públicas, a qual é determinada pela religião e faixa etária, dentre outros aspectos. Também, surge, a não interferência, uma vez que os governantes desconsideram as opiniões populares. **CONSIDERAÇÕES FINAIS.** Evidencia-se posicionamentos divergentes acerca da temática e sugere-se investimento em políticas de saúde para essa problemática, ainda, tão negligenciada na sociedade.

17 - ADOECIMENTO PSÍQUICO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA PRISIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

CARNEIRO, R. C.; PIO, D. A. M.

Faculdade de Medicina de Marília

rebecacarneiro440@gmail.com

INTRODUÇÃO: O sistema penitenciário brasileiro é constituído por instituições e instâncias diversas, entre as quais os estabelecimentos prisionais. O profissional que trabalha no ambiente prisional possui a organização do ambiente de trabalho sobrecarregada, pois além de cumprir com a padronização do mesmo, é exposto a efeitos estressores, possibilitando um processo de adoecimento nesse contexto. Nesse sentido, a escolha deste tema foi motivada pelo grande problema evidenciado no ambiente prisional, considerado insalubre e com prejuízos à saúde mental de seus trabalhadores. **OBJETIVO:** Compreender, por meio de uma análise de estudos científicos, como ocorre o processo de adoecimento psíquico dos profissionais que trabalham no sistema prisional. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura (RIL). Estruturada pela estratégia PICO, tem-se a pergunta de pesquisa: Quais os impactos causados à saúde mental dos profissionais que atuam no sistema prisional? Foram utilizadas as bases de dados na busca realizada em abril de 2024: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de dados em Enfermagem – Bibliografia Brasileira (BDENF – Enfermagem), Index psicologia – periódicos, por meio do portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Utilizou-se os descritores: Saúde Mental, Transtornos Mentais, Estresse Psicológico, Saúde Ocupacional, Doenças Profissionais, Estresse Ocupacional e Servidores Penitenciários. A interação desses descritores e palavras-chave foi realizada pelos operadores booleanos AND e OR, resultando em 194 artigos. O processo de seleção dos artigos da revisão será realizado em etapas: após exclusão de duplicatas, haverá leitura minuciosa de títulos, depois de seus resumos e por fim, os artigos selecionados serão lidos na íntegra como seleção final para análise dos dados, de acordo com a análise de conteúdo, modalidade temática. **RESULTADOS ESPERADOS:** A pesquisa buscará elencar estratégias de prevenção ou de intervenção que possam apoiar esses trabalhadores em relação à saúde mental.

18 - ALERGIA ALIMENTAR ASSOCIADA À INTRODUÇÃO DOS ALIMENTOS NOS LACTENTES

BENACCHIO, I. G.; SILVA, R. L. Z.; PINHEIRO, A. M.; PEREIRA, B. M.; SIQUEIRA, F. P. C.

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

ric.laudares@gmail.com

INTRODUÇÃO: A alergia alimentar é uma reação imunológica exacerbada contra alérgenos alimentares, que ocorre após o contato destes com o organismo, classificada em mediada por IgE, não mediada por IgE ou mista, dependendo das células do sistema imunológico envolvidas e da sintomatologia. Determinadas substâncias alergênicas, que possuem características típicas, como peso e estrutura molecular, podem estimular uma reação descontrolada do sistema imune. **OBJETIVOS:** Compreender a relação entre alergia alimentar e introdução dos alimentos nos lactentes (0-24 meses), visando identificar os principais alérgenos e o momento ideal de introduzi-los. **MÉTODO:** Estudo de Revisão Integrativa da Literatura, com uso das bases de dados MEDLINE (via PubMed) e LILACS (via Portal da BVS), descritores “food introduction”, “food hypersensitivity” e/ou “food allergy” e “lactentes (0-24 meses)”, referências nas línguas inglesa, portuguesa e/ou espanhola, entre 2018-2023. Utilizou-se a ferramenta PRISMA para a triagem das 644 referências e para a seleção final das 18 analisadas. **RESULTADOS:** Dentre os artigos analisados, 10 evidenciaram a relação positiva entre introdução precoce dos alimentos (4-6 meses) e prevenção da hipersensibilidade alimentar mediada por IgE nos lactentes, contrariando as diretrizes anteriores sobre a administração tardia de alérgenos, sendo os principais leite, ovo e amendoim. Introduzir precocemente múltiplos alérgenos alimentares implica maior tolerância a estes por alterações na imunidade celular com expansão de linfócitos T e B reguladores, assim como alteração da microbiota intestinal, que, embora não demonstre relação direta com o desenvolvimento da alergia, em contato com leite materno, estimula a produção de butirato, que pode preveni-la. Ademais, um artigo sustentou que antecipar a introdução alimentar não diminui a duração da amamentação. Apesar dos benefícios das novas diretrizes, existem desafios para implementá-las. **CONCLUSÃO:** Verificou-se que tanto a diversidade de alimentos quanto o período da introdução, precocemente, podem ser fatores protetores contra o desenvolvimento da alergia alimentar na infância.

19 - ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS E MORFOMÉTRICAS NAS VESÍCULAS SEMINAIS DE RATOS NA FASE AGUDA DA ARTRITE POR ADJUVANTE (AIA)

SILVA, M.C.P.¹, MONTENOTE, M.C.², SPADELLA M.A.³

1. Discente do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA
2. Pós-doutoranda do Programa de Pós-graduação em Saúde e Envelhecimento, Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA
3. Docente da Disciplina de Embriologia da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA

palominomariacecilia7@gmail.com

INTRODUÇÃO: Artrite reumatoide configura uma importante questão de saúde pública, sendo a doença reumática inflamatória de maior prevalência global. Embora sua completa etiologia não seja elucidada, sabe-se do envolvimento de uma complexa interação de fatores genéticos e ambientais que, além de danos articulares, pode gerar aparições sistêmicas em cerca de 40% dos pacientes, incluindo órgãos reprodutivos masculinos, com potenciais desregulações hormonais que podem levar a hipoandrogenismo artrítico, disfunção erétil e infertilidade. **OBJETIVO:** Avaliar repercussões agudas da AIA sobre as vesículas seminais e investigar os efeitos da testosterona no alívio dos danos glandulares causados. **MÉTODOS:** Vesículas seminais foram obtidas de ratos Wistar machos adultos (12 semanas) distribuídos: CTRL15 (controle, falso-imunizado), AIA15 (imunizados), CTRL15+T (falso-imunizados, tratados com testosterona) e AIA15+T (imunizados, tratados com testosterona). Artrite induzida pela inoculação de 100µL de emulsão de óleo mineral e água destilada, contendo 50mg/mL de Mycobacterium tuberculosis, via intradérmica, na planta da pata posterior direita. Animais CTRL receberam óleo mineral. Tratamento com propionato de testosterona (3mg/kg), via subcutânea, ocorreu por 15 dias a contar da indução. Grupos não tratados receberam óleo de oliva. Os animais foram eutanasiados ao 15º dia da indução para coleta das vesículas seminais com o fluido seminal. Após processamento em parafina, as análises compreenderão avaliação histomorfométrica do epitélio secretor e do colágeno no estroma glandular, e estudo imunoistoquímico das proteínas de secreção seminal SVS2 e SVS3, fundamentais ao processo de (des)capacitação dos espermatozoides. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se verificar alterações histopatológicas nas vesículas seminais, evidenciando o hipoandrogenismo artrítico e determinar o papel protetor da testosterona sobre arquitetura glandular e secreção de proteínas essenciais para reprodução. Esses resultados poderão auxiliar no desenvolvimento de futuras terapias para preservar a função reprodutiva em indivíduos artríticos.

20 - ALTERAÇÕES TARDIAS NAS VESÍCULAS SEMINAIS DECORRENTES DA ARTRITE INDUZIDA POR ADJUVANTE E A AÇÃO TERAPÊUTICA DA TESTOSTERONA

VASCONCELOS, M.B.P.G.¹; MONTENOTE, M.C.²; SPADELLA, M.A.³

1.Discente do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA.

2.Pós-doutoranda do Programa de Pós-graduação em Saúde e Envelhecimento da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA.

3.Docente da Disciplina de Embriologia na Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA.

parisottomarcellus@gmail.com

INTRODUÇÃO: A artrite reumatoide (AR), doença inflamatória autoimune, é caracterizada pela inflamação sinovial crônica e, afeta cerca de 1% da população mundial. Conhecida por seu impacto nas articulações, também apresenta efeitos sistêmicos, incluindo alterações hormonais que influenciam a função reprodutiva. Estudos indicam que homens com AR apresentam baixos níveis de andrógenos e, aumento de estrogênio, sugerindo correlação entre o grau de inflamação e a disfunção hormonal, o que pode levar à problemas na fertilidade masculina. **OBJETIVOS:** Avaliar as repercussões tardias da AIA sobre as vesículas seminais e, investigar se o tratamento com testosterona é capaz de reverter os danos causados à estas glândulas. **MÉTODOS:** Para este projeto serão utilizadas vesículas seminais de ratos de estudo prévio, com mesmo delineamento experimental aqui proposto. A saber, ratos Wistar machos adultos (12 semanas) foram distribuídos em quatro grupos: CTRL40 (controle, falso-imunizado), AIA40 (imunizados), CTRL40+T (falso-imunizados, tratados com testosterona) e AIA40+T (imunizados, tratados com testosterona). A artrite foi induzida pela inoculação de 100µL de emulsão de óleo mineral e água destilada, contendo 50mg/mL de Mycobacterium tuberculosis, via intradérmica, na planta da pata posterior direita. Os animais CTRL receberam óleo mineral. Tratamento com propionato de testosterona (3mg/kg), via subcutânea, ocorreu por 40 dias a contar da indução. Grupos não tratados receberam óleo de oliva. Os animais foram eutanasiados ao 40º dia da indução para coleta das vesículas seminais com o fluido seminal. Após processamento em parafina, as análises das repercussões tardias da artrite compreenderão avaliação histomorfométrica do epitélio secretor e do colágeno no estroma glandular, além do estudo imunoistoquímico das proteínas de secreção seminal SVS2 e SVS3, fundamentais ao processo de (des)capacitação dos espermatozoides. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se identificar alterações histopatológicas nas vesículas seminais, evidenciando o impacto do hipoandrogenismo artrítico e, determinar o papel protetor da testosterona sobre arquitetura glandular e secreção de proteínas essenciais para reprodução. Estes dados possibilitarão melhor entendimento dos efeitos sistêmicos da AIA ao sistema reprodutor masculino, proporcionando insights sobre potenciais terapias para preservar a fertilidade em homens com AR.

21 - ANÁLISE DA ABORDAGEM DOS CUIDADOS PALIATIVOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA EM SÃO PAULO

SHIBUYA, J. N.; TAKEDA, V. G.; GIANNATTASIO, B. B.; AGGIO, C.M.

Faculdade de Medicina de Marília

julianaomishibuya@gmail.com

INTRODUÇÃO: A importância dos Cuidados Paliativos (CP) na saúde baseia-se na necessidade das pessoas receberem atendimento humanizado, que amenize o sofrimento e a carga de dores físicas, psicológicas, emocionais e espirituais, presentes em doenças ameaçadoras da vida. A discussão sobre esse tema é fundamental pelo envelhecimento da população, acompanhado dos agravos de saúde. Assim, cresce a demanda por cuidados com doenças crônicas, manejo de sintomas e assistência no final da vida, temas abordados no paliativismo. Com isso, o ensino de CP na graduação em medicina é essencial para a formação de profissionais que entendam a morte como um processo natural. Desta forma, as novas equipes estarão capacitadas para amparar os pacientes com condutas que propiciem a vivência dessa última fase tão ativamente quanto possível, garantindo-lhes dignidade e protegendo-os de procedimentos desnecessários. **OBJETIVO:** Analisar a abordagem dos CP nos cursos de graduação em Medicina. **MÉTODO:** Estudo de caso único, com triangulação de dados provenientes de revisão rápida, pesquisa documental e entrevista com especialista. Para a análise de conteúdo, serão consultadas as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina atualizadas e a Política Nacional de Cuidados Paliativos. O trabalho está em fase inicial, não tendo sido tramitada demanda ao CEP. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que a caracterização da carga horária dedicada aos CP, a identificação dos temas abordados, a análise da metodologia utilizada e a avaliação da percepção de especialista fomentem a reflexão sobre a formação dos futuros médicos generalistas, evidenciando-se as convergências e divergências curriculares e as recomendações normativas.

22 - ANÁLISE DOS DISCURSOS SOBRE A ESCOLHA PELA PROFISSÃO DE PRIMEIRANISTAS DO CURSO DE MEDICINA DE UMA FACULDADE PÚBLICA PAULISTA

PINELI, S. S. DE S.; COSTA, V. S.; PIO, D. A. M.; NONATO, A. C.

Faculdade de Medicina de Marília

samantha.santos.pineli@gmail.com

INTRODUÇÃO: A definição por uma carreira profissional ocorre na adolescência e envolve fatores intrínsecos, extrínsecos e interpessoais. Nesse sentido, a escolha pela medicina envolve um contexto estressante de pré-vestibular, com alta concorrência. Dado o contexto, questiona-se o que sustenta a contínua aspiração dos estudantes à carreira médica, apesar do caminho árduo para o ingresso à universidade, permitindo a manutenção de uma concorrência acirrada apesar do aumento da oferta de vagas. **OBJETIVO:** Busca-se compreender a motivação dos estudantes ingressantes de uma faculdade pública do interior paulista a comprometerem-se com a carreira médica. **MÉTODOS:** Foram efetuadas oito entrevistas presenciais a partir de um roteiro semiestruturado com primeiranistas em 2023 do curso de medicina de uma faculdade pública paulista, selecionados por amostragem em bola de neve e saturação teórica. As entrevistas foram transcritas na íntegra e estão em análise segundo os preceitos do Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS), que envolve a formação de categorias a partir da avaliação dos textos e da paralinguagem registrada, permitindo a identificação dos aspectos tanto individuais como comuns entre os entrevistados após uma visita intra e intersujeitos aos textos em "vai-e-vem". **RESULTADOS PARCIAIS E CONCLUSÕES:** Houve uma similaridade dos discursos conforme o perfil dos participantes. Aqueles em que a escolha foi refletida de forma direta, como por exemplo, após vivências em graduações prévias e necessidade de começarem uma nova graduação, apresentam um discurso mais consistente, com menos contradições e respostas objetivas. Já aqueles que ingressaram diretamente do Ensino Médio ou independente do tempo de cursinho, mantiveram-se na mesma rotina, sem algum desafio que colocaria a escolha em pauta, geralmente, apresentam certa imaturidade do discurso, visto que algumas reflexões eram feitas durante a entrevista, com mais pausas, negações e contradições, diferente do primeiro grupo, que já tinha uma percepção amadurecida das escolhas, achado que não foi explorado por outras literaturas.

23 - ATITUDES E CRENÇAS DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA SOBRE DOR LOMBAR – UM PROJETO DE PESQUISA

CHAGAS, A.S.¹; SANTOS, L.M.¹; ALVAREZ, I.F.²; CHAMOUTON, C.S.³; ZANCA, G.G.^{1,2}

1. Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Estadual Paulista - Câmpus de Marília

2. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Universidade Estadual Paulista – Campus Rio Claro

3. Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Estadual Paulista - Câmpus de Marília

andre.chagas@unesp.br

INTRODUÇÃO: A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, não necessariamente associada a uma lesão tecidual. A dor lombar é a sexta condição que mais acarreta em anos vividos com incapacidade entre a população de 50 a 74 anos de idade e a 13ª entre pessoas com 75 anos ou mais. Cerca de metade das pessoas que têm um episódio de dor lombar evolui para novos episódios, com uma trajetória de dor recorrente ou persistente e em cerca de um terço dos casos a recorrência ocorre dentro do período de 12 meses do primeiro episódio. O tratamento da dor lombar deve ser baseado no modelo biopsicossocial de atenção à saúde e, portanto, é fundamental que fisioterapeutas sejam formados para oferecer uma atenção baseada no modelo biopsicossocial a pessoas com dor lombar. **OBJETIVOS:** Descrever atitudes e crenças sobre dor lombar entre estudantes de graduação em fisioterapia, identificando o predomínio biomédico ou biopsicossocial em diferentes séries do curso; e identificar possíveis relações com aspectos sociodemográficos. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética da UNESP (Parecer 6.932.677). Serão incluídos 80 estudantes de graduação em fisioterapia, de diferentes séries de formação. Para avaliação do conhecimento sobre dor lombar, será utilizada a versão brasileira da Pain Attitudes and Beliefs Scale for Physiotherapists (PABS.PT), que possui duas subescalas, a biomédica e a biopsicossocial. Os dados serão analisados utilizando o software SPSS e os escores em cada subescala da PABS.PT serão comparados entre os grupos de estudantes de cada série por meio da análise de variância, considerando alfa de 5%. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que os estudantes apresentem maior nível de conhecimento sobre dor lombar ao longo dos anos de formação, porém ainda com lacunas relevantes no último ano do curso com relação às influências de fatores psicológicos e sociais, além dos fatores biológicos.

Agradecimento: À Reitoria/Unesp pela Bolsa de Iniciação Científica.

24 - ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DA CORRENTE SANGUÍNEA RELACIONADA A CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UTI PEDIÁTRICA E NEONATAL

NASCIMENTO, G.R.; MELLO, C.H.M.S.

Faculdade de Medicina de Marília

gioroberta12@gmail.com

INTRODUÇÃO: As infecções relacionadas à assistência à saúde, frequentemente causadas por microrganismos hospitalares, devido a procedimentos invasivos, como a inserção de cateteres, especialmente o cateter central de inserção periférica (PICC), comum em pediatria e neonatologia. O PICC é utilizado para terapias intravenosas prolongadas e a duração de seu uso aumenta o risco de infecção. Este estudo destaca a importância do conhecimento e atuação da equipe de enfermagem na prevenção e controle de infecções primárias da corrente sanguínea. **OBJETIVO:** verificar se a inspeção diária do local de inserção do cateter e a higienização das mãos antes e após a manipulação são práticas adotadas para prevenir infecções relacionadas ao PICC em UTIs neonatais e pediátricas. **METODOLOGIA:** pesquisa exploratória qualitativa e quantitativa com enfermeiros e técnicos de enfermagem de um hospital no interior de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas gravadas em outubro e novembro de 2023, e a análise foi realizada utilizando-se a Análise de Conteúdo, estatística descritiva e inferencial. **RESULTADOS:** as práticas de controle e prevenção de infecções associadas ao PICC são semelhantes entre os profissionais estudados. As ações incluem a inspeção diária do cateter em busca de sinais de infecção, higienização das mãos com clorexidina degermante, uso de luvas, desinfecção das conexões com álcool 70% antes de realizar as medicações, e cuidados na manutenção do cateter, como o uso de seringas acima de 10ml e flushing com soro fisiológico 0,9%. **CONCLUSÃO:** a inspeção diária do local de inserção e a higienização das mãos são práticas essenciais para a prevenção e controle de infecções relacionadas ao PICC, complementadas por outras ações igualmente importantes adotadas pelos profissionais de saúde.

25 - ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO E DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM RECÉM-NASCIDOS NO PRONTO SOCORRO

MAGALHÃES, G.C.M.¹; VERNASQUE, J.R.S.²; MARIN, M.J.S.³

Faculdade de Medicina de Marília

geovannamagalhaes394@gmail.com

Introdução: Em situações de urgência e emergência com recém-nascidos, crianças de 0 a 28 dias de vida, é necessário que toda a equipe de saúde nos serviços de urgências e emergências pediátricas estejam preparadas para o atendimento oportuno às necessidades de saúde. Neste contexto, dentre os profissionais de saúde que atuam no cuidado, encontram-se os enfermeiros e a equipe de enfermagem, maior força de trabalho no campo da saúde. A atuação competente destes profissionais está diretamente relacionada aos conhecimentos, habilidades e atitudes sobre essa faixa etária específica, e determinará o sucesso prático do cuidado aos recém-nascidos que precisam de atendimento numa situação de urgência. **Objetivo:** Compreender a atuação do enfermeiro e da equipe de enfermagem em situações de urgência e emergência com recém-nascidos em um hospital escola do centro oeste paulista. **Método:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utilizará como referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com enfermeiros e equipe de enfermagem que atuam no serviço de urgência e emergência de um hospital escola do centro oeste paulista, e também observação participante dos atendimentos aos recém-nascidos. A amostra será determinada por meio da saturação teórica. O projeto de pesquisa será apreciado pelo Comitê de Ética antes de sua execução. **Resultados Esperados:** Espera-se compreender a atuação do enfermeiro e da equipe de enfermagem no atendimento ao recém-nascido, bem como construir e validar um modelo teórico com os dados referentes às experiências e vivências dos profissionais participantes, buscando dessa maneira aprimorar o cuidado em saúde bem como ampliar os conhecimentos acerca dessa área pouco explorada.

26 - AUTOIMAGEM E AUTOCUIDADO EM RELAÇÃO A OSTOMIAS INTESTINAIS E O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

LIRA, V.A.S.; GIMENEZ, F.V.M.

Faculdade de Medicina de Marília

vitória_as.lira@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O sistema excretor é responsável pela eliminação de substâncias tóxicas para o nosso organismo, mas frente a algumas doenças são necessários alguns procedimentos cirúrgicos para melhorar o seu desempenho. Nos casos de tumores, doenças inflamatórias ou má formações, muitas vezes é indicado a realização de estomas, uma abertura artificial de órgãos ou vísceras até o meio externo para drenagem de substâncias do sistema digestório, urinário ou respiratório. Verifica-se que há diversos fatores que interferem na qualidade de vida de pessoas com ostomias que levam ao afastamento do mundo do trabalho e convívio social. **OBJETIVO:** analisar como a relação profissional, paciente e família pode auxiliar a pessoa com ileostomia/colostomia na aceitação de sua imagem e no seu autocuidado domiciliar. **MÉTODO:** Pretende-se realizar uma revisão integrativa de literatura nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e *Web of Science* (WOS) por artigos sobre a temática, publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português e espanhol, por meio de descritores selecionados no site dos Descritores da Saúde. Serão excluídas teses, dissertações, editoriais e outros artigos que não estejam relacionados a pesquisa. Os artigos serão avaliados segundo autores, ano, país, base dados, objetivo, tipo de pesquisa, nível de evidência, principais resultados e conclusão e resposta frente à pergunta de pesquisa. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se a partir dos resultados desse estudo o esclarecimento sobre a atuação e orientações de profissionais de saúde para colaborar na promoção do autocuidado e melhora da autoestima, bem como a reinserção social e familiar de pacientes com ostomias intestinais, além de evidenciar a importância de cada membro no pré e pós-operatório dos pacientes em questão.

27 - AVALIAÇÃO DAS VIAS DE SENSIBILIZAÇÃO SUBCUTÂNEA E INTRANASAL NO DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO ANIMAL PARA ASMA ALÉRGICA

MACHADO, L. F.¹; MESQUITA, M. P.¹; MONTEIRO, E. S.²; MARTINS, L. P. A.¹

1. Faculdade de Medicina de Marília

2. Universidade de São Paulo

lais.fernanda1904@gmail.com

INTRODUÇÃO: A grande maioria dos casos de asma, doença de grande incidência global, é causada pela exposição repetida a alérgenos e caracterizada por obstrução do fluxo aéreo, hiperresponsividade das vias aéreas e seu remodelamento, hiperprodução de muco pelas células caliciformes e inflamação pulmonar. Nesta doença, a inflamação é estabelecida devido à ativação de células imunes inatas, seguida por reações orquestradas pelas células Th2 e síntese exacerbada de IgE específicos do alérgeno. O uso de modelos animais para compreender a fisiopatologia da asma é relevante para o esclarecimento dos mecanismos subjacentes a essas respostas inflamatórias e avaliação da eficácia de novas terapias. Tais modelos apontam que as respostas imunológicas e os resultados fisiológicos dependem do protocolo de sensibilização, como a via utilizada, concentração do alérgeno e tempo de exposição. **OBJETIVO:** Desenvolver um modelo murino fisiopatologicamente relevante através da comparação entre a sensibilização da via subcutânea e intranasal e assim, contribuir para a avaliação da imunoterapia alérgeno específica à base de ácaros de poeira domiciliar. **MÉTODO:** o modelo murino de asma alérgica será induzido pelo alérgeno natural do ácaro presente na poeira doméstica em 20 camundongos BALB/c com 6 a 8 semanas de idade, para que, assim, possa ser determinada a gravidade das respostas inflamatórias através da via intranasal e subcutânea. Para determinar tal resposta, será realizada a contagem de eosinófilos no lavado broncoalveolar por hemocitometria, análise da histologia pulmonar e medição de IgE sérica. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que o extrato seja capaz de levar às respostas inflamatórias e que a via intranasal seja mais eficiente na evocação destas. Assim, com um modelo animal robusto, atualizações sobre o tratamento da asma podem ser realizadas, aumentando a qualidade de vida de milhares de pessoas não apenas no Brasil, mas no mundo, devido às altas incidências e prevalências de tal doença.

Agradecimento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Processo no 125173/2024-5.

28 - AVALIAÇÃO DO USO DE ADJUVANTES NA MELHORA DA RESPOSTA IMUNE FRENTE A ALÉRGENOS

MINAMI, L. O.¹; RODRIGUES, K. M.¹; MONTEIRO E. S.²; MARTINS L. P. A.¹

1. Faculdade de Medicina de Marília

2. Universidade de São Paulo

lauraminami14@gmail.com

INTRODUÇÃO: A asma é uma das doenças crônicas mais comuns em todo o mundo, afetando quase 30% da população mundial. É caracterizada por uma resposta imunológica exacerbada que se desenvolve pela sensibilização a determinados antígenos presentes no ambiente. Essa resposta é mediada pela via inflamatória do tipo Th2, facilitando a produção de IgE e o recrutamento de eosinófilos e outras células que vão desencadear uma resposta alérgica nos pulmões, causando inflamação brônquica e broncoespasmo. Atualmente, o tratamento sintomático pode ser complementado com a imunoterapia com alérgenos (AIT), sendo que esta se apresenta como o único tratamento para casos de asma desencadeada por alérgenos imunologicamente comprovados. Adjuvantes de primeira geração, como o hidróxido de alumínio, são sistemas de entrega com efeito de depósito, que prolongam a permanência do alérgeno no local da deposição, de modo que estimula a produção de anticorpos, ademais, promove a conversão do antígeno solúvel em uma forma particulada que será fagocitada por células apresentadoras de antígenos e induzindo inflamação.

OBJETIVOS: Avaliar o uso de adjuvantes na melhora da resposta imune frente à alérgenos.

MÉTODOS: 10 camundongos BALB/c, fêmeas, de 6 a 8 semanas de idade serão sensibilizados com um extrato de ácaros de poeira (HDM) adsorvidos no adjuvante hidróxido de alumínio em diferentes dosagens e 10 camundongos com solução salina para o controle. Após a sensibilização e desafio dos animais, eles serão eutanasiados em câmara de CO₂, para análise de sangue, líquido broncolveolar e histologia pulmonar.

RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se desenvolver um modelo animal de asma alérgica e avaliar a dosagem de hidróxido de alumínio adequada para a sensibilização do modelo murino. Portanto, a análise da melhora na resposta imune frente a alérgenos com diferentes doses do adjuvante hidróxido de alumínio, poderia contribuir para a produção de um modelo animal que mimetize a resposta alérgica, mas especificamente a asma, através da produção aumentada de IgE pela ativação da via Th2.

29 - CANABIDIOL E SEUS EFEITOS SOBRE ANSIEDADE E DEPRESSÃO: REVISÃO LITERÁRIA

GODOY, L.; COSTA, C. A. R. A.

Faculdade de Medicina de Marília

lauragodo58@gmail.com

Introdução: Transtornos de ansiedade e depressão são amplamente prevalentes e afetam cada vez mais pessoas globalmente. O Canabidiol (CBD), uma substância pura e extraída da *Cannabis sativa*, tem atraído atenção por seu potencial terapêutico. Ele interage com o sistema endocanabinoide humano, incluindo os receptores CB1 e CB2, além dos receptores serotoninérgicos, como o 5HT1A, o que contribui para suas propriedades ansiolíticas, analgésicas e anti-inflamatórias. Esses efeitos sugerem que o CBD pode atuar de forma protetora em condições como ansiedade e depressão. **Justificativa:** Tratamentos tradicionais, como ansiolíticos e antidepressivos, são frequentemente limitados por efeitos adversos significativos. O CBD, em produtos já aprovados pela Anvisa no Brasil, surge como uma alternativa promissora, oferecendo regulação eficaz da atividade cerebral sem os efeitos adversos dos medicamentos tradicionais. **Objetivo:** Este trabalho teve como objetivo reunir informações sobre o uso terapêutico do CBD em pacientes com transtornos de ansiedade e depressão. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa de artigos dos últimos 20 anos, focando no impacto do CBD sobre a ansiedade e depressão. Realizado buscas nas bases PubMed, LILACS, Cochrane Library e Scielo, com termos específicos, abrangendo publicações de 2004 a 2024, selecionando artigos que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão, culminando na redação dos resultados e discussão final. **Resultados:** Estudos indicaram que o CBD reduziu significativamente os sintomas de ansiedade e depressão. Foram encontrados 8 estudos clínicos que demonstraram eficácia em transtornos como ansiedade generalizada e depressão, com poucos efeitos adversos. Além disso, o uso prolongado de CBD não apresentou risco de dependência. **Conclusão:** O CBD possui um perfil farmacológico extenso, interage com múltiplos sistemas de neurotransmissores e modula o sistema endocanabinoide. Oferece tratamento eficaz com menos efeitos adversos que os medicamentos tradicionais. A modulação do sistema endocanabinoide pelo CBD é uma estratégia promissora para o tratamento desses transtornos, destacando a importância de mais pesquisas sobre o potencial terapêutico da *Cannabis sativa*.

30 - CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE PRIMEIROS SOCORROS REALIZADAS NO AMBIENTE ESCOLAR

MENEZHINI, V. S.; GIMENEZ, F.V.M.; PINTO, A. A. M.; BARROS, A.J.X.

Faculdade de Medicina de Marília

vitoriamenegini26@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Programa Saúde na Escola (PSE) integra educação e saúde para melhorar a qualidade de vida dos estudantes da rede pública e visa promover práticas saudáveis, prevenir doenças e reduzir vulnerabilidades. Ações educativas no ambiente escolar são essenciais para fortalecer essa promoção e prevenção. Em consonância a isso, a Lei Lucas Nº 13.722, de 2018, destaca a importância da capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários escolares. Sendo assim, foi elaborada a seguinte questão norteadora deste trabalho: “como estão sendo desenvolvidas ações educativas sobre primeiros socorros no ambiente escolar?”. **OBJETIVO:** caracterizar como as ações educativas sobre primeiros socorros são realizadas no ambiente escolar, identificando os temas abordados e os profissionais que a realizam. **MÉTODO:** realizada uma Revisão Integrativa da Literatura com busca nas bases de dados BVS, LILACS, BDENF e MEDLINE. Foram incluídos textos completos publicados nos últimos cinco anos em português, inglês e espanhol. Os artigos foram analisados quanto a autores, título, ano, tipo de estudo, base de dados, nível de evidência, principais resultados, conclusão e a relação com a questão norteadora, utilizando a análise de conteúdo na Modalidade Temática. **RESULTADOS:** foram obtidos 513 artigos, sendo realizada a leitura de títulos e resumos, restando ao final 19 artigos que mantinham relação com a pergunta de pesquisa. Observou-se que são feitas por os profissionais e acadêmicos da área da saúde que usam estratégias de ensino aprendizagem como palestras e outros métodos ativos, como simulações nessas ações. Os temas mais abordados incluem parada cardiorrespiratória, engasgo, convulsões e avulsão dentária. **CONCLUSÃO:** os enfermeiros se destacam como principais instrutores nas capacitações, seguidos por dentistas, médicos, psicólogos e neurocientistas. Os professores são os principais participantes devido contato diário com os alunos. Os estudos analisados destacam a necessidade e efetividade de ações educativas contínuas sobre a temática no ambiente escolar.

31 - CITOMEGALOVÍRUS NA GESTAÇÃO/PARTO/PUERPÉRIO: CONSEQUÊNCIAS PARA O RECÉM-NASCIDO E LACTENTE E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO – UMA REVISÃO INTEGRATIVA

BRITO, E. S.; Peres, A. M.

Faculdade de Medicina de Marília

emilly.sbrito19@gmail.com

INTRODUÇÃO: O citomegalovírus (CMV) é um patógeno que afeta diversas populações globalmente, associado a infecções congênitas e perinatais. Pertencente à família Herpesviridae, o CMV tem alta prevalência, especialmente em regiões com menor status econômico. O vírus é transmitido através de fluidos corporais e pode infectar o feto em infecções primárias maternas e reativações. Aproximadamente 60-90% dos bebês nascem com sintomas, que podem incluir icterícia, microcefalia, baixo peso, hepatoesplenomegalia, convulsões e perda auditiva bilateral. Já os assintomáticos podem desenvolver complicações a longo prazo, como perda auditiva unilateral, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, perda de visão, microcefalia e convulsões. A escolha deste tema é justificada pela necessidade de aumentar a conscientização sobre os riscos associados à infecção por CMV durante a gestação, visto que é uma das principais causas de infecções congênitas. **OBJETIVO:** Este estudo visa compreender as consequências do CMV adquirido durante a gestação, parto e puerpério, assim como as implicações para o recém-nascido e lactente. Além disso, busca explorar as práticas de prevenção e intervenção. **MÉTODO:** A metodologia utilizada é uma revisão integrativa da literatura (RIL), que busca unir conhecimentos e evidências práticas sobre o tema. A pesquisa foi estruturada com a estratégia PICO, considerando população, intervenção, comparação e desfecho. A busca por material foi realizada em diversas bases de dados, incluindo Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), resultando em 1.234 documentos. **RESULTADOS ESPERADOS:** Melhor compreensão das consequências para recém-nascidos e lactentes do CMV, identificação de práticas eficazes de prevenção e intervenção, e aumento da conscientização sobre os riscos do CMV. Os achados poderão contribuir para diretrizes clínicas e campanhas de educação em saúde, além de servir como base para futuras pesquisas.

32 - COMPARAÇÃO ENTRE INTERNAÇÕES DE MENINGITE VIRAL NO ESTADO DE SÃO PAULO E NA CIDADE DE MARÍLIA, ENTRE OS ANOS DE 2019 A 2024

COELHO, N. S. L.¹; RIGO, B. G.²; OLIVEIRA, G. S.³; NETTO, P. C. M.⁴; PARISI, J. I. A. L.⁵; ALMEIDA, S. L.⁶; VELOSO, M. S.⁷

1. Discente de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)
2. Discente de Medicina da Universidade Nove de Julho, São Paulo
3. Discente de Medicina Universidade Nove de Julho, Bauru
4. Discente de Medicina Universidade Nove de Julho, Bauru
5. Discente de Medicina Universidade Nove de Julho, Vergueiro
6. Discente de Medicina Universidade Nove de Julho, Bauru
7. Discente de Medicina Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida

nicoleslcoelho20@gmail.com

INTRODUÇÃO: Meningite consiste em inflamação das meninges, membranas que revestem o Sistema Nervoso Central, e pode ser causada por infecção viral. Tal moléstia pode ocasionar sinais/sintomas incapacitantes, como enrijecimento nuchal e miocardite. Considerando o mau prognóstico associado a ela, o mapeio da incidência é de extrema relevância para a formulação de ações preventivas. **OBJETIVOS:** O objetivo deste trabalho é comparar as internações por meningite viral no estado de São Paulo e em Marília entre 2019 e 2024. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo. Os dados foram coletados do DATASUS, considerando o período selecionado e as seguintes variáveis: ano, faixa etária, sexo, cor e tipo de atendimento. **RESULTADOS:** Entre 2019 e julho de 2024, foram notificados 3.184 casos de meningite viral no estado de São Paulo, que possui 44.420.459 habitantes, representando cerca de 0,0072% da população. Em Marília, com 237.627 habitantes, foram registrados 25 casos, equivalente a 0,0105% da população, indicando maior incidência proporcional na cidade. O pico em Marília foi em 2020, com 8 internações, enquanto no estado foi em 2019, com 239 casos. A faixa etária mais afetada foi a de menores de 1 ano, com 9 casos em Marília e 752 no estado. Houve leve predominância masculina (13 casos em Marília e 1.801 no estado). Entre as cores, predominam brancos (1.668 no estado, 19 em Marília) e pardos (965 no estado, 5 em Marília). Internações de urgência representaram 96% em Marília e 97% no estado. **CONCLUSÕES:** Em síntese, no período analisado, observa-se que, embora Marília represente apenas 0,78% dos casos de internações por meningite viral, as características epidemiológicas do Estado e do município são semelhantes. A predominância de internações em crianças menores de 1 ano e a leve superioridade de casos no sexo masculino reforçam a necessidade de vigilância contínua. Além disso, o elevado número de atendimentos de urgência evidencia a importância de ações preventivas, para minimizar os impactos da doença na população.

33 - COMPREENDENDO O TERRITÓRIO COMO PRODUTOR DE SAÚDE

MARQUEZINI, V. H. M.; ARAKI, A. V. T.; OLIVEIRA, B. C. S. O.; JANUARIO, F. G.; CALDAS, G. B. R.; QUEIROZ, G. V. C.; SIGNORINI, I. T.; STRABELLI, J. D.; ALVES, L. A.; MORILHA, L. M.; SILVA, M. E.; SILVA, S. F. D.; FREITAS, T. A.; REZENDE, K. T. A.; AGGIO, C. M.

Faculdade de Medicina de Marília

vitormarquezini8@gmail.com

INTRODUÇÃO: Na Atenção Básica, a territorialização envolve o mapeamento demográfico, epidemiológico, social e ambiental da comunidade, identificando grupos vulneráveis, necessidades locais e fortalecendo vínculos para intervenções personalizadas e eficazes. **OBJETIVO:** Explicitar a compreensão do território como produtor de saúde e da Estratégia Saúde da Família (ESF) na identificação das necessidades de saúde. **MÉTODO:** Relato de experiência de ciclo pedagógico por estudantes do primeiro ano de Enfermagem e Medicina, de Instituição de Ensino Superior pública e paulista, cujo currículo é anual e baseado em: Atividades de Extensão e Complementares, Unidade Educacional Sistematizada (UES) e Unidade de Prática Profissional (UPP) realizada nas Equipes de Saúde da Família (ESF). **RESULTADOS.** Em 2024, os estudantes conheceram o território de uma das 59 eSF de um município de grande porte. Da discussão das narrativas reflexivas sobre essa vivência emergiu o seguinte problema de aprendizagem: desconhecimento sobre a finalidade e o processo da territorialização em saúde, devido ao conhecimento embrionário sobre este processo na ESF. O compartilhamento das buscas qualificadas sobre o por que e como definir um território de ESF produziu a seguinte síntese: “É importante resgatar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial, a descentralização, uma vez que a definição de territórios menores, sob a responsabilidade do município, se faz necessário para concretizar o ideário. O território é compreendido como processo pelo qual pessoas, grupos, organizações e instituições se fixam em um espaço, em determinado tempo e momento, e no qual organizam e estabelecem interações, vivências e relações sociais que possibilitam criar identidade, vínculo e pertencimento ao lugar. Assim, o seu reconhecimento é um processo dinâmico e sua promoção deve ser contínua.” **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A vivência territorial e a interação com a ESF favoreceram o desenvolvimento de competências essenciais à compreensão das dinâmicas sociais e ambientais a prática na ESF, alinhando-a aos desafios da saúde pública no Brasil.

34 - COMPREENDENDO OS EFEITOS DO FORMOTEROL NA PRESSÃO ARTERIAL: PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

PRATES, G.M.¹; SOUZA, N.²; PORTO, A.A.²; GARNER, D.M.³; RAIMUNDO, R.D.⁴; VALENTI, V.E.²

1. FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
2. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
3. UNIVERSIDADE OXFORD BROOKES
4. FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

guimelotiestuda@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O Formoterol é um β 2-agonista de longa duração que promove broncodilatação para melhorar a função pulmonar. Ele tem sido utilizado em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e em pacientes com asma, mostrando efeitos positivos, como redução da dispneia. Em geral, o Formoterol é bem tolerado, entretanto há estudos que apontam interferências do medicamento no sistema cardiovascular, como leves alterações na pressão arterial, causando efeitos como tremedeiras e palpitações. **OBJETIVOS:** O objetivo desta revisão sistemática e potencial meta análise é analisar os efeitos do Formoterol sobre a pressão arterial na intenção de confirmar ou de rejeitar sua segurança cardiovascular. **MÉTODOS:** A revisão será relatada de acordo com as recomendações da PRISMA. As buscas serão realizadas nas bases de dados EMBASE, MEDLINE/PubMed, Scopus e Web of Science com o envio de palavras-chave referentes aos termos de Formoterol e Pressão Arterial. **Crterios de exclusão ou inclusão:** Pacientes com mais de 18 anos; o grupo de intervenção deve receber Formoterol isolado ou combinado com outro medicamento; para os grupos de comparação, incluiremos estudos que avaliaram indivíduos que receberam placebo ou outra terapia; o interesse será a pressão arterial sistólica, diastólica e média; incluiremos estudos sem cegamento, com cegamento simples ou duplo, controle randomizado e desenho crossover. Esta investigação será limitada a artigos publicados em periódicos revisados por pares e escritos em inglês. Analisaremos a possibilidade de conduzir meta análise e realizaremos análise do risco de viés e nível de evidência. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que o Formoterol não promova alterações significativas na pressão arterial e que haja a confirmação de sua segurança cardiovascular.

35 - COMPREENSÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DAS MULHERES SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO CICLO GRAVÍDICO PUERPERAL

PELLEGRINI, L. A.¹; MESQUITA, M. P.¹; TAKEDA, E.²; MAZZETTO, F. M. C.²

1. Graduandas em Medicina da Faculdade de Medicina de Marília

2. Docentes da Faculdade de Medicina de Marília

lara.pellegrini09@gmail.com

INTRODUÇÃO: No último século, o parto sofreu drásticas mudanças, deixando de ser um processo caseiro e realizado por parteiras. Atualmente, o parto é mais técnico, realizado por profissionais de saúde, contribuindo para intervenções muitas vezes excessivas. Surge então o conceito de violência obstétrica, uma questão de saúde pública que atravança o almejado parto humanizado. **OBJETIVO:** investigar a percepção de mulheres e de profissionais de saúde sobre violência obstétrica e relacionar se tal conhecimento resulta em uma assistência humanizada. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (RIL) que utilizará a seguinte questão norteadora: como o conhecimento sobre violência obstétrica por médicos, enfermeiros e mulheres no ciclo gravídico puerperal afeta o atendimento humanizado. Realizar-se-á levantamento bibliográfico nas bases de dados Lilacs, Bdenf, Index-Psicologia, Medline, Scopus e Web of Science, utilizando o mnemônico PICO. Estabeleceu-se como critérios de inclusão: artigos indexados nos idiomas inglês, português e espanhol nos anos de 2019 a 2024 que respondam à pergunta de pesquisa e de exclusão: dissertações, teses, manuais, anais de congresso, livros, protocolos, editoriais e artigos de revisão. Os descritores utilizados serão violência obstétrica, médicos, obstetra, enfermeiros e enfermeiras, gestantes, período pós-parto e parto. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se identificar o conhecimento dos profissionais de saúde e das mulheres no ciclo gravídico puerperal sobre violência obstétrica e relacionar se tal conhecimento resulta em uma assistência humanizada.

36 - CONCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS DE MÃES E FAMILIARES SOBRE CUIDADO CENTRADO NA FAMÍLIA NA UNIDADE NEONATAL: ABORDAGEM QUALITATIVA

Brito, E.S.; Dias, A.L.G.; Santiloni, A.F.P.

Faculdade de Medicina de Marília

emilly.sbrito19@gmail.com

INTRODUÇÃO: O nascimento de um bebê provoca uma reorganização familiar, especialmente para a mãe, que precisa aceitar a transição do “bebê imaginário” para o “bebê real”. Essa adaptação é essencial para que a relação entre mãe e filho se desenvolva de modo saudável. No Brasil, o cuidado ao recém nascido (RN) é dividido em três tipos: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, Unidades de Cuidados Intermediários Neonatais e Sistema de Alojamento, com diferentes níveis de assistência conforme as necessidades do bebê. Quando o RN precisa de cuidados intensivos e é separado dos pais, a interrupção do vínculo pode gerar insegurança e angústia, afetando a confiança dos pais no cuidado. Para enfrentar esses desafios, o Cuidado Centrado na Família (CCF) coloca a família no centro das decisões de saúde, pois a construção de confiança entre a equipe e a família são fundamentais para garantir o cuidado e promover o bem-estar do RN e cuidadores. **OBJETIVO:** Identificar as concepções e experiências de mães, pais e familiares em relação ao CCF durante a internação de seus bebês na Unidade Neonatal. **MÉTODO:** O estudo é de natureza qualitativa e adota como referencial metodológico o CCF a partir das experiências vivenciadas por mães e familiares de bebês internados em duas Unidades Neonatais de municípios do interior paulista. A coleta de dados será por meio da realização de entrevista semiestruturada, que será gravada, transcrita e apagada posteriormente. O referencial metodológico para a sistematização dos dados coletados foi o Método de Análise de Conteúdo, na vertente temática, segundo Bardin. Antes da realização das entrevistas, os participantes serão esclarecidos sobre os objetivos e procedimentos utilizados na pesquisa. Em seguida, serão convidados a participar e, concordando, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O presente projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília, por meio da Plataforma Brasil. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se com esse estudo, compreender as concepções dos familiares de neonatos internados em UTI's do município, bem como as potencialidades e fragilidades desses cenários no cuidado centrado na família.

37 - CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA SOBRE NEUROFISIOLOGIA DA DOR - UM PROJETO DE PESQUISA

SANTOS, L.M.¹; CHAGAS, A.S.¹; ALVAREZ, I.F.²; CHAMOUTON, C.S.³; ZANCA, G.G.^{1,2}

1. Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Estadual Paulista - Câmpus de Marília

2. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Universidade Estadual Paulista – Câmpus Rio Claro

3. Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Estadual Paulista - Câmpus de Marília

luana.matsumoto@unesp.br

INTRODUÇÃO: A dor, seja aguda ou crônica, é uma condição frequente na prática clínica dos profissionais da área da saúde, principalmente para os fisioterapeutas que atuam com objetivo terapêutico de reduzir a intensidade da dor e as disfunções associadas a ela. Nesse sentido, é necessário que esse conteúdo seja desenvolvido durante a formação desses profissionais, para que obtenham um nível adequado sobre os mecanismos e múltiplas dimensões da dor. A Associação Internacional para Estudo da Dor (IASP - International Association for the Study of Pain) apresenta recomendações do conteúdo sobre dor que deveria ser abordado na formação de fisioterapeutas, dentre as quais destacam-se aspectos relacionados à neurofisiologia da dor. **OBJETIVO:** Descrever o conhecimento sobre neurofisiologia da dor de estudantes de um curso de Fisioterapia e comparar entre as diferentes séries de formação. **MÉTODOS:** Este estudo transversal foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FFC (parecer de aprovação nº 6.932.677). Serão incluídos 80 indivíduos que estejam regularmente matriculados no curso de Fisioterapia, de diferentes séries de formação. Serão excluídos indivíduos que tenham concluído formação prévia na área da saúde; indivíduos que não tenham cursado as disciplinas na ordem proposta na matriz curricular do curso, independente do motivo. A coleta de dados será realizada por meio de um formulário online, será aplicado a versão brasileira do Revised Neurophysiology of Pain Questionnaire (NOGUEIRA et al., 2018) para avaliação de conhecimento sobre neurofisiologia da dor. Será utilizado o software SPSS. Inicialmente, os dados serão analisados de forma descritiva, por meio da frequência de respostas corretas para cada um dos itens do questionário. Será considerado um nível de significância de 5%. **RESULTADOS ESPERADOS:** Identificar as principais lacunas desse tema ao longo da formação de estudantes de um curso de Fisioterapia, contribuindo para a reflexão e discussão sobre o ensino da dor nos cursos da saúde.

38 - CONHECIMENTO DOS PACIENTES EM RELAÇÃO À TERAPÊUTICA ANTICOAGULANTE ORAL E ADEÇÃO AO TRATAMENTO

ROSA, M.A.; LEITE, I.B.; NARDINI, J.G.; CHIES, A.B.; PINHEIRO, O.L.

Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde
Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA

andrietimayssa@gmail.com

INTRODUÇÃO: Os antagonistas da vitamina K, como a varfarina, são utilizados na prevenção de doenças tromboembólicas, porém possuem janela terapêutica estreita e diversas interações com medicamentos e alimentos. Dessa forma, o conhecimento dos pacientes sobre a terapêutica com anticoagulantes orais (ACO) representa um aspecto importante para uma correta adesão ao tratamento e controle da coagulação por meio do *International Normalized Ratio* (INR). **OBJETIVO:** Verificar os conhecimentos dos pacientes em relação à terapêutica anticoagulante oral e também o grau de adesão ao tratamento. **MÉTODO:** Participaram do estudo pacientes do ambulatório de anticoagulação de um hospital de ensino do interior do estado de São Paulo (n=35). Os conhecimentos foram verificados por meio do questionário “Conhecimentos sobre Anticoagulantes Orais”, e a adesão com a Escala de Adesão Terapêutica de Morisky. Os dados referentes ao INR dos pacientes foram verificados no momento da entrevista. **RESULTADOS:** A amostra caracterizou-se principalmente por sexo feminino (60%), idade média de 65 anos e a maioria declarou-se casada (48,6%). A maioria possuía ensino fundamental incompleto (57,1%) e fazia uso do ACO há mais de 1 ano (85,7%). As principais indicações de ACO foram: Implante de prótese valvar cardíaca (31,4%), Infarto agudo do miocárdio (17,1%) e outros (25,7%), sendo que a maioria destes não soube exemplificar. Em relação aos anticoagulantes a amostra apresentou médio (51,4%) e baixo (48,6%) conhecimentos sobre esses medicamentos. Em contrapartida, a maioria dos pacientes (65,7%) mostrou grande aderência ao tratamento. Sobre os valores de INR no dia da entrevista, apenas 51,5% estavam dentro do intervalo terapêutico adequado. **CONCLUSÃO:** O questionário utilizado nesse estudo mostrou que os pacientes não possuem conhecimentos adequados sobre esse tratamento farmacológico, podendo justificar os resultados encontrados nessa população que, apesar de alta adesão, apresentaram INR inadequado.

39 - CONHECIMENTO DE MULHERES SOBRE A MENOPAUSA E O CLIMATÉRIO E SEUS SINTOMAS RELACIONADO A ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E ESTADO MENOPAUSAL: ANÁLISE QUANTITATIVA POR MEIO DE INQUÉRITO POPULACIONAL DE MULHERES NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA

AZEVEDO, N. R.¹; FERREIRA, D. F.²; MARQUEZINI, V. H. M.³; JAMBERCI, M. M.⁴; BAPTISTA, C.B.⁵; TONHOM, S. F. R.⁶; PERES, C. R. F. B.⁷.

1, 2, 3, 4, 5. Discentes de medicina da Faculdade de Medicina de Marília

6, 7. Docentes da Faculdade de Medicina de Marília

nataliazvedo@gmail.com

INTRODUÇÃO: O climatério é o período de transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva da mulher, marcado por declínio hormonal e sintomas físicos e emocionais. Além disso, envolve questões socioculturais, como preconceitos e desinformação, que afetam diretamente as mulheres. A literatura aponta para a falta de conhecimento das mulheres sobre esse período. Assim, o estudo partirá da pergunta: "Como condições sociais (escolaridade, renda, cor) e biológicas (idade, estágio climatérico) se relacionam com o nível de conhecimento sobre climatério e menopausa das mulheres em Marília?" **OBJETIVO:** Analisar o conhecimento das mulheres, na cidade de Marília, acerca do climatério e da menopausa, associando-se com dados socioeconômicos e biológicos. **MÉTODO:** O projeto foi aprovado pelo CEP da Faculdade de Medicina de Marília e pelo COMAP da Secretaria de Saúde de Marília. Será realizada pesquisa exploratória, descritiva, quantitativa e transversal. Os dados serão coletados por meio de questionário estruturado com cinco seções: identificação, avaliação socioeconômica, conhecimento, percepção e estágio menopausal. A amostragem será feita por conglomerado. Os locais de estudo serão as Unidades de Saúde da Família Costa e Silva, Jardim Teruel, JK e Novo Horizonte. As participantes serão mulheres de 30 a 59 anos, selecionadas por meio de sorteio da lista de pacientes de cada unidade nessa faixa etária. Depois, as mesmas serão convidadas por telefone a participar do estudo. A análise dos dados usará os testes Qui-quadrado, T de Student, Anova-one-way, com nível de significância de 5%. Alternativamente, serão aplicados os testes não paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, e as comparações Post-Hoc pelo teste de Bonferroni. A pesquisa encontra-se na fase de início da coleta de dados. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que por meio dos resultados se seja possível analisar os conhecimentos das mulheres sobre o período de climatério e menopausa, articulando-se seus fatores biológicos e socioculturais, o que contribuirá para planejamento e implementação de ações de saúde para as mulheres nesse ciclo da vida.

40- CONTRIBUIÇÕES DE UMA LIGA ACADÊMICA DE CUIDADOS PALIATIVOS EM FACULDADE DE MEDICINA NO INTERIOR PAULISTA

SOUZA, E L.¹; BENTO, B. V.¹; HEREDIA, L. F.¹; ROCHA, V. M.¹; ZAITH, P. T. I.¹; FRANCISCHETTI, I.¹

1.Faculdade de Medicina de Marília

duda.coli@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Os cuidados paliativos ganharam destaque no século XX, atendendo às necessidades específicas dos pacientes. Com o aumento da expectativa de vida e a prevalência de doenças crônico-degenerativas, a demanda por esses cuidados cresce, com mais de 56 milhões de pessoas necessitando de suporte paliativo anualmente. No Brasil, há deficiências na formação de profissionais e nos serviços de saúde pública. Nesse cenário, ligas acadêmicas desempenham um papel importante na promoção de debates e ensino sobre o tema. **OBJETIVOS:** Analisar as contribuições de uma liga acadêmica de cuidados paliativos em uma faculdade de medicina paulista e avaliar o conhecimento dos estudantes. **MÉTODOS:** Pesquisa de campo, exploratória, transversal e quantitativa, utilizando a Palliative Knowledge Test Scale (PKTS). Participarão 640 estudantes de medicina e enfermagem. O questionário, com 40 questões de verdadeiro ou falso, aborda cinco temáticas. A análise dos dados será feita por estatísticas absolutas e relativas, comparando os resultados. **RESULTADOS E CONCLUSÕES:** Coletaram-se 100 respostas até o momento. 80% dos estudantes tiveram contato com o processo de adoecimento e morte, atribuindo alta importância ao conhecimento sobre cuidados paliativos. No entanto, apenas 29% tiveram contato formal na graduação, enquanto 36% tiveram por meio de atividades extracurriculares. A média de acertos aumentou conforme a progressão da graduação (52,5% – 68,25%), sendo maior no curso de medicina (62%) que em enfermagem (56,5%). Temas conceituais, como filosofia e comunicação, tiveram mais acertos em comparação às áreas técnicas, como manejo de dor e problemas psiquiátricos. A participação em ligas acadêmicas aumentou o percentual de acertos (64,75%) em comparação aos que não participaram (60%). Contudo, o conhecimento na área ainda é deficiente, e a estruturação de uma grade curricular em cuidados paliativos é necessária.

41 - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E RASTREIO DE AVALIAÇÕES DE PRONTIDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO FÍSICO DE ATLETAS: ANÁLISE POR SEXO

ROSSI, M.B.¹; SERANTOLA, J.C.¹; RODRIGUEZ, T.M.¹; OLIVEIRA, F.¹; SILVA, F.V.L.¹;SCIAMANA, C.¹; MILAN-MATTOS, J.C.¹; PANTONI, C.B.F.¹

1. Universidade Federal de São Carlos

marianaberetta@estudante.ufscar.br

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população brasileira está ocorrendo de forma acelerada. No entanto, viver mais não significa, necessariamente, viver com mais saúde, pois o envelhecimento pode estar associado ao aumento da incidência de doenças crônicas. A expectativa de vida do sexo feminino é maior, isto se deve a combinação de fatores biológicos, comportamentais e sociais. Além disso, há diferenças na maneira como homens e mulheres respondem ao estresse e à inflamação, o que impacta a saúde. Diante disso, é fundamental analisar o comportamento de ambos os sexos em relação aos cuidados com a saúde, prática de exercícios físicos e a realização de exames médicos antes de iniciar atividades físicas. **OBJETIVOS:** Avaliar e comparar dados sociodemográficos, clínicos e rastreio de avaliações de prontidão para a realização de atividade física de homens e mulheres atletas. **MÉTODOS:** Estudo observacional, transversal, quantitativo e descritivo. Serão avaliados indivíduos de ambos os sexos, com 25 anos ou mais e praticantes de esportes (competitivo ou amador) que serão alocados em grupos de acordo com o sexo. Eles responderão a: 1) Questionário sobre perfil sociodemográfico e clínico, tipo, frequência e duração do esporte, avaliações prévias e 2) Questionário para avaliação da prontidão para atividade física (PAR-Q+). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal de São Carlos. Para a comparação das variáveis quantitativas será utilizado o teste *t-student* ou *Mann-Whitney*, de acordo com a normalidade dos dados e para variáveis categóricas, o teste exato de Fisher, com $p < 0,05$. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se, com este estudo, identificar as diferenças no comportamento de homens e mulheres quanto ao cuidado com a saúde, permitindo um olhar mais específico e contribuindo para o aperfeiçoamento do cuidado à saúde destes participantes.

42 - DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA PARA ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE

BARROS, A.J.X; MARIN, M.J.S.; GIMENEZ, F.V.M.; VERNASQUE, J.R.S.; MASS, A.C.P.; OLIVEIRO, A.R.C.; OLIVEIRA, A.A.; GIMENEZ, F.V.

Faculdade de Medicina de Marília

anajuxavier52@gmail.com

INTRODUÇÃO: O desenvolvimento de games vem sendo proposto em todas as áreas do conhecimento, com vistas proporcionar uma aprendizagem efetiva, pautado em métodos ativos. Os games têm o potencial lúdico, informativo e reflexivo e acredita-se que eles podem ser utilizados para sensibilizar estudantes da área da saúde para temas relevantes para a saúde pública, como é o caso da violência contra a pessoa idosa. Desse modo, acredita-se na importância de desenvolver ações educativas por meio da gamificação visando preparar estudantes da área da saúde sobre a temática. **OBJETIVO:** Desenvolver um jogo sobre prevenção de violência contra a pessoa idosa voltada a universitários da área da saúde. **MÉTODO:** Trata-se de uma pesquisa metodológica, que é utilizada para o desenvolvimento de Tecnologias Cuidativo-Educacionais (TCE). O jogo foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores de diferentes áreas de formação e titulação, pautando-se em dados da literatura e em outras produções já elaboradas pelo grupo. A validação foi realizada pelo público alvo, utilizando um instrumento já validado que avalia conteúdo e a aparência do material elaborado, por meio de uma escala tipo *Liket* e os resultados calculados por meio do Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC), sendo considerado válido quando se obtém um resultado igual ou maior que 0,8. Participaram da validação 13 estudantes de diferentes áreas da saúde. **RESULTADOS:** O jogo foi denominado “Conhecer para Respeitar” e apresenta um quiz com dez questões referente aos direitos e prevenção de violência contra a pessoa idosa, sendo que quando o participante responde a todas corretamente ele é certificado como amigo da pessoa idosa. O jogo foi validado na primeira rodada com CVC= 0,98 **CONCLUSÃO:** O jogo foi aprovado pelos avaliadores, sendo considerado relevante para o contexto atual, pois se apresenta como uma ferramenta que contribui para sensibilizar os estudantes da saúde, bem como demais áreas sobre a relevância do problema.

43 - DIGNIDADE E INCLUSÃO NO CUIDADO À SAÚDE PARA PESSOAS IDOSAS PRIVADAS DE LIBERDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

SANTOS, W.; EVEDOVE, A.U.D.

Faculdade de Medicina de Marília

xwenderluiz@gmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento no Brasil afeta diversas áreas da sociedade, incluindo o sistema prisional, onde a proporção de idosos têm aumentado significativamente. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFAMEMA) é uma referência para o cuidado em saúde, visando oferecer uma atenção integral e humanizada. Neste contexto, é importante implementar estratégias que garantam os direitos à saúde da Pessoa Idosa Privada de Liberdade (PIPL). **OBJETIVOS:** Analisar as práticas de atendimento à PIPL realizadas no HCFAMEMA e propor estratégias para aprimorar o cuidado humanizado. **MÉTODOS:** Pesquisa qualitativa no formato de um relato de experiência vivenciado por um discente da sexta série do curso de Medicina, durante a realização de atendimentos em saúde às PIPL no HCFAMEMA. **RESULTADOS:** A Lei de Execução Penal, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto do Idoso destacam a importância de um cuidado inclusivo e diferenciado à PIPL. Durante o estágio observou-se que: 1) Ainda persiste uma limitação entre os profissionais na identificação das necessidades específicas das PIPL; 2) Há ambientes adaptados, como corrimãos, rampas e elevadores que garantem a acessibilidade; 3) As informações nos prontuários físicos são escassas devido à ausência de um prontuário eletrônico unificado e há pouca inserção das PIPL nos ambulatorios de especialidades, o que compromete a integralidade. **CONCLUSÕES:** Embora existam diretrizes legais que promovam as necessidades específicas dessa população, na realidade são de difícil implementação. É fundamental manter as iniciativas que promovam dignidade e inclusão. Programas de capacitação para os profissionais e uma maior inserção das PIPL nos ambulatorios são estratégias que podem aprimorar os cuidados e garantir tratamento contínuo, resultando na redução do número de óbitos e internações, além da garantia da integralidade durante o atendimento. Assim, o desafio é transformar diretrizes em ações efetivas, assegurando um cuidado que respeite as particularidades do envelhecimento e promova a dignidade dos indivíduos ao longo do processo penal.

44 - DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E PRINCIPAIS FATORES DE RISCO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

MAFRA, G.P.¹; MICHELAN, G.M.²; VERNASQUE, J.S.R.^{2,3}; GHEZZI, J.F.S.A.^{2,3}; SPADELLA, M.A.³

1. Curso de Medicina, Faculdade de Medicina de Marília - Famema, Marília/SP

2. Curso de Enfermagem, Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF, Garça/SP

3. Programa de Pós-Graduação em Saúde e Envelhecimento - PPGSE, Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, Marília/SP

gabepmafra@gmail.com

INTRODUÇÃO: O acelerado envelhecimento populacional a nível mundial tem impactado no padrão de morbimortalidade, resultando na prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) quando comparadas às doenças infectocontagiosas. Diante desta transição epidemiológica global, evidencia-se a necessidade de nova percepção do cuidado em saúde. **OBJETIVOS:** Identificar quais são as DCNT mais prevalentes a nível mundial e os principais fatores de risco associados. **MÉTODOS:** Revisão Integrativa da Literatura desenvolvida com base na questão norteadora: quais são as DCNT mais prevalentes a nível mundial e os fatores de risco associados? A busca qualificada de artigos ocorreu nas bases de dados MEDLINE, LILACS, Web of Science, Embase e Scopus, publicados no período de 2012 a 2023. O nível de evidência das publicações foi determinado segundo Oxford Center for Evidence-Based Medicine. **RESULTADOS:** A amostra compreendeu 30 artigos. O ano de 2021 e a Inglaterra registraram o maior número de publicações. O delineamento das pesquisas envolveu, em sua maioria, estudos transversais. A China foi o país em que mais foram realizadas pesquisas sobre as DCNT. Dentre as quatro principais patologias crônicas, as doenças cardiovasculares foram as mais incidentes. Os fatores de risco de maior destaque foram os comportamentais, como obesidade, tabagismo, etilismo, sedentarismo e alimentação irregular. Embora a hipertensão arterial sistêmica tenha sido evidenciada em cerca de 57% da amostra, sua manifestação teve forte relação com os hábitos de vida dos indivíduos acometidos. **CONCLUSÕES:** Ao considerar que grande parte dos fatores de risco para doenças crônicas são modificáveis, essa revisão pode subsidiar o desenvolvimento de estratégias/políticas públicas que visem a promoção da saúde, de modo a reverter as altas taxas de mortalidade por DCNT nas populações.

Agradecimento*: PDPG - Pós-Doutorado Estratégico (PDPG-POSDOC) - no Processo CAPES - 88887.799298/2022-00.

45 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRÁTICA TERAPÊUTICA PARA IDOSOS NA MICRORREGIÃO DE ADAMANTINA

NOVELLI, J.V.T.¹; BORRO, G.E.²

Centro Universitário de Adamantina

psi.tavantenovelli@gmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional, especialmente em países como o Brasil, traz desafios ao sistema de saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que, até 2050, a população idosa global dobrará, exigindo que os profissionais sejam capacitados para atender às necessidades físicas, emocionais e cuidados paliativos dessa faixa etária. Este estudo visa inserir e resgatar o trabalho e as memórias do âmbito rural através de práticas da Educação Ambiental com pessoas acima de 60 anos na microrregião de Adamantina/SP, trata-se de uma pesquisa voltada às Unidades Básicas de Saúde. Por meio da implementação de programas de Educação Ambiental, buscamos não apenas promover a saúde e o bem-estar dos idosos, mas também valorizar suas experiências e saberes. **OBJETIVO:** Compreender a defasagem ecosocial e associar práticas de Educação Ambiental à população idosa da microrregião, para promover a saúde mental e a preservação dos recursos naturais. **MÉTODOS:** De caráter qualitativo, esta pesquisa fará uso de fontes primárias, entrevistas e questionários, a serem aplicados aos idosos residentes da microrregião de Adamantina (SP). Além disso, o trabalho recorrerá a fontes secundárias, com ênfase ao referencial teórico existente sobre Educação Ambiental. Como parte da metodologia, será realizado um acompanhamento longitudinal, permitindo a análise contínua das mudanças e evoluções nas percepções e conhecimentos dos participantes ao longo do tempo. Os resultados serão apresentados textualmente, assim como na forma de gráficos, quadros e tabelas. As atividades propostas serão adaptadas de acordo com os diferentes níveis de mobilidade e as capacidades físicas dos idosos. Entre elas, incluirão oficinas de jardinagem, caminhadas ecológicas e palestras sobre sustentabilidade, permitindo que os participantes se conectem com o meio ambiente enquanto exercitam a mente e o corpo. Além disso, essas práticas favorecem a socialização, um fator crucial para a saúde mental na terceira idade. **RESULTADOS ESPERADOS:** Através das entrevistas e questionários, consolidar práticas ambientais que valorizem os trabalhos e as memórias rurais, contribuindo para o resgate e a valorização das vivências dos idosos, fortalecendo sua identidade cultural e social. Aumentar a participação dos idosos em atividades sustentáveis que promovam a integração social entre gerações envolvendo a comunidade local e a troca de conhecimento entre elas, além de fortalecer seu senso de pertencimento e utilidade social.

46 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PRÁTICA DE ENFERMEIROS NA PROMOÇÃO DA AMAMENTAÇÃO: REVISÃO INTEGRATIVA

TRINDADE, I.L.; SIMIONATO, M.J.F. M.; SANTILONI, A. F. P.

Faculdade de Medicina de Marília

isabelletrindade@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O aconselhamento em amamentação deve ser iniciado ainda no pré-natal, devendo permear todo o período de lactação, para que haja continuidade no aleitamento materno, contribuindo, assim, para a saúde do binômio mãe-filho. Destaca-se, ao enfermeiro, o papel de atuar como educador, orientador e incentivador das ações voltadas à amamentação. Assim, garantir o acolhimento da nutriz, com uma escuta ativa, possibilitando que o ato de amamentar seja um momento prazeroso (Christoffel *et al.*, 2021). **OBJETIVO:** avaliar a abordagem do enfermeiro no período gravídico-puerperal em relação à promoção do aleitamento materno. **MÉTODO:** revisão integrativa de literatura (RIL) com a finalidade de sintetizar o conhecimento e aplicar os resultados a partir de estudos significativos na prática (Ganong, 1987). A estratégia usada para a elaboração da questão norteadora foi a PICO (Richardson *et al.*, 1995): “Como a educação em saúde na prática de enfermeiros contribui para a promoção do aleitamento materno”. As bases eletrônicas de dados utilizadas foram LILACS, MEDLINE, Scielo e Web of Science, encontrados 1562 artigos, retirando as duplicatas pelo EndNote restando 1380 artigos. Os critérios de inclusão foram os artigos relacionados ao tema, nos idiomas português, inglês e espanhol, e os de exclusão as revisões de literatura, livros, dissertações e teses. **RESULTADOS ESPERADOS:** por fim, a amostra definitiva está sendo selecionada e os resultados serão analisados qualitativamente por meio de categorias temáticas e apresentados em quadros ou tabelas, conforme pertinência do estudo.

47 - EFEITOS DO LASER Nd:YAG 1064nm DE PICOSSEGUNDOS NO REJUVENESCIMENTO CUTÂNEO, UMA AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA

FREITAS, L.O.C.; ALMEIDA, F.Z.; CALAMITA, A.B.P.

Faculdade de Medicina de Marília

letfreitass7@gmail.com

INTRODUÇÃO: O laser de picossegundos, devido seu alto efeito fotomecânico e baixo efeito fototérmico, é capaz de quebrar partículas de pigmento sem lesionar os tecidos adjacentes. Essa quebra óptica induzida pelo laser permite a vacuolização no interior da pele, que induz a regeneração de colágeno, resultando em recuperação da pele sem cicatrizes, levando ao rejuvenescimento local. **OBJETIVO:** Esse estudo tem como objetivo avaliar, através de observação histopatológica, os efeitos da aplicação do laser de picossegundos Nd:YAG 1064nm na pele em cinco momentos: imediatamente, 72 horas, 7 dias e 30 dias após a sessão, comparados com o controle, ou seja, pele sem alterações cutâneas. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo experimental, de avaliação de segurança, eficácia e tolerabilidade de um aparelho de laser de picossegundos Nd:YAG, para pacientes com envelhecimento cutâneo. Foi utilizado um laser de picossegundos Nd:YAG, com comprimentos de onda de 1064nm e 532nm, aplicado em cinco áreas na região axilar de uma paciente voluntária. As cinco áreas foram então biopsiadas sequencialmente e o material coletado corado com HE para visualização das estruturas teciduais e descrição dos achados. **RESULTADOS:** Na amostra de análise imediata obteve-se uma pele livre de lesões e início da vacuolização. Após 72 horas, observa-se processo inflamatório. Depois de 7 dias, resolução parcial da inflamação e em 30 dias, processo cicatricial em evolução e presença de neoformação de colágeno. **CONCLUSÕES:** O laser de picossegundos mostrou-se eficaz ao promover uma série de efeitos inflamatórios na pele, culminando em neocolanogênese local.

48 - EFEITOS DO TRATAMENTO COM *CURCUMA LONGA* SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL E ESTRESSE OXIDATIVO RELACIONADOS À ARTRITE INDUZIDA POR ADJUVANTE

MORAES, V. B. F. N. J.¹; CAGLIONI, L.G.¹; LAURINDO, L.F.¹; BARBALHO, S.M.²; GUIGUER, E.L.³; ARAÚJO, A.C.³; OLIVEIRA, P.B.⁴; CHIES, A. B.⁵

1. Discente do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), Marília-SP
2. Docente da Disciplina de Bioquímica da Universidade de Marília (UNIMAR), Marília-SP
3. Docente da Disciplina de Farmacologia da Universidade de Marília (UNIMAR), Marília-SP
4. Laboratorista do Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), Marília-SP
5. Docente da Disciplina de Farmacologia e Terapêutica Experimental da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) da cidade de Marília-SP

victorbrunofonseca@gmail.com

INTRODUÇÃO: A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune sistêmica caracterizada por um processo inflamatório primariamente sinovial, que pode cursar com alterações vasculares e metabólicas. Sabe-se que a curcumina, um subproduto da *Curcuma longa*, apresenta efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes na inflamação articular local. Diante disso, medicamentos à base de *Curcuma longa* podem ser utilizados para o tratamento de manifestações extrarticulares da AR. **OBJETIVO:** Analisar o efeito da *Curcuma longa* nas manifestações extra-articulares da artrite reumatoide. **MÉTODO:** Foram utilizados ratos Wistar machos e divididos em três grupos experimentais: controle, artrite induzida por adjuvante (AIA) e AIA tratada com o extrato seco *Curcuma longa* (Motore[®]; 200 mg/kg/dia, por gavagem). A artrite foi induzida por meio de solução contendo Mycobacterium tuberculosis H37RA 3.8mg/mL (BD DifcoTM Adjuvants). Foram analisados peso e composição corporal, diâmetro das patas, peroxidação lipídica, concentrações de nitrito/nitrato e as respostas contráteis à fenilefrina. **RESULTADOS:** Não houve alterações significativas de peso corporal, tamanho da pata direita e esquerda. O tratamento com *Curcuma longa* não modificou a perda de massa magra e de massa gorda. Esse tratamento também não modificou significativamente o FRAP, as concentrações de nitrito/nitrato no plasma e em macerado de aorta. Observou-se, por fim, que a AIA não modifica as respostas contráteis da aorta à fenilefrina tanto na presença quanto na ausência do tecido adiposo perivascular (PVAT), independentemente do tratamento com *Curcuma longa*. Essas respostas também não foram modificadas na presença do TIRON. **CONCLUSÃO:** O tratamento com *Curcuma longa*, parece não modificar a composição corporal e o estresse oxidativo em ratos acometidos pela AIA.

49 - ELABORAÇÃO DE CARTILHA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS

ZAITH, P. T. I.; SILVA, S. L.; ROCHA, V. M.; FALARINO, C. S.; FRANCISCHETTI, I.

Faculdade de Medicina de Marília

paulaikedda25@gmail.com

INTRODUÇÃO: Apesar da importância dos primeiros socorros, a temática é pouco abordada no ambiente escolar, o que dificulta a aquisição de um conhecimento imprescindível para maior segurança nos espaços de convivência, uma vez que acidentes, como parada cardiorrespiratória (PCR), obstrução de vias aéreas por corpo estranho, convulsão, trauma, intoxicação e afogamento são recorrentes na população e o manejo adequado, empregando técnicas de primeiros socorros é decisivo no prognóstico da vítima. **OBJETIVOS:** Desenvolver e divulgar produto técnico sobre primeiros socorros com informações adequadas, ilustrações e abordagem acessível à população com educação formal de segundo grau. **MÉTODOS:** A elaboração do manual seguiu três etapas: 1) pesquisa e revisão de literatura para identificar os principais protocolos de Suporte Básico de Vida; 2) adaptação pedagógica do conteúdo à linguagem dos adolescentes do ensino médio, com ênfase na objetividade; 3) construção de material instrutivo, com textos e imagens organizados em módulos voltados às principais emergências e com orientação da ordem das ações necessárias ao manejo de cada caso.. Foram abordadas PCR, obstrução de vias aéreas, convulsão, trauma, intoxicação e afogamento. **RESULTADOS:** O manual “Guia de Primeiros Socorros para Leigos no Ensino Médio” foi publicado na plataforma Zenodo.org, com licença Creative Commons - CC BY para facilitar o acesso e utilização por escolas, ligas acadêmicas e a população em geral, e está acessível em: <https://zenodo.org/records/11043233>. Em seis meses de publicização o material foi visitado 72 vezes e baixado 64 vezes. **CONCLUSÕES:** A divulgação do guia com orientações para manejo de primeiros socorros demonstra responder aos objetivos propostos. Contribui para a multiplicação destes conhecimentos junto à comunidade estudantil, maior acesso a informações corretas e adequadas e orientação da população frente aos primeiros socorros nas temáticas abordadas.

50 -ESCOLHA PROFISSIONAL PELA CARREIRA MÉDICA: UM OLHAR SOB DISCURSOS DE DISCENTES DO PRIMEIRO ANO DE UMA FACULDADE PÚBLICA DO INTERIOR PAULISTA

COSTA, V. S.; PINELI, S. DE S.; NONATO, A. C.; PIO, D. A. M.

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

viniciusxnisso@gmail.com

A escolha por uma profissão ocorre na adolescência em meio a fatores intrínsecos, extrínsecos e interpessoais. Nesse contexto, a escolha pela medicina é realizada em um contexto estressante de pré-vestibular, considerando conhecimentos do estudante acerca dessa carreira. OBJETIVO: Busca-se compreender a motivação dos estudantes ingressantes de uma faculdade pública do interior paulista comprometerem-se com a carreira médica. MÉTODO: foram efetuadas entrevistas orais a partir de um roteiro semiestruturado com estudantes do primeiro ano do curso medicina de uma faculdade pública do interior paulista em 2023, selecionados por amostragem em bola de neve e saturação teórica. As entrevistas foram transcritas na íntegra e estão sendo analisadas segundo o Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS). RESULTADOS PARCIAIS E CONCLUSÕES: o roteiro semiestruturado a partir do qual foram realizadas as entrevistas mostrou-se parcialmente redundante para a obtenção dos dados, isto é, a maioria dos elementos que norteiam o processo vocacional dos discentes é percebido em seu discurso espontâneo. Contudo, os discentes apresentam eventuais incoerências e negações em seus discursos, ponto em que o roteiro se mostrou útil para acessar o discurso subjacente. Nesse ponto, ao não saberem explicar determinadas decisões com base em suas motivações inicialmente declaradas, os indivíduos sugerem a existência de conflitos entre seus fatores extrínsecos, intrínsecos e interpessoais, os quais, de maneira geral, foram pouco explorados na literatura existente sobre a temática. Por exemplo, é possível que fatores interpessoais atuem reforçando ou enfraquecendo fatores intrínsecos ou extrínsecos, entre outros fenômenos para os quais os indivíduos parecem não reconhecer sua ocorrência. Nesse sentido, durante as entrevistas, percebe-se que o ato da reflexão sobre o assunto pode proporcionar alteração dos conceitos que os indivíduos tem sobre suas escolhas. Também se percebe a diferença no discurso entre indivíduos na primeira graduação em relação a indivíduos na segunda graduação, relacionada a natureza de suas experiências prévias.

51 - EXPERIÊNCIA E PRÁTICA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM VIVÊNCIA DO LUTO PERINATAL: UMA REVISÃO DE ESCOPO

ANDREO, L.M.; BARBOSA, B.D.; RAMIRES, M.B.Y.D.; PINTO, P.R.O.S.; CÂNDIDO, T.A.; NONATO, A.C.; ANDRADE, M.V.L.C.; PIO, D.A.M.

Faculdade de Medicina de Marília

luanaandreo13@gmail.com

INTRODUÇÃO: Define-se morte perinatal como a morte de fetos de idade gestacional de 28 semanas ou mais, ou morte de lactente nascido vivo com menos de 28 dias de idade. A vivência desse luto é desafiadora tanto para a família como para os profissionais de saúde, pois rompe com o ciclo natural da vida. Esse cenário apresenta alta incidência, visto que em 2018 no Brasil o número de mortes perinatais correspondeu a 45.885, significando 15,5% dos nascimentos totais deste ano. Para a elaboração do luto saudável, o profissional possui papel fundamental, mas ainda há diversos desafios para prestar essa assistência, como a comunicação e o acolhimento das famílias enlutadas, a ausência de um protocolo institucional para morte perinatal; o atendimento fragmentado e a falta de capacitação. Nesse contexto, define-se a pergunta de pesquisa: como os profissionais de saúde realizam o atendimento às famílias em vivência do luto perinatal? **OBJETIVOS:** Analisar como profissionais da saúde realizam o atendimento às famílias em vivência do luto perinatal, identificar quais estratégias podem ser utilizadas neste contexto, a fim de sistematizá-las e promover auxílio na superação deste desafio. **MÉTODOS:** Revisão de escopo que utilizará as bases de dados BVS - Biblioteca Virtual em Saúde, DeCS, Embase, Google Brasil, LILACS, MEDLINE, Plataforma Sucupira, Portal Capes, Portal de Revistas, PubMed, Scielo Livros, Scielo, Scopus, UpToDate e Web Of Science de materiais publicados 2013-2023 e os descritores: Bereavement, Perinatal Death, Stillbirth. Na seleção dos materiais, serão avaliadas sequencialmente: título, resumo e texto completo para inclusão ou exclusão no estudo. Serão incluídos apenas os materiais que respondam a pergunta de pesquisa e atendam aos objetivos do projeto. O protocolo seguirá as recomendações do checklist PRISMA-ScR. **RESULTADOS ESPERADOS:** O estudo espera caracterizar o perfil e a formação dos profissionais que prestam assistência no contexto do luto perinatal e analisar os desafios existentes. Logo, pretende-se sistematizar estratégias utilizadas ou que possam ser utilizadas pelos profissionais da saúde nesse cenário.

52 - FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA FUMAR EM ADULTOS BRASILEIROS: VIGITEL 2019-2023

CHIESA, G. S.; EVEDOVE, A. U. D.

Faculdade de Medicina de Marília

guchiesa@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O Brasil é uma das referências mundiais no enfrentamento do tabagismo. O consumo dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF) tem se caracterizado como um novo desafio a ser enfrentado pelos efeitos nocivos do seu uso. Embora o uso do DEF seja mais prevalente nas pessoas mais jovens, o consumo a longo prazo pode afetar na qualidade do processo de envelhecimento dessas pessoas, considerando que trata-se de um dos principais comportamentos de risco relacionados às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), responsáveis pela maior carga de mortes prematuras (30 a 69 anos) no Brasil. Neste sentido, pesquisas epidemiológicas que identifiquem os fatores associados deste consumo são incipientes no país e podem ser importantes para o enfrentamento deste comportamento de risco. **OBJETIVOS:** Este projeto visa analisar os fatores associados ao consumo de DEF por adultos (≥ 18 anos) residentes nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal entre 2019 e 2023. **MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa epidemiológica descritiva que utilizará dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), de 2019 a 2023, sobre o consumo de DEF em adultos das 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Serão calculadas prevalências e razão de prevalências (RP) brutas e ajustadas desse consumo entre os sexos (masculino/feminino), faixa etária (18 a 24; 25 a 34; 35 a 44; 45 a 59; ≥ 60 anos), escolaridade (0 a 8; 9 a 11 e ≥ 12 anos) e raça/cor (branca/amarela/preta/parda/indígena). Para a análise da prevalência se utilizará o teste do qui-quadrado, considerando o valor de $p < 0,05$. Para o cálculo da RP será utilizada a Regressão de Poisson considerando o Intervalo de Confiança (95%). **RESULTADOS ESPERADOS:** Identificar os principais fatores associados ao consumo de DEF e fornecer informações para o planejamento e implementação de ações de enfrentamento desse comportamento, promovendo assim comportamentos saudáveis que permitam um processo de envelhecimento saudável.

53 -FATORES DE RISCO E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO PARA ACIDENTES DOMÉSTICOS EVITÁVEIS NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA: REVISÃO DE LITERATURA

MAIA, P. H. G.¹; BARBOSA, L. B. B.¹; ARMELIN, J. P.¹; CARDOZO, M. P. M.¹; GRAVATIM, M. B.¹; SOUZA, T. M.¹; NONATO, A. C.²; FRANCISCHETTI, I.³

1. Alunos da Graduação de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília
2. Professora Voluntária da Faculdade de Medicina de Marília
3. Professora da Faculdade de Medicina de Marília.

phgm2002@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente 830.000 crianças morrem por acidentes e metade desses óbitos poderia ser evitada com medidas preventivas. A alta prevalência de acidentes evitáveis na faixa etária pediátrica no Brasil justifica a necessidade de estratégias de prevenção específicas direcionadas ao ambiente doméstico. **OBJETIVO:** Analisar como as estratégias de prevenção existentes interferem na prevalência de acidentes domésticos evitáveis. **MÉTODO:** Revisão de literatura, com a pergunta de pesquisa: "Como estratégias de prevenção de acidentes domésticos afetam a prevalência e os fatores de risco de acidentes domésticos evitáveis na faixa etária pediátrica?", considerando os descritores relacionados para a estratégia de busca, que será realizada em MEDLINE, EMBASE, LILACS, Scopus, Web of Science e Scielo. Serão incluídos estudos observacionais e experimentais randomizados dos últimos 10 anos em português, inglês e espanhol e serão excluídos registros de literatura cinzenta e não provenientes de artigos científicos de periódicos indexados para abranger a literatura sobre a temática mais recente e publicada nos principais idiomas e garantir a qualidade da evidência, que será avaliada pelos checklists STROBE e GRADE, e dois revisores independentes avaliarão segundo título, resumo e texto completo. Os resultados serão apresentados por tabelas de síntese e, quando possível, por metanálise, utilizando modelos de efeitos fixos ou aleatórios, conforme a heterogeneidade dos dados. Análises de subgrupos serão realizadas para explorar fontes de variação nos resultados, como idade das crianças, características sociodemográficas e tipo de estratégia de prevenção. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se elencar as estratégias de prevenção que possuem impacto nos fatores de risco para acidentes domésticos evitáveis na faixa etária pediátrica, fornecendo evidências para políticas públicas para tal.

54 - FATORES QUE LEVAM A PROCURA INADEQUADA DE ATENDIMENTOS NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA INFANTIL: REVISÃO DA LITERATURA

SILVA, K. D.; BARBOSA, P. M. K.

Faculdade de Medicina de Marília

Kauanydarim29@gmail.com

Introdução: Os atendimentos de urgência e emergência são utilizados frequentemente por pacientes pediátricos, a procura dessa assistência tem se mostrado crescente, havendo uma demanda superior à oferta de serviços disponíveis. Desta forma é fundamental definir quem usufruía de tais serviços de acordo com a sua faixa etária, haja vista, que são necessários profissionais especializados e capacitados para atender esta demanda, principalmente quando se trata de crianças, onde a especialidade tem suas peculiaridades específicas para o sucesso no processo de recuperação do estado crítico a qual se apresenta. **Objetivo:** Identificar na literatura os motivos que levam os responsáveis a procurar atendimento em unidades de urgência e emergência infantil de maneira indevida. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura caracterizada como exploratória com abordagem quantitativa. A presente revisão tem como norteadora a seguinte questão: Quais são os motivos que levam os familiares a procurarem os serviços de urgência e emergência de atendimento infantil? A busca foi realizada pela própria pesquisadora com auxílio da bibliotecária da instituição no mês de novembro de 2023, separando artigos os quais inicialmente atendessem ao nosso propósito. **Discussão:** O uso indevido e indiscriminado do polo de urgência e emergência está principalmente relacionado à falta de vínculo da população com as unidades básicas de saúde, horário de funcionamento reduzido das mesmas, paralelamente ao horário comercial, dificultando a ida das crianças e de seus responsáveis até essas unidades. Outros fatores associados são a comodidade, percepção de resolutividade de suas demandas e ausência de instrução do que de fato é uma urgência. **Conclusão:** Conclui-se que é fundamental fortalecer a atenção primária para diminuir o uso inadequado dos serviços de saúde na atenção terceirizada, especialmente no cuidado das condições sensíveis à atenção primária, e melhorar a acessibilidade socioorganizacional.

55 - HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL DE UMA EQUIPE DE SAÚDE DE UMA UNIDADE INTENSIVA ADULTA

MOURA, J.C.R.¹; GHEZZI, J.F.S.A.^{1,2}

1. Curso de Enfermagem, Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF, Garça/SP
2. Programa de Pós-Graduação em Saúde e Envelhecimento - PPGSE, Faculdade de Medicina de Marília - Famema, Marília/SP

jehcrm18@outlook.com

INTRODUÇÃO: uma Unidade de Terapia Intensiva consiste em um serviço hospitalar importante para o atendimento de pacientes em estado crítico. Nessa lógica, exige-se que neste ambiente, atue uma equipe de saúde competente e proativa, considerando a complexidade dos cuidados. No entanto, esta equipe precisa usufruir de boa saúde para então exercer os cuidados de forma profícua. Por isso, releva-se pesquisas que buscam investigar sobre o autocuidado de equipes multiprofissionais. **OBJETIVO:** compreender como a equipe multidisciplinar de uma Unidade de Terapia Intensiva adulta, implementa os hábitos de vida saudáveis no seu cotidiano. **MÉTODO:** pesquisa de campo desenvolvida em um cenário intensivo de um hospital do interior paulista. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e analisados por meio do referencial teórico de análise de conteúdo na modalidade temática. **RESULTADOS:** a amostra da pesquisa compreendeu o total de 12 profissionais da saúde, incluindo médicos, enfermeiros e técnico de enfermagem. Dentre os hábitos de vida praticados, 42% da amostra verbalizou tabagismo e, embora 58% dos participantes tenham referido práticas regulares de atividade física, o mesmo percentual foi considerado sobrepeso, de acordo com o índice de massa corpórea. Os dados foram categorizados em três grupos: compreensão do conceito de hábitos de vida saudável; hábitos de vida praticados; dificuldades em praticar hábitos de vida saudável. **CONCLUSÕES:** foi possível denotar que embora a equipe de saúde desta unidade intensiva tenha uma concepção sobre a importância dos hábitos de vida saudável, a maior dificuldade de sua implementação foi associada ao processo de trabalho, uma vez que, profissionais da saúde executam, em sua grande maioria, jornadas excessivas de trabalho. Considerando a predisposição de práticas não saudáveis ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, ressalta-se a importância da sensibilização destes profissionais, buscando assim, uma reversão no perfil de morbimortalidade por doenças crônicas, as quais são ocasionadas por fatores de riscos, muitas vezes modificáveis.

56 - *HELICOBACTER PYLORI*: UMA ANÁLISE SOBRE A INFLUÊNCIA DOS POLIMORFISMOS DAS REGIÕES S, C, D, M E I DO GENE *VAC*A PARA O DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER GÁSTRICO

FONSECA, A.S.; GIROLI, D.; COELHO, M.M.; TAKEDA, L.N.; RASMUSSEN, L.T.

Faculdade de Medicina de Marília

alanissantos61@gmail.com

INTRODUÇÃO: *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) é uma bactéria gram-negativa que coloniza o meio gástrico de mais da metade da população mundial. Sua transmissão pode ser direta (via oral-oral, fecal-oral, gástrica-oral ou atividade sexual) e, menos frequentemente, indireta (por ingestão de água e alimentos contaminados). Variáveis como idade, área geográfica, condições de vida e situação socioeconômica influenciam a prevalência da infecção. O *H. pylori* possui flagelos que facilitam sua movimentação e invasão da mucosa gástrica. A produção de urease neutraliza a acidez estomacal, permitindo sua sobrevivência. A resposta inflamatória induzida pela bactéria atrai células imunes e causa estresse oxidativo, que pode danificar o DNA do hospedeiro. Esse processo pode levar ao desenvolvimento de displasia, metaplasia e câncer. Doenças como gastrite crônica, úlceras gástricas e duodenais e câncer gástrico estão associadas à presença desse patógeno. **OBJETIVOS:** Este trabalho visa diagnosticar e caracterizar os marcadores de patogenicidade do *H. pylori*, com foco no gene *vacA* e suas regiões s, c, d, m e i, utilizando amostras de biópsia gástrica de pacientes com sintomas pépticos e câncer gástrico. **MÉTODOS:** Serão avaliadas 150 amostras de biópsias de indivíduos maiores de 18 anos, divididas em três grupos: Controle, Gastrite e Câncer. A classificação será realizada por análise histopatológica. A extração de DNA será feita com o *Kit QiAmp® DNA Mini Kit da QIAGEN*. A detecção do *H. pylori*, do gene *vacA* e suas regiões será realizada por PCR. **RESULTADOS ESPERADOS:** Este estudo busca verificar a associação entre o marcador de patogenicidade *vacA* e a etiologia, desenvolvimento e progressão das doenças gástricas, contribuindo para uma melhor compreensão da infecção por *H. pylori* e suas implicações clínicas.

57 - HIPERCOLESTEROLEMIA: ENVOLVIMENTO DO EXTRATO DE ARROZ VERMELHO FERMENTADO (RED YEAST RICE) NA DIMINUIÇÃO DOS NÍVEIS DE COLESTEROL SANGÜÍNEO COMPARADOS ÀS ESTATINAS

SANTANA, C. V.; BONAMIN, F.

Faculdade de Medicina de Marília

caroline.santana009@gmail.com

INTRODUÇÃO: A hipercolesterolemia constitui em um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares sendo caracterizada por elevados níveis de colesterol plasmático devido à atividade da enzima HMG-CoA redutase. Seu tratamento convencional se dá pelo uso de medicamentos da classe das estatinas, porém com efeitos adversos, podendo ocorrer concomitante um aumento do uso de outros medicamentos para o alívio desses sinais e sintomas. No entanto, atualmente vem sendo cada vez mais estudado o uso de medicamentos fitoterápicos, principalmente o extrato de arroz vermelho fermentado - Red Yeast Rice (RYR) na dose de 3mg, com menor probabilidade de efeitos adversos, sendo uma opção natural e com o mecanismo de ação farmacológico similar ao das estatinas na hipercolesterolemia. **OBJETIVOS:** Identificar as ações do extrato de arroz vermelho fermentado (Red Yeast Rice) no tratamento da hipercolesterolemia através de revisão da literatura. **MÉTODOS:** As bases de dados utilizadas e a quantidade de trabalhos encontrados foram: PUBMED com 16 artigos, Science Direct com 27 artigos, Google Acadêmico 17 artigos e SCIELO nenhum artigo de 2019 a 2024, com o seguinte descritor: "Red Yeast Rice and Hypercholesterolemia". Os artigos foram avaliados e com isso, selecionados 08 da base de dados PUBMED, 07 do SCIENCE DIRECT, 05 do Google Acadêmico e 0 do SCIELO, totalizando: 20 artigos. **RESULTADOS:** Os resultados apontaram que o uso do extrato de arroz vermelho fermentado padronizado em 3 mg de monacolina K em lactona (MKL) é o eficaz na redução da hipercolesterolemia. **CONCLUSÃO:** Foi possível concluir que as evidências trazidas neste trabalho sugerem a eficácia do extrato de arroz vermelho fermentado – Red Yeast Rice (RYR), desde que padronizado em 3 mg de monacolina K na forma de lactona (MKL), podendo ser uma abordagem eficiente para o tratamento de pacientes com hipercolesterolemia leve e moderada, com baixos índices de desenvolvimento de efeitos adversos quando comparado aos medicamentos da classe das estatinas.

58 - HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS: UMA REFLEXÃO SOBRE OS AGRAVOS E A HOSPITALIZAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DAS DOENÇAS

PANOBIANCO, M. C.C.; SANTOS, I. O.

Faculdade de Medicina de Marília

carolcardosopanob2018@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus tipo II (DM II) são doenças crônicas que afetam significativamente a qualidade de vida da população, porém, podem ser prevenidas ou controladas. Fatores sociais, econômico, estilo de vida, envelhecimento, baixa escolaridade e acesso limitado aos serviços de saúde, aumentam a complexidade do cuidado e implicam no manejo dessas condições. Não considerar esses fatores pode comprometer a efetividade do cuidado integral à saúde das pessoas portadoras dessas doenças, do ponto de vista da integralidade, aumentar os agravos e a hospitalização. Questiona-se o que leva as pessoas portadoras de HAS e DMII aos agravos e às internações e o que poderia ser feito para minimizar esse problema? **OBJETIVOS:** Compreender os motivos que resultam na hospitalização de pessoas portadoras de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus tipo II, relacionar com as necessidades de saúde e refletir as medidas de prevenção e controle das doenças, de agravos e hospitalização. **MÉTODO:** Propõe-se pesquisa de campo, descritiva, na abordagem qualitativa. Será realizada no Hospital das Clínicas de Marília com pessoas hospitalizadas, diagnosticadas com HAS e/ou DM-II; inicialmente serão incluídas 20 pessoas, selecionadas através do critério de saturação, com idade superior a 18 anos, com boa cognição e aceitar participar da pesquisa. Os dados serão coletados através de entrevista semiestruturada, utilizando-se instrumento norteador com perguntas abertas. O tratamento dos dados será através da análise qualitativa na modalidade temática. Projeto será iniciado a partir da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília conforme orientações das Resoluções 466/2012 e 510/2016. **RESULTADOS ESPERADOS:** espera-se identificar os fatores biológicos, socioculturais, econômicos, a organização e o acolhimento dos serviços de saúde para pessoas portadoras de hipertensão e diabetes, a fragilidade do vínculo com equipes de saúde e principalmente a baixa autonomia dessas pessoas que contribuem para o agravo das doenças e a hospitalização.

59 - IMPACTOS BIOPSISSOCIAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA

CARDOSO, M.F.; GHEZZI, J.F.S.A.

Faculdade de Medicina de Marília

mariuryfonsecacardoso@gmail.com

Introdução: A crescente prevalência da obesidade é um problema global emergente e a Cirurgia Bariátrica continua sendo a intervenção mais efetiva para obesidade, com pesquisas indicando redução substancial de peso e melhorias das comorbidades e imbróglis psicossociais relacionadas à essa patologia. **Objetivo:** Identificar, por meio de uma revisão integrativa, quais foram os principais impactos biopsicossociais apresentados por pacientes submetidos ao procedimento de Cirurgia Bariátrica e compreender os impactos da Cirurgia Bariátrica pela técnica Sleeve em pacientes do sexo feminino. **Método:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados Medline, Lilacs e BDENF, sendo norteada pela pergunta de pesquisa: quais foram os impactos biopsicossociais apresentados em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica? Ademais, foi realizada uma pesquisa de campo, na abordagem qualitativa, na qual os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, com pacientes submetidos ao procedimento da cirurgia bariátrica. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo na modalidade temática e a pesquisa de campo teve início após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. **Resultados:** A RIL compreendeu o total de 32 artigos científicos considerando o recorte temporal dos últimos cinco anos, com maior concentração no ano de 2020. Os Estados Unidos foi o país que apresentou maior número de publicações (32,2%) e o periódico com maior número de artigos utilizados foi o Obesity Surgery (18,75%); com relação à pesquisa de campo, após a análise dos dados, foram elencados em três categorias: Benefícios da Cirurgia Bariátrica; A importância do preparo pré-cirúrgico e acompanhamento pós-cirúrgico da bariátrica; Efeitos Colaterais da Cirurgia Bariátrica. **Conclusão:** Dos impactos biopsicossociais após a bariátrica, tanto na Revisão Integrativa quanto na Pesquisa de Campo, destacam-se a melhora da diabetes, hipertensão, diminuição do uso de antidiabéticos e anti-hipertensivos, favorecimento da autoestima e da qualidade de vida. Entre os impactos negativos, destacam-se a deficiência nutricional e os episódios de dumping.

60 - IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 EM UMA ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS

PECORARO, R. S.¹; LÓIS, A. B. Z.¹; OLIVEIRA, J. M.¹; SALOMÃO, L. F.¹; PIO, D. A. M.¹

1.Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

robertopecoraro27@gmail.com

INTRODUÇÃO: A pandemia de COVID-19 trouxe profundas repercussões para a prática psiquiátrica, alterando a dinâmica do atendimento e as condições de trabalho dos profissionais de saúde mental. **OBJETIVO:** Analisar os principais impactos observados e enfrentados pelos profissionais de saúde mental durante a pandemia de COVID-19 em uma enfermaria psiquiátrica. **MÉTODO:** Estudo descritivo de abordagem qualitativa, realizado com profissionais de saúde atuantes em diferentes funções em uma enfermaria psiquiátrica durante a pandemia. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados seguiu a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), identificando 17 ideias centrais e 4 elementos-chave. **RESULTADOS E CONCLUSÕES:** O tempo de experiência na função influenciou o enfoque dos entrevistados quanto aos impactos observados na enfermaria. Profissionais mais experientes destacaram a descompensação e agudização de transtornos psiquiátricos, enquanto profissionais com menos tempo de função focaram nas transformações infraestruturais exigidas pelo contexto pandêmico. Todos os entrevistados concordaram que a pandemia causou significativas transformações na saúde mental, mesmo entre aqueles não infectados pelo vírus. A pandemia de COVID-19 destacou a importância da saúde mental e a necessidade de intervenções psicossociais e terapêuticas. Além disso, catalisou mudanças estruturais na prática clínica psiquiátrica.

61 - INCIDÊNCIA DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL EM PACIENTES TABAGISTAS MAIORES DE 60 ANOS

COELHO, N. S. L.¹; BEZERRA, J. S.²; COLUCCI, A. M.³; MARTINS, J. V. S. C.⁴; Oliveira, A. A.⁵; TEIXEIRA, L. S.⁶; VELOSO, M. S.⁷

1 - Discente do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília da cidade de Marília/SP ; 2 - Discente do curso de Medicina da Universidade Nove de Julho da cidade de Guarulhos/SP; 3 - Discente do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro da cidade de São Paulo/SP; 4 - Discente do curso de Medicina da Universidade Nove de Julho da cidade de Bauru/SP; 5 - Discente do curso de Medicina da Universidade Nove de Julho da cidade de Osasco/SP ; 6 - Discente do curso de Medicina da Universidad Privada Maria Serrana da cidade de Ciudad del Este/PY; 7 - Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida da cidade de Redenção/PA

nicoleslcoelho20@gmail.com

INTRODUÇÃO: A incidência do Aneurisma da Aorta Abdominal (AAA) tem aumentado, especialmente em fumantes acima de 60 anos. A idade avançada e o consumo do tabaco elevam o risco de AAA e complicações graves, como ruptura do aneurisma e consequente hemorragia. A compreensão dos mecanismos fisiopatológicos é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e tratamento. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência de AAA em pacientes tabagistas maiores de 60 anos. **MÉTODOS:** Este estudo analisou artigos publicados entre 2020 e 2024 nos idiomas espanhol, português e inglês e indexados nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS, Cochrane Library e Google Scholar, de acordo com os descritores MeSH: "Aneurisma da Aorta Abdominal", "Intervenções Cirúrgicas" e "Complicações". Obteve-se 129 artigos, sendo que destes foram excluídos 64, por não abordarem diretamente o tema, restando, portanto, 65. **RESULTADOS:** Entre os 65 artigos analisados, 51 são dos últimos cinco anos, com destaque para 2021, com o maior número de publicações, sendo estudos experimentais e observacionais os mais frequentes, dado que revelam uma crescente preocupação com o aneurisma da aorta abdominal, especialmente em fumantes acima de 60 anos. As pesquisas enfatizam a importância de estratégias de prevenção e manejo precoce para reduzir complicações e mortalidade. O tabagismo associado à inflamação crônica e à degeneração da parede arterial se destacam como principais fatores de risco, aumentando em até cinco vezes o risco. Fumantes apresentam maior mortalidade associada à ruptura de AAA, chegando a 85%, com uma evolução mais rápida do aneurisma, sofrendo mais complicações pós-operatórias, justificando a detecção precoce e intervenção cirúrgica. **CONCLUSÕES:** Os dados mostram acentuada correlação entre tabagismo e aneurisma de aorta, sendo tal hábito um dos principais responsáveis pela alta mortalidade. Nesse prisma, esse fator está também associado graves complicações no pós-operatório, o que reforça a necessidade de desenvolver abordagens que reduzam o tabagismo, objetivando melhor prognóstico e combate do AAA.

62 - INFLUÊNCIA DO USO DA RIVASTIGMINA NO ESTRESSE OXIDATIVO CAUSADO PELA CEPA QM2 DE *TRYPANOSOMA CRUZI*

GONCALVES, B.A.; SANTOS, H.F.; ROSSI, L.F.; MARTINS, L.P.A.

Faculdade de Medicina de Marília

goncalves.barbara@outlook.com.br

INTRODUÇÃO: A Doença de Chagas (DC) é uma doença infecciosa causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*. Uma forma de manifestação clínica é a digestiva, com lesão dos plexos nervosos gastrintestinais, os quais apresentam transmissão colinérgica. Nesse contexto, destaca-se o reflexo anti-inflamatório colinérgico, onde ocorre liberação de acetilcolina pelo nervo vago e consequente atenuação da resposta inflamatória devido redução da produção de radicais livres e citocinas inflamatórias, produtos diretamente relacionados com a gênese das lesões de órgão alvo observados na DC. **OBJETIVOS:** Avaliar os efeitos da rivastigmina no estresse oxidativo causado pela cepa QM2 de *T. cruzi*. **MÉTODOS:** Serão utilizados 120 camundongos “Swiss” machos divididos em 3 grupos: 30, 60, e 180 dias. Cada grupo será subdividido em 4 subgrupos: não infectado/não tratado, não infectado/tratado, infectado/não tratado e infectado/tratado. Sessenta camundongos serão infectados com tripomastigotas da cepa QM2 de *T. cruzi*. Sessenta animais serão tratados diariamente com rivastigmina em 0,75 mg/kg. Será determinada a parasitemia pelo método de Brener; a concentração de glutathione pelo método de Beutler; a capacidade antioxidante plasmática pelo método FRAP; o TBARS pelo método de Yagi e Okhawa; a atividade da butirilcolinesterase pela análise quantitativa de pseudocolinesterase; a atividade da acetilcolinesterase por potenciometria. A análise estatística será feita por teste t de Student, ANOVA de uma via, e pós-teste de Bonferroni para três ou mais grupos; ANOVA de duas vias e pós-teste de Bonferroni para comparações entre três grupos. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que a rivastigmina aumente a disponibilidade de acetilcolina e, consequentemente, reduza a formação de radicais livres, resultando na diminuição da inflamação nos tecidos afetados pelo *T. cruzi*.

63 - INSATISFAÇÃO CORPORAL NO CICLO GRAVÍDICO PUERPERAL E A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO: REVISÃO INTEGRATIVA

SILVA, G. A.; MAZZETTO, F. M. C.

Faculdade de Medicina de Marília

alvesgiovanna212@yahoo.com

INTRODUÇÃO: A maternidade é fase crucial na vida da mulher, a imagem corporal é definida como as percepções de um indivíduo sobre o seu próprio corpo, ou seja, referindo-se a sentimentos, atitudes, percepções e comportamentos em relação ao próprio corpo. **OBJETIVOS:** Compreender as causas e implicações da insatisfação corporal da mulher no ciclo gravídico-puerperal. Analisar o papel do enfermeiro na assistência a essas mulheres e identificar estratégias eficazes para acompanhamento e tratamento de casos de insatisfação corporal e baixa autoestima durante esse período. **MÉTODOS:** Revisão integrativa de literatura utilizando as bases de dados Medline, LILACS, SciELO, Index Psicologia Periódicos, Web of Science, Scopus, EMBASE e BDENF. Aplicou-se a estratégia PICO, com filtro dos últimos 5 anos, em português, espanhol e inglês. Descritores: Mães, Gestantes, Imagem corporal, Insatisfação corporal, Período pós-parto e Gestação. **RESULTADOS:** Analisados 30 artigos, com maior publicação entre 2020-2023 (20% cada ano). 40% das revistas com Qualis A1. Web of Science e Scopus forneceram mais artigos (33,3%). Emergiram quatro categorias: imagem corporal na lactação; modificações corporais e acolhimento profissional; insatisfação corporal e risco psicossocial; influência das mídias sociais. O estudo atingiu seu objetivo de compreender o impacto da insatisfação corporal na gestação e pós-parto, revelando forte associação com riscos psicossociais como depressão perinatal, ansiedade e transtornos alimentares. **CONCLUSÕES:** A literatura carece de estudos sobre ações e estratégias para acompanhamento e tratamento da insatisfação corporal e baixa autoestima em gestantes. Sugere-se realizar novas pesquisas durante o pré-natal, visando capacitar profissionais de saúde para diagnosticar, tratar e reabilitar mulheres nessa condição. O objetivo é promover ações que incentivem o autocuidado, a integralidade e a qualidade de vida da mulher no ciclo gravídico-puerperal, bem como de sua família e comunidade.

64 - INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM NEONATOLOGIA: REVISÃO DA LITERATURA

LIMA, B.M.; GOUVEIA, R.R.

Faculdade de Medicina de Marília

brendamlima93@gmail.com

INTRODUÇÃO: os neonatos apresentam características anatômicas e fisiológicas próprias, como a laringe em uma posição mais elevada e um maior consumo de oxigênio por minuto, o que pode fazer da intubação orotraqueal nessa população um desafio ainda maior do que em crianças mais velhas e adultos. Além disso, garantir a via aérea definitiva na primeira tentativa oferece benefícios significativos, por expor o paciente a uma apneia de menor duração. Considerando a complexidade da intubação orotraqueal em neonatos, cujas taxas de sucesso na primeira tentativa variam consideravelmente, hipotetiza-se que essa diferença pode ser explicada pela ausência da normatização do processo. **OBJETIVOS:** Identificar na literatura aspectos relacionados à intubação endotraqueal em neonatologia. **METODOLOGIA:** foi realizada uma revisão integrativa de literatura baseada em uma busca em bases de dados (MedLine, Web Of Science, LILACS e Scopus) com os descritores “Intubação Intratraqueal”, “Recém-Nascido” e “Métodos” no período de 2014 a 2024. Foram incluídos os idiomas português, espanhol e inglês. Os estudos selecionados abordam todas as etapas da intubação orotraqueal. **RESULTADOS ESPERADOS:** espera-se com esse estudo apresentar uma síntese das técnicas de intubação orotraqueal em pacientes neonatos, destacando as com maior segurança e eficácia. Dessa forma, espera-se contribuir para melhorar o atendimento a esses pacientes e prevenir complicações associadas à execução da técnica do procedimento.

65 - JOGOS EDUCATIVOS VOLTADOS PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA

FERRAZ, F. M. M.; MARIN, M. J. S.

Faculdade de Medicina de Marília

flora.monteirof@gmail.com

INTRODUÇÃO: A violência contra a criança trata-se de um grave problema de saúde pública que, além de causar sofrimento momentâneo, acompanha a vítima por toda a vida, com importantes repercussões pessoais e sociais. **OBJETIVO:** analisar as evidências científicas acerca de jogos educativos voltados para crianças e adolescentes sobre a violência. **MÉTODO:** revisão integrativa da literatura, cuja busca foi realizada nas bases de dados Web of Science, Scopus, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Educational Resources Information Centre e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. Incluíram-se estudos nos idiomas inglês, português e espanhol, sem recorte de tempo, excluíram-se os estudos de reflexão teórica, revisão de literatura, teses e dissertações, bem como aqueles que não respondiam à pergunta de pesquisa. Para verificar os critérios, dois autores procederam à leitura dos títulos e resumos de forma independente, na sequência, realizou-se reunião de consenso entre todos os autores para chegar aos resultados, ao considerar o objeto de estudo, formulou-se uma questão de pesquisa: “quais os jogos educativos utilizados com crianças e adolescentes na prevenção da violência?” Frente a isso, utilizou-se da estratégia PICO, onde P= População, I= Intervenção e Co= contexto, tem-se que P= crianças e adolescentes, I= jogos educativos e Co= violência. **RESULTADOS:** os 11 estudos analisados apresentaram baixo grau de evidência e a maioria trata da violência sexual ou violência entre parceiros íntimos. Destacam os benefícios dos jogos para aprendizagem, enfatizando a importância da adequação à realidade e às necessidades do público-alvo, bem como o envolvimento ativo dos participantes. **CONCLUSÃO:** os jogos educativos são eficazes para prevenir a violência entre crianças e adolescentes, entretanto, há pouco investimento no desenvolvimento de games voltados para abordagem abrangente sobre a violência em crianças e adolescentes.

66 - METACOGNIÇÃO NA EDUCAÇÃO MÉDICA

COELHO, N. S. L.¹;FRANCISCHETTI, I.²

1. Discente do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília da cidade de Marília/SP

2. Docente da Faculdade de Medicina de Marília da cidade de Marília/SP.

nicoleslcoelho20@gmail.com

INTRODUÇÃO: Metacognição é um termo que designa o entendimento de um indivíduo sobre o próprio método de aprendizagem. Essa habilidade é fundamental para que se possa julgar adequadamente o processo de construção do conhecimento e, conseqüentemente, realizar a autorregulação das estratégias para compreender um determinado assunto. Por meio da estratégia PICO, delineou-se a pergunta de pesquisa: qual a consequência da aprendizagem baseada em problemas (I) sobre a metacognição (Co) de estudantes de medicina (P)? **OBJETIVOS:** O objetivo desse estudo foi verificar a capacidade da ABP de promover aprendizados significativos e continuados, considerando o desenvolvimento de habilidades metacognitivas, e, inclusive, o período após a formação no ensino superior. **MÉTODOS:** Tratou-se de revisão bibliográfica, nas bases de dados LILACS, MEDLINE, Scopus, Web of Science e SciELO a partir dos descritores: “Aprendizagem Baseada em Problemas”, “Metacognição”, “cognição”, “Problem-Based Learning”, “PBL”, “Problem”, “Based” e “Learning”, conectados por operadores booleanos, com a seleção de artigos, disponíveis na íntegra, e de livre acesso, nos idiomas português, espanhol e inglês, publicados de 2019 a 2024. Utilizou-se o fluxograma PRISMA para a identificação de 587 artigos, dos quais 05 responderam ao escopo deste estudo. **RESULTADOS:** Os trabalhos analisados confirmaram a hipótese de que a ABP estimula o treino das habilidades metacognitivas, uma vez que possibilita aperfeiçoamento da percepção sobre autorregulação dos estudos e postura de busca pelo saber ao longo da vida. Além disso, proporciona capacitação não apenas técnica, mas também no que se refere a lidar com questões de ordem clínica e social, sendo esse um dos diferenciais dos estudantes egressos de instituições com metodologia ABP. **CONCLUSÕES:** Verificou-se que a centralidade da aprendizagem no estudante e sua posição como protagonista na construção de seu conhecimento, possibilitada pela ABP, colabora para o treino da metacognição, uma vez que viabiliza cenários em que habilidades metacognitivas, como autopercepção, autoavaliação e autorregulação, são necessárias.

67 - MIASTENIA GRAVIS: MÉTODOS DE TRATAMENTO E A MEDICINA PERSONALIZADA

HARTMANN, L. E.; ZACARIAS, J. M. V.

Faculdade de Medicina de Marília

lucianohartmann00@gmail.com

INTRODUÇÃO: A miastenia gravis (MG) é uma doença autoimune caracterizada pelo ataque de anticorpos às estruturas da junção neuromuscular, comprometendo a função motora. Os tratamentos convencionais, como imunossupressores, inibidores da acetilcolinesterase, timectomia e plasmaférese, apresentam eficácia variável entre pacientes devido à heterogeneidade de resposta. Diante disso, este estudo investiga a hipótese de que biomarcadores genéticos específicos possam prever a eficácia ou rejeição aos tratamentos, permitindo intervenções personalizadas. Essa abordagem visa aprimorar a resposta terapêutica e aumentar o sucesso no manejo de MG. **OBJETIVO:** Este projeto objetiva investigar novas terapias medicamentosas e estratégias para melhorar a aceitação e eficácia dos tratamentos em miastenia gravis, com foco no desenvolvimento e aplicação de biofármacos específicos. Espera-se identificar como a medicina personalizada, por meio da análise do perfil genético dos pacientes, pode otimizar a escolha do tratamento, maximizando a eficácia e minimizando reações adversas. **MÉTODO:** O projeto visa realizar uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, Embase, SciELO e LILACS, abrangendo os trabalhos publicados entre 2004 e 2024, nos idiomas espanhol, inglês e português, utilizando os descritores: 'miastenia gravis', 'medicina de precisão', 'biomarcadores', 'autoimunidade', 'imunossupressores', 'terapêutica' a fim de responder sobre a pergunta do trabalho que questiona a eficácia da medicina personalizada no aumento do sucesso terapêutico sobre o tratamento da MG. **RESULTADOS ESPERADOS:** Dessa forma, o trabalho espera listar as medidas terapêuticas de maior eficácia no cenário de aplicação da medicina de precisão para os pacientes, e seu impacto na melhora ou no retardamento do agravamento das condições motoras, em contraste com os métodos de intervenção atuais.

68 - NEAR MISS NEONATAL: DEFINIÇÕES, PROBLEMÁTICAS E RELEVÂNCIA NA SAÚDE NEONATAL

AGGIO, C. M.

Faculdade de Medicina de Marília

crisaggio@gmail.com

INTRODUÇÃO: A identificação e o manejo do *Near Miss Neonatal* (NNM) carecem de critérios padronizados, dificultando a comparação entre estudos e a melhoria dos sistemas de saúde neonatal. Dada a importância do NMN para a redução da morbimortalidade neonatal grave, a padronização dos critérios e a análise sistemática desse fenômeno são essenciais ao aprimorar a qualidade do cuidado neonatal. **OBJETIVO:** Analisar a produção científica sobre o NMN, explorando suas definições, critérios de identificação e implicações para a qualidade do cuidado neonatal. **MÉTODO:** Será realizada uma revisão rápida da literatura, com base em duas outras revisões, incluindo uma de escopo. A busca será realizada em bases de dados eletrônicas, incluindo artigos até 2024, com as palavras-chave: *neonatal near miss*, *near miss*, *nursing*, *nurse*, *newborn*, *infant*, e os operadores booleanos. Serão incluídos estudos primários sobre NMN, excluindo duplicados e textos inacessíveis. A seleção dos estudos seguirá o protocolo PRISMA, com uso do software Mendeley para gerenciamento. Dois revisores independentes avaliarão títulos e resumos, e os dados dos artigos selecionados serão inseridos em planilha padronizada, incluindo informações como: título, ano, tipo de estudo, definição e critérios de NMN, desfechos clínicos, e lacunas identificadas. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se uma síntese abrangente das definições e critérios de NMN, além de uma categorização dos fatores associados, como complicações neonatais e intervenções clínicas. A análise fornecerá informações valiosas para aprimorar a atenção neonatal, identificar variações regionais e lacunas na literatura, e orientar futuras pesquisas na área.

69 - O ENFERMEIRO E O BRINQUEDO TERAPÊUTICO PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS DE TRÊS A CINCO ANOS: REVISÃO INTEGRATIVA

SIMIONATO, M.J.F.M.; CARVALHO, M.H.R.

Faculdade de Medicina de Marília

mjoana548@gmail.com

INTRODUÇÃO: A utilização do Brinquedo Terapêutico em crianças hospitalizadas foi instituída pela resolução do COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) Nº 546/201, posto que por meio desta prática, o enfermeiro consegue compreender os sentimentos e necessidades das crianças a fim de promover o cuidado integralizado da assistência com o brincar. **OBJETIVO:** Identificar a função do enfermeiro na aplicação do brinquedo terapêutico em crianças hospitalizadas de três a cinco anos no período de 2014 a 2024. **MÉTODO:** Revisão integrativa de literatura (RIL) com a finalidade de sintetizar o conhecimento e aplicar os resultados a partir de estudos significativos na prática. A estratégia usada para a elaboração da questão norteadora foi a PICO: “Qual a função do enfermeiro na aplicação do brinquedo terapêutico em crianças hospitalizadas de 3 a 5 anos?” As bases eletrônicas de dados utilizadas foram LILACS, MEDLINE, Scielo e BDEnf, encontrados 1342 artigos, retirando as duplicatas pelo EndNote restando 975 artigos. Os critérios de inclusão foram os artigos relacionados ao tema, nos idiomas português, inglês e espanhol, e os de exclusão as revisões de literatura, livros, dissertações e teses. **RESULTADOS ESPERADOS:** Por fim, a amostra definitiva está sendo selecionada e os resultados serão analisados qualitativamente por meio de categorias temáticas e apresentados em quadros ou tabelas, conforme pertinência do estudo.

70 - O USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA

NOVAIS, B.K.T.; GIMENEZ F.V.M.

Faculdade de Medicina de Marília

brunokendytn@gmail.com

INTRODUÇÃO: As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) abrangem uma variedade de abordagens terapêuticas que visam promover a saúde de maneira integral. No Brasil, essas práticas são institucionalizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). O climatério e a menopausa representam fases desafiadoras para as mulheres, com sintomas que impactam sua qualidade de vida. As PICS podem oferecer um suporte adicional para o manejo desses sintomas, promovendo bem-estar físico, emocional e psicossocial. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo geral identificar e caracterizar como o uso de PICS pode melhorar a qualidade de vida de mulheres durante o climatério e a menopausa, bem como caracterizar as práticas mais utilizadas e os efeitos das terapias alternativas no alívio dos sintomas do climatério e da menopausa. **MÉTODOS:** pretende-se realizar uma Revisão Integrativa de Literatura (RIL). Por meio do acrônimo PICo, estruturou-se a questão: Como o uso de PICS podem proporcionar uma melhor qualidade de vida para mulheres no período de climatério e menopausa? A busca será realizada em bases de dados como LILACS, MEDLINE e SciELO, utilizando descritores práticas complementares e menopausa. Como critérios de inclusão serão selecionados artigos publicados nos últimos dez anos, em português, inglês e espanhol, sendo excluídos materiais que não abordem uma das 29 PICS incluídas no SUS e que não atendam os critérios de inclusão. Para análise dos artigos serão avaliados ano de publicação, objetivo, tipo de estudo, nível de evidência, principais resultados e como cada artigo responde à pergunta de pesquisa. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se a partir dos resultados deste estudo, identificar as PICS mais utilizadas durante o climatério e a menopausa incluindo a caracterização das práticas mais utilizadas pelas mulheres nessa fase, identificando quais abordagens terapêuticas têm maior aceitação e efetividade; destacando aquelas com respaldo em materiais científicos de alta qualidade.

Agradecimento:** “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

71 - OBSTÁCULOS ENFRENTADOS PELAS MÃES NO ÂMBITO DA SAÚDE OCUPACIONAL EM SEUS ESFORÇOS PARA PROMOVEREM A AMAMENTAÇÃO MATERNA ENQUANTO OCUPAM UM EMPREGO FORMAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA

OLIVEIRA, D.P.; RAIMUNDO, M.E.; BARBOSA, J.P.

Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista- FAIP

deboraoliveiralr49@gmail.com

INTRODUÇÃO: O alicerçamento das mulheres no mercado de trabalho tem sido uma prioridade na sociedade moderna. Com isso, a maternidade vem sendo cada vez mais adiada, principalmente por questões relacionadas à carreira profissional, estabilidade financeira e consolidação de relacionamentos. Apesar de avanços na igualdade de gênero, as mulheres ainda enfrentam dificuldades na conciliação entre maternidade e carreira, como o abandono da amamentação exclusiva antes dos 6 meses de vida dos filhos. **OBJETIVOS:** O presente trabalho busca identificar na literatura os obstáculos enfrentados pelas mães no ambiente de saúde ocupacional, especificamente em relação ao aleitamento materno durante o emprego formal. A pergunta de pesquisa é: “Quais os principais obstáculos enfrentados por mães em seus empregos formais para manter a amamentação de seus filhos durante os 24 meses de vida?”. **MÉTODOS:** Foi realizada uma Revisão Integrativa de Literatura (RIL), com as seguintes fases: definição da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica, discussão dos resultados e conclusão. A pesquisa foi feita em bases de dados como PUBMED e BVS, publicadas no período de 2019 a 2024, com o apoio de ferramentas de inteligência artificial para otimizar buscas e recomendações de literatura relevante. Ao todo, foram recuperados 554 artigos, dos quais 10 foram incluídos. **RESULTADOS:** Estudos indicam que mães enfrentam diversos desafios ao amamentar e trabalhar, como ausência de locais apropriados para amamentação, inflexibilidade de horários, variação no apoio conforme setor e cargo, além de estigmatização e baixo suporte de gestores e colegas. A falta de políticas institucionais e o limitado reconhecimento do aleitamento materno evidenciam a necessidade de mudanças no ambiente de trabalho. **CONCLUSÕES:** As barreiras incluem ausência de horários flexíveis, licenças inadequadas e apoio insuficiente no trabalho. Além disso, identificamos deficiências em relação à escassez de pesquisas brasileiras nesse domínio, indicando que pesquisas acadêmicas adicionais são necessárias em nosso país para facilitar alteração ou o alívio dessa situação.

72 - PANORAMA DO CONHECIMENTO E INTERESSE DOS PROFISSIONAIS E ACADÊMICOS DA SAÚDE NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

SANTOS, A. L. S.; COSTA, C. A. R. A.

Faculdade de Medicina de Marília

lauraanasouzas@gmail.com

INTRODUÇÃO: As práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são métodos que integram a promoção em saúde e complementam os tratamentos em uso pelos pacientes, analisando integralmente os pacientes. **JUSTIFICATIVA:** As PICS ainda são restritas aos indivíduos, seja pelo desconhecimento dos seus benefícios, ou alto valor cobrado para aplicação. Na literatura analisada, boa parte dos acadêmicos e profissionais da área da saúde também desconhecem as PICS, pela deficiência do tema na graduação e na vida profissional. **OBJETIVO:** Avaliar o grau de conhecimento, acesso e interesse nas PICS dos estudantes de medicina e enfermagem, seus professores e profissionais da área da saúde. **METODOLOGIA:** Foi aplicado questionário online (Google Forms) aos alunos de medicina e enfermagem, aos docentes e profissionais da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), sendo a pesquisa exploratória, descritiva e de caráter quali-quantitativo, apresentada por meio de análise descritiva dos dados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Como resultado, aproximadamente 80% dos entrevistados tem conhecimento sobre as PICS. Quanto ao acesso, cerca de 37% da população estudada nunca usaram nenhuma prática. As mais usadas foram meditação, fitoterapia e MTC. Acredita-se que a meditação está entre as mais usadas devido ao baixo custo, e a MTC devido ser especialidade médica há muitos anos. Cerca de 92% dos entrevistados referiram ter interesse nas PICS, e aproximadamente 95% usaria se as fossem disponibilizadas FAMEMA. Aproximadamente 96% acredita na relevância das PICS nos serviços de saúde, dado este em consonância com outros estudos avaliados. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que já se existe um amplo conhecimento sobre as PICS, porém ele seria maior e mais consistente se a temática fosse inclusa no ensino dos cursos de enfermagem e medicina, e nos programas de educação continuada aos profissionais, já que esta população tem alto nível de interesse. Também se concluiu que, mesmo com interesse quase unânime, o acesso é fragmentado, devido aos custos e falta de acessibilidade.

73 - PAPEL DA INTERLEUCINA-6 E FATOR DE NECROSE TUMORAL- α NAS ALTERAÇÕES INFLAMATÓRIAS DO PVAT PROMOVIDAS PELA ARTRITE

NOGUEIRA, L. C. P.¹; NASCIMENTO, I. F. S.²; OLIVEIRA P. B.³; MACHADO, T. A. R.⁴; SPADELLA, M. A.⁵; CHIES, A. B.⁶

1. Discente do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) da cidade Marília-SP. ;2. Pós-graduanda da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) da cidade Marília-SP. ; 3. Laboratorista do Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) da cidade Marília-SP. ; 4. Docente da disciplina de Reumatologia da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) da cidade Marília-SP. ; 5. Docente da disciplina de Embriologia Humana da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) da cidade de Marília-SP. ; 6. Docente da Disciplina de Farmacologia e Terapêutica Experimental da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) da cidade de Marília-SP.

luisacnogueira2003@gmail.com

INTRODUÇÃO: A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória que acomete as articulações. Interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral (TNF- α), oriundas das articulações inflamadas, podem chegar ao tecido adiposo perivascular (PVAT) pela circulação e promover alterações estruturais e funcionais, predispondo a doenças cardiovasculares. Assim, compreender o papel dessas citocinas nas alterações do PVAT causadas pela artrite pode auxiliar no monitoramento e tratamento de danos no sistema cardiovascular. **OBJETIVO:** estudar o papel do TNF- α e IL-6 nas alterações inflamatórias promovidas pela AIA no PVAT da aorta torácica de ratos. **MÉTODOS:** 23 animais submetidos à artrite induzida por adjuvante (AIA), distribuídos em três grupos: veículo (n=7); infliximabe (IFX; n=8), 5mg/kg/semana, ip (bloqueador de TNF α); tocilizumabe (TCZ; n=8) 8mg/kg a cada duas semanas, ip (bloqueador de IL-6) a partir do 15º dia após indução da AIA, até o 50º dia pós indução, quando foram sacrificados. No 50º dia pós-indução, foram mensuradas massa e composição corporal, diâmetro das patas e ingesta de ração e, nas amostras de PVAT e tecido adiposo retroperitoneal (RETRO), foi estimada a infiltração de polimorfonucleares e mononucleares pela quantificação da atividade das enzimas mieloperoxidase (MPO) e N-acetilglicosaminidase (NAG), respectivamente. Resultados foram comparados por ANOVA de uma via, seguida pelo pós-teste de Bonferroni ou teste de Kruskal-Wallis; diferenças significativas se $p < 0,05$. Estudo aprovado no CEUA-Famema, protocol. n° 1010/23. **RESULTADOS PARCIAIS:** Não houve modificação de massa e composição corporal, diâmetro das patas ou ingesta de ração entre os grupos. O IFX reduziu tanto MPO quanto NAG no PVAT, mas apenas MPO no RETRO. O TCZ reduziu NAG apenas no PVAT. **CONCLUSÃO:** O bloqueio de TNF α ou IL-6 não parece modificar edema da pata nem massa e composição corporal dos animais. Porém, o bloqueio do TNF α , reduziu infiltração de polimorfonucleares em PVAT e no RETRO. Já a infiltração de mononucleares no PVAT, mas não no RETRO, é reduzida tanto pelo bloqueio tanto de TNF α quanto de IL-6.

74 - PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS DE ESTUDANTES DE MEDICINA E ENFERMAGEM COM CIGARROS ELETRÔNICOS

SILVA, L.O.; NONATO, A.C.; PIO, D.A. M.; BARBOSA, V. B. A.

Faculdade de Medicina de Marília;

layanaenf@gmail.com

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, o consumo de cigarros eletrônicos tem despertado crescente preocupação em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil, pois têm ganhado popularidade especialmente entre os jovens; contudo, seu uso compromete a saúde desses indivíduos, como demonstrado pelo surto de doenças pulmonares graves associadas ao uso desses aparelhos em 2019. Assim, justifica-se a necessidade de realizar pesquisas sobre a temática dentro do contexto acadêmico. **OBJETIVO:** Analisar a experiência de estudantes de medicina e enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) com o uso do cigarro eletrônico. **MÉTODOS:** Trata-se de pesquisa quantiquantitativa exploratória com estudantes de medicina e enfermagem da FAMEMA. Inicialmente, será aplicado um questionário no Google Forms, considerando idade, gênero, raça/cor, medidas corporais, prática de atividade física, uso de cigarros eletrônicos ou convencionais e consumo de álcool. Na sequência, perguntas em escala Likert sobre a experiência com cigarros eletrônicos. Os dados coletados serão avaliados através de tabelas de frequência e pontuação das respostas Likert. Na segunda etapa, estudantes com pontuações extremas relacionadas ao uso de cigarro eletrônico serão escolhidos para entrevistas semiestruturadas que buscam entender suas percepções e experiências. Por fim, os dados serão analisados por meio da Análise de Conteúdo, na modalidade temática. **RESULTADOS ESPERADOS:** Diagnosticar os fatores demográficos possivelmente associados ao uso de cigarros eletrônicos, considerando a tendência global de aumento de uso entre os jovens, compreender em profundidade das percepções e motivações dos estudantes em relação ao uso destes dispositivos.

75 - PERFIL DAS IMUNOGLOBULINAS NAS DIFERENTES FASES DO LEITE HUMANO: COLOSTRO, LEITE DE TRANSIÇÃO E LEITE MADURO

RIUL, E.N.¹; ZACARIAS, J.M.V.²

1.Discente do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

2.Professora adjunta doutora da disciplina de Imunologia da Faculdade de Medicina de Marília

eduriul@gmail.com

INTRODUÇÃO: O leite humano (LH) contém fatores nutricionais e também componentes bioativos como as Imunoglobulinas (Igs) que desempenham um papel de proteção passiva do lactente e auxiliam na maturação do seu sistema imunológico. O perfil das Igs pode variar nas diferentes fases da lactação: colostro, leite de transição e leite maduro. No entanto, há diversidade nos resultados de estudos que relatam a concentração dessas Igs, e estudos que comparam as Igs (IgA, IgG, IgM, IgD, IgE) nas diferentes fases do LH são escassos. **OBJETIVOS:** Identificar o perfil das diferentes imunoglobulinas nas diversas fases do LH; identificar padrões gerais relacionados à presença de Igs e entender como elas atuam na imunidade do lactente; identificar possíveis fatores associados às mudanças na concentração das Igs. **MÉTODO:** Revisão sistemática da literatura nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, Embase, Scielo e Lilacs, nos estudos publicados entre os anos de 1994 e 2024 nos idiomas português, inglês e espanhol, utilizando os descritores “leite humano”, “leite materno”, “lactação”, “colostro”, “leite de transição”, “leite maduro”, “imunoglobulinas”, “anticorpos”, “IgA”, “IgG”, “IgD”, “IgE”, “IgM”, combinados com os operadores booleanos (AND, OR) e será realizada uma síntese qualitativa e quantitativa dos estudos selecionados para realização da análise e comparação das concentrações das Igs nas diferentes fases do LH. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se mapear e categorizar as Igs presentes nas diferentes fases da lactação humana, detectar fatores que podem alterar a concentração das Igs do LH e como elas podem influenciar na modulação da imunidade do lactente.

76 - PERFIL DE CITOCINAS NAS DIFERENTES FASES DO LEITE HUMANO: COLOSTRO, LEITE DE TRANSIÇÃO E LEITE MADURO

MONTE, F.P.F.¹; ZACARIAS, J.M.V.²

1. Discente de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)
2. Professora Adjunta Doutora da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

fernandapfmonte@gmail.com

INTRODUÇÃO: Os benefícios do aleitamento materno são vastos e fundamentais para o desenvolvimento infantil. O leite humano (LH) contém compostos bioativos derivados do epitélio mamário e da circulação materna que regulam o sistema imunológico do recém-nascido (RN) e do bebê durante a fase de lactação. Os diferentes estágios da lactação (colostró, leite de transição e leite maduro) respondem às necessidades do lactente e variam em concentração e tipos de bioativos. Dentre os compostos bioativos presentes no LH destacam-se as citocinas, que são diversas e têm papel fundamental na modulação do sistema imune dos bebês. **OBJETIVOS:** Identificar e analisar o perfil de citocinas nas diferentes fases do LH. **MÉTODO:** Revisão sistemática da literatura utilizando a combinação de descritores com operadores booleanos: (Human Milk OR Breast Milk OR Lactation) AND (Cytokines OR Inflammatory Mediators OR Immunomodulatory Proteins) AND (Neonates OR Infants). As buscas serão realizadas nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, Embase, Scielo e Lilacs entre os anos de 1994 e 2024, nos idiomas inglês, português e espanhol. Será realizada uma revisão de estudos conforme os critérios de inclusão, analisando dados como ano de publicação, características da população, tamanho da amostra e perfil de citocinas. A síntese qualitativa dos resultados categorizará as citocinas em cada fase do LH com base nas evidências. **RESULTADOS ESPERADOS:** Identificar um conjunto de citocinas presentes em cada fase do LH e compreender melhor seus papéis no desenvolvimento imunológico dos neonatos. A revisão sistemática pretende contribuir para uma compreensão mais profunda das interações imunológicas mediadas pelo LH, potencialmente melhorando as práticas de alimentação infantil e saúde neonatal, além de fornecer resultados importantes para a comunidade científica, influenciar práticas clínicas e políticas de saúde relacionadas à nutrição infantil e promoção da imunidade neonatal.

77 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE EM UMA CIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

FREITAS, L.O.C.; CHERAIN, L.M.A.; DARWIN, F.R.; MARTINS, L. P. A.; TRONCOSO, F. T.

Faculdade de Medicina de Marília

letfreitass7@gmail.com

INTRODUÇÃO: A paracoccidiodomicose, doença causada por fungos do gênero *Paracoccidioides*, trata-se de uma micose sistêmica, que provoca alterações na pele, mucosas, pulmões, suprarrenais e órgãos do sistema reticuloendotelial. Epidemiologicamente, é restrita às áreas subtropicais da América Latina, sendo o Brasil o país com maior número de casos. Os fungos estão presentes em aerossóis e solos, a sua transmissão se faz pela via aérea, e o contágio é associado às atividades de contato direto com o solo. Quanto aos fatores associados ao desenvolvimento da doença, destacam-se o tabagismo, etilismo, desnutrição, HIV, neoplasias, transplantes e imunobiológicos. Apresenta pico de incidência entre 10 e 20 anos e predomínio do sexo masculino. A maioria dos indivíduos desenvolve infecção subclínica ou assintomática, devido a uma resposta imune específica. Quanto ao diagnóstico, se dá através de exames diretos, por meio de amostras de escarro ou exsudato, ou por biópsia com coloração prata de Gomori, isolamento em cultura e testes imunes. O tratamento varia conforme a apresentação da doença. Em casos leves a moderados, a escolha é o Itraconazol, enquanto em casos graves, Anfotericina B ou Cotrimoxazol. **OBJETIVO:** O estudo tem como objetivo demarcar o perfil da PCM em um hospital de referência no interior do estado de São Paulo, através de uma retrospectiva dos últimos 13 anos, delineando dados epidemiológicos, desfecho clínico e aspectos terapêuticos de pacientes acometidos, a fim de correlacionarmos. **MÉTODOS:** A fonte de informação do estudo consiste em prontuários de pacientes diagnosticados, confirmados no período de 2010 a 2023, com tamanho da amostra de 84. Todos os elementos coletados serão inseridos em uma tabela e avaliados. **RESULTADOS ESPERADOS:** Dada a alta prevalência da doença em áreas subtropicais, de acometimento importante no país e numerosos casos diagnosticados no Hospital em questão, espera-se delimitar um perfil típico de pacientes, sendo em sua maioria indivíduos jovens, do sexo masculino, provenientes de áreas rurais e tabagistas.

78 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS EM UMA ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER: PERCEPÇÃO DOS PACIENTES

DUARTE, G. C. M.¹; SILVA, C. S. D.¹; SILVA, E. M.²; OTANI, M. A. P.¹

1. Faculdade de Medicina de Marília

2. Associação de Combate Ao Câncer de Marília e Região

giocmduarte97@gmail.com

Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) têm sido amplamente utilizadas por pessoas com doenças oncológicas que necessitam de cuidados para lidar com as limitações, contribuindo para a manutenção e a recuperação da saúde, com uma abordagem humanizada e integral. **Objetivo:** geral: analisar a percepção dos pacientes com câncer sobre a utilização de Práticas Integrativas e Complementares em saúde (PICS) oferecidas por uma Associação de Combate ao Câncer (ACC) e; específicos: a) identificar os benefícios da utilização das PICS para os pacientes; b) Identificar os fatores que facilitam e os que dificultam a utilização das PICS. **Método:** Estudo exploratório, com abordagem quanti-qualitativa realizado com pacientes oncológicos que utilizam alguma prática integrativa. Será desenvolvido na ACC de Marília e região. A coleta dos dados será realizada por meio de duas entrevistas semi estruturadas e questionários validados para avaliação de dor, de humor e de ansiedade. Tais instrumentos serão utilizados antes do início da terapêutica com pelo menos uma das práticas integrativas e após sua finalização. Os dados serão coletados nas dependências do local de estudo, em períodos pré agendados. As entrevistas serão gravadas em áudio para posterior transcrição. Os critérios definidos para a inclusão dos participantes são: a) ter 18 anos ou mais; b) ter diagnóstico médico de câncer; d) realizar pelo menos uma das práticas integrativas oferecidas pela ACC; e) possuir condições de comunicação para responder às entrevistas. Os dados qualitativos serão analisados de acordo com a Análise de Conteúdo, modalidade temática e os quantitativos, por meio da estatística descritiva. O projeto encontra-se em análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Famema. **Resultados esperados:** Espera-se que a implementação das PICS para os pacientes com câncer traga benefícios como melhora da dor, diminuição dos efeitos colaterais do tratamento oncológico, melhora do humor e da ansiedade. As facilidades incluem o fornecimento das PICS pela ACC, e quanto às dificuldades, a distância do serviço e transporte para locomoção.

79 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DURANTE O PARTO

ALVES, J. M.¹; BARBOSA, J. P.¹; SANTOS, M. G. S.¹

1. Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista- FAIP

ead.josianaalves@gmail.com

INTRODUÇÃO: A gestação e o parto são períodos críticos na vida da mulher, marcados por mudanças físicas, emocionais e sociais. Tradicionalmente, a assistência médica focava na prevenção de complicações, mas o crescente interesse por Práticas Integrativas e Complementares (PICs) oferece uma nova perspectiva sobre o bem-estar materno e fetal. As PICs incluem terapias como acupuntura, yoga e aromaterapia, promovendo uma abordagem holística que valoriza a saúde integral da gestante. **OBJETIVO:** Compreender como as práticas integrativas e complementares contribuem positivamente durante o parto. **MÉTODOS:** Este estudo consistiu em uma revisão integrativa qualitativa, analisando artigos relevantes e recentes sobre o tema. Foram selecionados quinze artigos, além de referências de instituições como o Ministério da Saúde e a OMS. **RESULTADOS:** A Organização Mundial da Saúde e o Sistema Único de Saúde no Brasil reconhecem as PICs como fundamentais para melhorar o atendimento. A assistência à gestação, historicamente dominada por abordagens biomédicas, agora enfrenta uma demanda crescente por métodos integrativos e personalizados. As PICs não apenas aliviam desconfortos físicos e emocionais, mas também favorecem um parto mais humanizado, respeitando as escolhas da mulher e criando um ambiente acolhedor. Técnicas de relaxamento e meditação auxiliam na gestão da dor e fortalecem o vínculo entre mãe e bebê. **CONCLUSÕES:** As PICs se mostram uma resposta valiosa às necessidades de cuidados holísticos na gestação e parto, com benefícios significativos na redução de dor e complicações. A integração segura dessas práticas à assistência obstétrica é crucial, e é essencial promover a continuidade da pesquisa e educação nessa área para garantir que as PICs sejam aplicadas de maneira eficaz e segura.

80 - PREVALÊNCIA DO USO DE E-CIGS ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE

JANUARIO, F. G.¹; DUZZI, B. S.¹; ASSAO, A.¹

1. Faculdade de Medicina de Marília

fegjanuario@gmail.com

INTRODUÇÃO: Os cigarros eletrônicos (e-Cigs) merecem atenção dos gestores em saúde devido a sua popularização no mercado e sua voga como uma alternativa segura aos produtos de tabaco convencionais. Todavia, tal visão alternativa sobre esses dispositivos não é verdadeira, visto os danos associados ao seu uso, como as neoplasias malignas de cabeça e pescoço, e a nova enfermidade chamada EVALI (e-cigarette and vaping associated lung injury). Além disso, os estudos indicam uma incidência crescente de jovens universitários que utilizam essas substâncias, assim como uma possível influência em sua conduta profissional. **OBJETIVOS:** Verificar a incidência do consumo de cigarros eletrônicos na população de alunos de instituições de ensino superior da área da saúde e sua relação com a profissão. **MÉTODO:** Será realizado um levantamento epidemiológico, através de um questionário que será aplicado ao público alvo. O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados obtidos serão tabulados e analisados estatisticamente. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se uma incidência alta de jovens universitários da área da saúde que utilizam os e-Cigs, que conhecem os malefícios deste dispositivo e uma possível influência em sua conduta profissional.

81 - RASTREIO DE AVALIAÇÕES DE PRONTIDÃO FÍSICA E PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE ATLETAS MASTER BRASILEIROS

SERANTOLA, J.C.¹; ROSSI, M.B.¹; RODRIGUEZ, T.M.¹; OLIVEIRA, F.¹; SILVA, F.V.L.¹; SCIAMANA, C.¹; MILAN-MATTOS, J.C.¹; PANTONI, C.B.F.¹

1. Universidade Federal de São Carlos

jhenifer.serantola@estudante.ufscar.br

INTRODUÇÃO: A participação crescente de pessoas em atividades esportivas, incluindo indivíduos mais velhos – conhecidos como atletas master –, tanto em modalidades amadoras quanto competitivas, tem se tornado uma realidade cada vez mais comum. Contudo, muitos desses atletas praticam exercícios físicos sem passar por uma avaliação prévia ou receber orientação profissional adequada, o que pode comprometer sua saúde e segurança. **OBJETIVOS:** Rastrear se os atletas master realizam alguma avaliação de saúde prévia ao início da realização do esporte e qual o tipo de avaliação; identificar se os atletas master respondem ou responderam ao Questionário de Prontidão para Atividade Física para Todos (PAR-Q+) previamente ao início da realização do esporte; identificar, por meio da aplicação do questionário PAR-Q+, a necessidade de avaliação por um médico antes do início da atividade física. **MÉTODOS:** Estudo observacional, transversal, quantitativo e descritivo. Serão recrutados voluntários de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 25 anos, praticantes de esportes master no Brasil. OS participantes passarão pelas seguintes etapas: caracterização do perfil sociodemográfico e clínico; rastreio do tipo, frequência semanal e horas diárias do esporte que realizam; se realizaram alguma avaliação antes do início do esporte; se já responderam ao questionário PAR-Q+ antes do início da prática esportiva, e a aplicação do PARQ+. Os dados serão apresentados em média e desvio padrão ou frequência absoluta e relativa. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se, com este estudo, avaliar o perfil dos atletas master quanto às características sociodemográficas e clínicas, perfil de cuidado com a saúde, com a realização de avaliações prévias ao início do exercício, e prontidão para atividade física, permitindo um olhar mais atento à saúde destes atletas e contribuindo para o aperfeiçoamento do cuidado à saúde destes participantes.

Agradecimento*: PIBIC/CNPq/UFSCar.

82 - SABER CUIDAR: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO APLICATIVO PARA PREVENIR A VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA

TINELLI, M. L. D.; VERNASQUE, J. R.; MARIN, M. J. S.

Faculdade de Medicina de Marília

laura.dordal@gmail.com

Introdução: O envelhecimento populacional tem crescido de forma significativa, impulsionado pela queda na mortalidade e pelo aumento da expectativa de vida, o que resulta em um novo perfil epidemiológico e na crescente demanda por cuidadores familiares, com desafios e necessidades. Para apoiar esses cuidadores e prevenir o risco de se tornarem agressores, propomos o uso da gamificação como ferramenta de suporte informativo responsável por influenciar a mudança de hábitos. **Objetivo:** Desenvolver e validar o protótipo do aplicativo *Saber Cuidar*, focado na prevenção da violência contra a pessoa idosa por seus cuidadores familiares. **Método:** O estudo envolve conhecimentos técnico-científicos através da construção do protótipo do aplicativo realizado na plataforma *Canva* por estudantes de enfermagem e fisioterapia. Os dados quantitativos foram obtidos durante a validação dos conteúdos, realizada por profissionais da enfermagem, psicologia, médico, assistente social, técnico de informática e pelos cuidadores familiares. **Resultados:** O conteúdo do protótipo é pautado em materiais informativos referentes a higiene, locomoção, cuidados com medicações, manobras de emergência e autocuidado destinados ao cuidador. Além disso, a plataforma será capaz de armazenar dados acerca do idoso, como quais as medicações fez o uso, sobre alimentação, eliminações e disposição do idoso. A avaliação de onze juízes sobre conteúdo, interface, vídeos informativos e relevância do aplicativo obteve um consenso favorável, com um Coeficiente de Validade de Conteúdo de 0,98. Os especialistas sugeriram melhorias como a inclusão de temas como espiritualidade, socialização, violência contra o idoso, direitos e deveres do cuidador. A grande quantidade de imagens e vídeos educativos foi apontada como um aspecto negativo. **Conclusão:** O protótipo do aplicativo demonstrou um alto coeficiente de validade de conteúdo, com grande aceitação por parte dos avaliadores. Além disso, através da validação, o aplicativo tem a capacidade de prevenir a violência contra pessoas idosas, principalmente por seus cuidadores familiares, através de seu suporte informativo.

83 - SÍFILIS GESTACIONAL NO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE IX DO ESTADO DE SÃO PAULO ENTRE 2014 E 2023: ESTUDO DE CASO-CONTROLE

SILVA, J.E.¹; NONATO, A.C.²; BARBOSA, V.B.A.³; PIO, D.A.M.³

1. Discente do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Marília
2. Professora voluntária da Faculdade de Medicina de Marília
3. Professora Adjunta Doutora da Faculdade de Medicina de Marília

julia.esteca@gmail.com

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença que representa um grande desafio para a saúde pública no Brasil. A partir disso, desenvolve-se a necessidade de entender como fatores sociodemográficos e clínicos interferem na ocorrência da Sífilis Gestacional na região do Departamento Regional de Saúde (DRS IX) do Estado de São Paulo. **OBJETIVOS:** Analisar as exposições maternas e sua associação à incidência de sífilis em gestantes atendidas na DRS IX entre 2014 e 2023. **MÉTODOS:** estudo epidemiológico do tipo caso-controle, envolvendo gestantes com sífilis atendidas na DRS IX entre 2014 e 2023. A definição de caso será gestante com CIDs compatíveis com sífilis, conforme registro no SIA-SUS. Serão analisadas variáveis sociodemográficas e clínicas, além do cruzamento, por meio do sistema de dispensação de medicamentos de peso e altura. Esses dados também serão triangulados com os dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) de sífilis em gestantes. Os dados serão sistematizados no software EpiData para bancos de dados e analisados por meio do software Stata, para análises estatísticas descritivas e medidas de efeito, como odds ratio. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se alcançar uma comparação entre a frequência observada e a frequência relatada na literatura, identificar fatores de risco associados modificáveis e não modificáveis da sífilis gestacional, além de fomentar políticas públicas de cuidados a gestantes com sífilis.

Agradecimento: O presente trabalho foi realizado com apoio do PIBIC/CNPq – Processo 125131/2024-0 Vigência 01/09/2024 a 31/08/2025 ao qual agradecemos.

84 - TENDÊNCIA TEMPORAL E ESPACIAL DA SÍFILIS GESTACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS: ESTUDO ECOLÓGICO MISTO

BARBOSA, L. B. B.¹; NONATO, A. C.²

1. Aluna da Graduação de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília

2. Professora Voluntária da Faculdade de Medicina de Marília.

larabelao@gmail.com

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento significativo nos casos de sífilis em gestantes. De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2021, o número de casos aumentou em mais de 400%. No estado de São Paulo, dados do Centro de Vigilância Epidemiológica mostram que, em 2019, foram notificados cerca de 18.000 casos. A detecção precoce e o tratamento adequado da sífilis durante a gravidez são essenciais para prevenir desfechos adversos e garantir a saúde materna e neonatal. **OBJETIVOS:** Analisar as características sociodemográficas da população de gestantes com sífilis no estado de SP, bem como examinar a distribuição espacial, investigar as características clínicas e determinar a prevalência e calcular o risco de sífilis entre essas gestantes. **MÉTODOS:** Este estudo ecológico misto abrange o período de 2014 a 2023, utilizando dados agregados de sistemas de informação de saúde, como o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sistema de Informações Ambulatoriais e Sistema de Informação Hospitalar. A população-alvo inclui todas as gestantes diagnosticadas com sífilis no estado de SP. Os dados serão extraídos por município de residência e ano de notificação dos casos de sífilis em gestantes, conforme registrado nos sistemas de informação mencionados. As variáveis incluem dados antropométricos das gestantes, como idade e peso, número de casos de sífilis gestacional por ano, distribuição geográfica dos casos, estágio da sífilis e o tratamento realizado. A análise estatística será ampla, buscando identificar padrões e tendências gerais nos dados. Uma análise temporal avaliará o aumento dos casos ao longo dos anos, com foco em indicadores como prevalência, razão de prevalência e odds ratio. A análise espacial identificará as regiões - municípios e divisões geopolíticas do estado - com maior incidência de casos de sífilis em gestantes. **RESULTADOS ESPERADOS:** Fornecer uma visão abrangente sobre a distribuição e o comportamento dos casos de sífilis gestacional no estado de SP, destacando áreas críticas para intervenção e aprimoramento das estratégias de cuidado em Saúde Pública.

85 - TRATAMENTO DA SÍFILIS GESTACIONAL: A VISÃO DAS MÃES DE CRIANÇAS COM SÍFILIS CONGÊNITA

DONÁ, I. B.; ARROIO, N. F.; CHIRELLI, M. Q.

Faculdade de Medicina de Marília

isa.basso.dona@gmail.com

INTRODUÇÃO: O aumento nos casos de sífilis gestacional e congênita e a efetivação do tratamento desta patologia tem sido um desafio aos profissionais e usuários dos serviços de saúde. **OBJETIVO:** Analisar o percurso do tratamento de sífilis gestacional na visão das mães de crianças com sífilis congênita. **MÉTODO:** pesquisa qualitativa, por meio de entrevista individuais semi-estruturada com 12 mães de crianças com sífilis congênita em acompanhamento em ambulatório especializado. Processou-se os dados com análise de conteúdo, modalidade temática. **RESULTADOS:** O tratamento foi realizado durante a gestação e teve duração de 3 a 4 semanas, mas para algumas mães foi realizado somente depois do parto no hospital ou na APS. Teve gestante que repetiu o tratamento de 3 semanas e 6 doses devido a oscilações na sorologia, compreendendo a medicação como sendo o mecanismo de ação da vacina. Outras realizaram por 5 semanas com 10 doses por não diminuir a titulação, assim como houve repetição do tratamento devido ao parceiro não tratar junto com a gestante. Houve interrupção do tratamento por acreditar que a medicação estava fazendo mal, ou recomeçou após não ter concluído corretamente o anterior. A gestante e o parceiro fizeram o tratamento juntos e outros que fizeram juntos somente no segundo tratamento. Elas relatam que não ocorreram dificuldades durante o tratamento, porém, outras descrevem a presença de dor e enjoo. Somente algumas entrevistadas mencionaram o exame de sorologia da sífilis após o tratamento. Houve parceiros que fizeram a abstinência sexual durante o tratamento da sífilis, outros não fizeram ou fizeram apenas algumas vezes. Porém, relataram a utilização de preservativo durante a relação sexual ou que se protegeram somente algumas vezes. Outras não citaram sobre esta prática na entrevista. **CONCLUSÃO:** Há necessidade de formação dos profissionais sobre o protocolo de acompanhamento desta situação de saúde e como desenvolver a educação em saúde com as gestantes e seus parceiros.

86 - TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL E TRANSTORNO ALCOÓLICO FETAL E ATUAÇÃO DE ENFERMEIROS

DIAS, A.L.G.; GIMENEZ, F. V. M.; NALOM, D. M. F.

Faculdade de Medicina de Marília

gdiasanalaura@gmail.com

INTRODUÇÃO: O consumo de álcool durante a gestação é contraindicado, pois pode levar à intercorrências na gestação e efeitos teratogênicos no feto. Desse modo, pode ocorrer a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), caracterizada pela tríade: restrição de crescimento, dismorfias faciais e disfunção do sistema nervoso além do Transtorno Alcoólico Fetal (TEAF), o qual acarreta sintomas cognitivos. O estudo se justifica pelo alto consumo de álcool e pelo nítido impacto causado ao feto quando realizado na gestação, portanto, torna-se relevante saber o que a literatura traz sobre os tratamentos, sua aplicabilidade no Sistema Único de Saúde (SUS) e a contribuição do enfermeiro na promoção das necessidades de saúde destes quadros. **OBJETIVO:** identificar os tratamentos existentes no SUS para a SAF/TEAF e compreender a atuação do enfermeiro neste processo. **MÉTODO:** Propõe-se realizar uma Revisão Integrativa de Literatura (RIL), com abordagem descritiva e qualitativa. Após a formulação da pergunta de pesquisa, será realizada busca com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): síndrome de abstinência neonatal, transtornos do espectro alcoólico fetal, serviços públicos de saúde, sistema único de saúde, serviços de saúde da criança, serviços de saúde da mulher, enfermagem e qualidade da assistência à saúde. Serão incluídos artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos que envolvam o tratamento, a prevenção, políticas públicas que podem ser desenvolvidas e o preparo de profissionais frente a esses quadros. Serão excluídas revisões integrativas de literatura, trabalhos conceituando a SAF e TEAF ou que não abordem o uso do álcool na gestação. Eles serão analisados quanto autores, base de dados, tipo de estudo, objetivo, resultados e a resposta ao objetivo da pesquisa. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se a partir desse estudo identificar as possibilidades de melhorias na qualidade de vida dos indivíduos, além de elucidar a atuação do enfermeiro frente a tais necessidades de saúde, para assim buscar um atendimento individualizado e integral aos portadores de SAF/TEAF.

87 - UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE PERSONALIDADE MYERS – BRIGGS (MBTI) EM NÍVEL SUPERIOR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

OLIVEIRA, M. C. F.; TAKEDA, E.; MAZZETTO, F. M. C.

Faculdade de Medicina de Marília

mcfiamengui10@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Inventário de Personalidade Myers-Briggs (MBTI) é uma ferramenta criada por Katherine Briggs e Isabel Briggs Myers, baseada na teoria dos tipos psicológicos de Carl Jung. O MBTI classifica indivíduos em extroversão e introversão, além de quatro funções psíquicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição, resultando em 16 tipos de personalidade. Esta ferramenta fornece o autoconhecimento e compreensão das diferenças interpessoais. Em ambientes acadêmicos utilizando metodologias ativas, como Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), o MBTI pode melhorar a dinâmica de grupo, promovendo comunicação eficiente e cooperação. **OBJETIVOS:** Compreender se a utilização do MBTI auxilia os estudantes na adaptação das atividades de grupo em instituições de nível superior que utilizam metodologias ativas e, específicos, como a aplicabilidade do MBTI em currículos com metodologias ativas contribui para as inter-relações dos estudantes em atividades em grupo. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (RIL) que tem como questão norteadora: Como o MBTI pode auxiliar os estudantes de graduação de cursos na área da saúde na adaptação do trabalho em grupo utilizando a metodologia ativa? Foi realizado levantamento bibliográfico nas bases de dados BVS, Scielo, PubMed, Scopus, Web of Science e ERIC, utilizando o mnemônico PICO. Os critérios de inclusão foram artigos indexados em inglês, português e espanhol, sem limites de tempo de publicação. Os critérios de exclusão foram dissertações, teses, manuais, anais de congresso, livros, protocolos e editoriais. Tendo como descritores: Acadêmico, Discentes, Alunos, Graduandos, Myers-Briggs Type Indicator, currículo integrado, currículo orientado por competência, metodologia ativa e problematização. Foram encontrados 31 artigos, dos quais 8 foram excluídos por repetição e 12 por não atender aos critérios. Sendo selecionados 11 artigos para estudo. **RESULTADOS ESPERADOS:** Após análise destes 11 artigos espera-se compreender as abordagens e percepções da eficácia do MBTI no contexto acadêmico.

88 - VERIFICAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO EFEITO WARBURG NA EVOLUÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS

ZANDONÁ, V. P.; SANTOS, C. V.; MARTINS, L. P. A.; ALVES, M. G.

Faculdade de Medicina de Marília

veronicapedrosa889@gmail.com

INTRODUÇÃO: Doença de Chagas é uma antroponose endêmica em 21 países das Américas, cujo agente etiológico é o protozoário *Trypanosoma cruzi* (T. cruzi). Após a infecção, os parasitas iniciam a multiplicação intracelular e promovem uma reprogramação metabólica para obtenção do ATP por uma via metabólica mais rápida, a glicólise aeróbica, caracterizando o efeito Warburg, semelhante ao descrito na carcinogênese. Acredita-se que o efeito advinha da inflamação desenvolvida pelo T. cruzi nas células do hospedeiro que culmina em estresse oxidativo com acúmulo de radicais livres, que alteram os substratos disponíveis para síntese de ATP e desvia o metabolismo da glicose na fosforilação oxidativa para via da glicólise aeróbica mesmo na presença de oxigênio. Além da glicose, os aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) e a glutamina também são importantes fontes de carbono e nitrogênio para rápida multiplicação celular. **MÉTODOS e OBJETIVOS:** 60 camundongos Swiss foram infectados com 5×10^4 formas tripomastigotas sanguíneas da cepa QM2 de T. cruzi. Os animais foram divididos em 3 grupos de 20 animais para o estudo aos 30, 60 e 120 dias pós infecção. Cada grupo foi subdividido pela metade em lotes controle e infectado. Semanalmente foram analisados peso, glicemia e corpos cetônicos. Ao final de cada período experimental, todos os animais foram eutanasiados e foram coletados tecidos do átrio e duodeno. Após, foi coletado sangue dos animais por punção cardíaca para determinação do perfil lipídico, concentração de ácido tiobarbitúrico e da proteína C reativa. Quanto aos tecidos coletados, foram armazenados a -80°C e, posteriormente, liofilizados para os testes de peroxidação lipídica, carbonilação e nitração observando os danos à proteína, análise de Piruvato, Lactato, Lactato desidrogenase, BCAA e Glutamina através de Ressonância magnética Nuclear de Prótons com apoio da Universidade do Porto. **RESULTADOS E CONCLUSÃO:** as determinações bioquímicas realizadas evidenciam a ocorrência do estresse oxidativo e desvio para o metabolismo glicolítico aeróbico com a possível manifestação do efeito Warburg nos animais parasitados pelo T. cruzi.

Agradecimento*: O presente projeto foi desenvolvido com apoio da Agência de fomento FAPESP, nº dos processos (bolsa IC BRASIL) 2023/09531-0 / (bolsa BEPE Portugal) 2024/05878-9.

RESUMOS DO XIII SIMPÓSIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FAMEMA e VII SIMPÓSIO DA REPRINTE

89 - A ATUAÇÃO DE RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE MENTAL NO SERVIÇO DE ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA EM UM HOSPITAL GERAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

PRESTES, A.C.¹; SILVA, A. A.¹; LUZ, F. S.²; GRANDIN, G.M.¹; MACEDO, F.M.²; ANGELI, O.¹

1. Residência Multiprofissional em Saúde Mental - Faculdade de Medicina de Marília; 2. Terapeuta Ocupacional - Secretaria da Saúde de Marília

ana.paasilva@outlook.com

INTRODUÇÃO: Diante a legislação vigente, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde caracteriza-se por uma consonância entre Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, visando fortalecer o modelo educacional e assistencial pautado pelos princípios e diretrizes do SUS, a partir das necessidades municipais e os saberes privativos de cada profissão que compõem as equipes. A Residência Integrada em Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), estabelece a integração entre quatro profissões (enfermagem, psicologia, serviço social e terapia ocupacional), sendo que cada profissão contém um núcleo de competência próprio. As enfermarias psiquiátricas ou unidades de cuidados em saúde mental, são uma alternativa de atenção e um cuidado humanizado para pessoas que possuem sofrimento em saúde mental agravado e necessitam de suporte de internação hospitalar diante uma crise. Sendo assim, o presente relato de experiência foi realizado a partir da atuação de residentes multiprofissionais de saúde mental em uma enfermaria psiquiátrica em um hospital geral. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência multiprofissional em uma Unidade de Cuidados de Saúde Mental em um Hospital Geral, visando a reflexão do modelo de saúde implementado aos doze leitos pertencentes à unidade e pretende elucidar suas perspectivas suscitadas por meio dessa prática. **MÉTODOS:** As atividades terapêuticas realizadas pelos Residentes Multiprofissionais dispõe de dispositivos grupais (em suas diferentes modalidades), reuniões de equipe, elaboração de relatórios multiprofissionais, plantões noturnos e diurnos. **RESULTADOS:** Conforme a experiência multiprofissional, fora desenvolvido aprimoramento profissional através do manejo de crises psiquiátricas e conhecimento da rotina hospitalar. Observou-se o sucateamento e precarização do trabalho, desestruturação da rede de atenção psicossocial (RAPS) e centralização médica no cuidado aos usuários em internação. **CONCLUSÕES:** A experiência de atuação dos residentes na enfermaria de cuidado em saúde mental, trouxe percepções acerca das potencialidades (cuidado humanizado, engajamento de alguns profissionais para melhoria do serviço, vínculo terapêutico, estabilização do quadro psiquiátrico agudo, dentre outros) e fragilidades (falta de entendimento das competências necessárias para o desenvolvimento do serviço, grande rotatividade e defasagem da equipe de enfermagem, lacunas na comunicação entre a equipe e resquícios do pensamento manicomial) desse serviço da RAPS. Sendo assim, a Unidade de Cuidados em Saúde Mental é um cenário essencial para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

90 - A CURCUMINA COMO ADJUVANTE NO TRATAMENTO OU PREVENÇÃO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS AO ENVELHECIMENTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

NUNES, Y. C.¹; LAURINDO, L. F.¹; MARIA, S.^{2,3,4}; TANAKA, M.⁵; MARIN, M. J. S.¹

1.Faculdade de Medicina de Marília; 2.Departamento de Bioquímica e Farmacologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Marília (UNIMAR); 3.Programa de Pós-Graduação em Interações Estruturais e Funcionais em Reabilitação, Universidade de Marília (UNIMAR); 4.Departamento de Bioquímica e Nutrição, Faculdade de Tecnologia em Alimentos Marília (FATEC); 5.Laboratório de Pesquisa em Neurociência Danube, Grupo de Pesquisa em Neurociência HUN-REN-SZTE, Rede de Pesquisa Húngara, Universidade de Szeged (HUN-REN-SZTE)

yandracervelin@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Distúrbios associados ao envelhecimento representam grandes desafios pela complexa interação de fatores fisiológicos e metabólicos, como inflamação, estresse oxidativo e disfunção mitocondrial. A curcumina, com suas potentes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, surge como possível alternativa para atenuar esses processos. No entanto, ainda há lacunas sobre os mecanismos exatos pelos quais ela atua, exigindo mais investigações. **OBJETIVOS:** Esta revisão sistemática tem como objetivo avaliar as evidências atuais sobre o potencial terapêutico da curcumina no tratamento de distúrbios relacionados ao envelhecimento, com foco em sua influência na função cognitiva, processos neurodegenerativos e na saúde muscular em idosos. **MÉTODOS:** Pesquisou-se sistematicamente apenas ensaios clínicos publicados em inglês nas bases MEDLINE PubMed, COCHRANE e EMBASE, as palavras chaves utilizadas foram: Curcuma longa ou açafrão ou curcumina ou curcuminoides e estresse oxidativo ou inflamação ou disfunção mitocondrial ou sarcopenia ou cognição ou doenças neurodegenerativas ou demência ou sarcopenia ou fragilidade ou memória, ou doença de Parkinson ou Alzheimer. Estudos de intervenção em humanos foram incluídos, excluindo editoriais, revisões e relatos de caso. A extração de dados seguiu o formato PICO (Population, Intervention, Comparison, and Outcomes) e a seleção foi guiada pelas diretrizes PRISMA (The Preferred Reporting Items for a Systematic Review and Meta Analysis). O risco de viés foi avaliado conforme a Cochrane. O estudo foi registrado no PROSPERO ID CR42024559316. **RESULTADOS:** Foram identificados 2256 documentos pelos termos de busca, dos quais 15 ensaios clínicos atenderam aos critérios de inclusão/exclusão para a síntese. **CONCLUSÃO:** A curcumina pode ser uma opção natural eficaz para melhorar a qualidade de vida dos idosos, atuando de forma preventiva e terapêutica em distúrbios do envelhecimento. Contudo, mais pesquisas são necessárias para confirmar esses achados e otimizar seu uso, especialmente em abordagens de medicina personalizada para idosos.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

91 - A EXPERIÊNCIA DO HOMEM CONTEMPORÂNEO COM A CONSTRUÇÃO DA PATERNIDADE

BERALDO, I. S.¹; PIO, D. A. M.²; SIQUEIRA, F. P. C.³

1.Mestranda do Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico Saúde e Envelhecimento da Faculdade de Medicina de Marília e bolsista CAPES

2.Docente da Faculdade de Medicina de Marília e orientadora da pesquisa ³

Docente da Faculdade de Medicina de Marília e coorientadora da pesquisa

isabela_beraldo@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Em meio às várias mudanças pelas quais a sociedade ocidental contemporânea transita, sinaliza-se aquelas que se aludem à estrutura familiar uma vez que, as atribuições que cada indivíduo desempenha na dinâmica familiar também se encontram em constante modificação. Dessa forma, mudanças importantes acerca dos papéis femininos e masculinos, resultantes dessa nova era social, tem incentivado os homens a estarem mais perto de sua prole e a identificarem o envolvimento paterno como agente de proteção para o desenvolvimento infantil. A figura do homem pai vem tomando, aos poucos, espaços importantes na esfera familiar, principalmente, no que se refere à relação com os filhos, emergindo assim um novo modelo de pai, o denominado “novo pai”. **OBJETIVO:** Compreender a experiência do homem contemporâneo frente à paternidade. **MÉTODO:** A presente pesquisa utilizará de uma abordagem qualitativa, direcionada pelo referencial metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), um método que tem por finalidade conhecer o fenômeno no contexto em que ocorre, derivando-se a teoria a partir dos dados. Farão parte desse estudo homens pais, maiores de 18 anos, residentes em todo Brasil, selecionados pela técnica bola de neve, sendo a amostra constituída por saturação teórica. Serão utilizados como instrumentos um questionário sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada guiada pela questão disparadora “Como você descreveria a experiência de ser pai?” e um roteiro que contempla os objetivos. A coleta dos dados se dará de forma on-line. As entrevistassserão videogravadas, transcritas na íntegra seguindo o referencial da TDF. A análise ocorrerá de forma concomitante à coleta, finalizadas com a construção do modelo teórico com os próprios dados e com os participantes. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se com os resultados desse trabalho colocar em destaque as experiências e vivências dos homens pais nos permitindo repensar e refletir sobre novas práticas de cuidado infantil, assim como o suporte da rede de apoio, ofertado ou não, aos pais na contemporaneidade.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

92 - A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO NA (RE)INTEGRAÇÃO DA PESSOA IDOSA NO COTIDIANO

TIERNO, P.C.L.; LINS, T.V.H.; FERREIRA-COSTA, J.; OGASSAVARA, D.; SILVA-FERREIRA, T.; DE CARVALHO, A.A.; ESCOBAR, N.B.F.; DE PAULA, A.P.S.S.; MONTIEL, J. M.

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

pati.tierno@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Mudanças que ocorrem no envelhecimento podem alterar a dinâmica da vida da pessoa idosa, sendo que os declínios físicos e cognitivos observados necessitam de acompanhamentos de profissionais específicos para atender suas demandas. No que tange as áreas da saúde, a fisioterapia e a psicologia contribuem para a promoção e reabilitação do bem-estar do paciente. **OBJETIVOS:** Discutir acerca das potencialidades da função de acompanhante terapêutico para pessoas idosas. **MÉTODOS:** Este estudo é caracterizado como uma revisão de literatura de caráter qualitativo. Nisto, foram utilizadas as bases de dados SciELO, Google Acadêmico e PePsic, no mês de setembro de 2024 para captar materiais bibliográficos utilizando os descritores “acompanhante terapêutico”, “fisioterapia” e “envelhecimento”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Convergentemente ao aumento da expectativa de vida, reconhece-se que há uma problemática nos tratamentos oferecidos aos idosos: a desistência dos mesmos. A desistência pode ocorrer por diferentes fatores, desde falta de motivação a dificuldade na mobilidade. Frente as demandas da fisioterapia gerontológica, aponta-se que a prevenção de danos e a promoção da qualidade de vida pode ser mediada pelo aprimoramento da capacidade funcional. É possível que o idoso desista do processo ou precise de apoio psicológico para enfrentar o tratamento no caso de uma reabilitação, assim, o acompanhante terapêutico entra em ação, sendo prestado por um psicólogo embasado por competências interdisciplinares. Este profissional se direciona às demandas de diferentes campos do saber e tece uma compreensão sobre a condição do paciente colaborativamente, sugerindo novas maneiras de agir, de enfrentar os desafios, de cuidar e pensar. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Diante dos fenômenos convergentes ao envelhecimento, a participação de acompanhante terapêutico em colaboração com fisioterapeutas é de grande valia, principalmente no que tange ao suporte emocional e funcional, promovendo condições para a maior adesão ao processo de reabilitação e a manutenção da qualidade de vida.

93 - A PESSOA IDOSA E A CRIAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS COM ANIMAIS DOMÉSTICOS

TEIXEIRA, I. M.¹; ALVES, M. P. F.²; MONTIEL, J. M.³; LONGO, P. L.⁴

1. Universidade São Judas Tadeu
2. University of London GoldSmith
3. Universidade São Judas Tadeu
4. Universidade São Judas Tadeu

bella.monare@gmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural marcado pela diminuição da capacidade funcional e mudanças psicossociais que pode estar associado a satisfação, crescimento pessoal e bem-estar, mas também a perdas e solidão. Nesse cenário é fundamental compreender a relação humanoanimal já que muitas pessoas idosas possuem animais domésticos. **OBJETIVO:** Descrever a percepção da pessoa idosa sobre os vínculos afetivos criados com animais domésticos. **METODOLOGIA:** Estudo aprovado pelo CEP/USJT (n. 6.912.299). Estudo transversal observacional quantitativo com participantes de ambos os sexos e que possuem animal doméstico. Os participantes responderam a um questionário socio demográfico e questões sobre sentimento em relação a seus animais. **RESULTADOS PARCIAIS:** Dentre os 34 participantes, 22 são do sexo feminino e 24 possuem entre 60 e 70 anos, sendo que 27 possuem cães e 7 são tutores de gatos. Do total, 23 participantes afirmaram possuir animais desde criança. Em relação aos sentimentos foi possível notar que mais de 50% dos participantes relataram sentimento positivos, sendo eles “alegria” (91,18%), “companheirismo” (88,24%) e “cuidado/proteção” (85,29%), comparado aos sentimentos negativos que foram menos de 50%, como “preocupação” (20,59%) e “obrigação” (2,94%). Nenhum participante afirmou sentir “tristeza” em relação aos seus animais e 6 afirmaram que seu animal é “tudo em sua vida” sendo que destes 6, apenas 1 mora sozinho, evidenciando a intensidade dessa relação. Importante ressaltar que 9 tutores de cães relataram não levar seu animal para passear e 1 participante afirmou que não possui condições de levar seu animal ao veterinário. **CONCLUSÕES:** É fundamental entender a relação entre pessoas idosas e seus animais domésticos já que estas relações são intensas e envolvem tanto sentimentos positivos quanto negativos. Até o presente momento os resultados mostraram que os animais podem diminuir a solidão dos participantes, uma vez que as pessoas que cuidam de animal doméstico, para não se sentirem só, tornando-se uma companhia.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

94 - A PRODUÇÃO INTELECTUAL FEMINISTA REVISITADA POR MULHERES: DIÁLOGOS LITERÁRIOS INTERGERACIONAIS NO CÍRCULO DE CULTURA

PROENÇA, V. A. S.; MARQUES, B. G.

Universidade São Judas Tadeu

valhproenca@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: As estruturas de poder que historicamente moldaram a leitura e a escrita favorecem predominantemente o gênero masculino, resultando na exclusão das mulheres dos processos de alfabetização e letramento. A produção literária feminina, no entanto, funciona como um potente instrumento de resistência e reflexão. A literatura feminista emerge como uma prática essencial para que as mulheres reinterpretem suas experiências de envelhecimento, permitindo-lhes reescrever narrativas e questionar estereótipos. Por meio dessa abordagem, as mulheres não apenas reconhecem sua subjetividade, mas também desenvolvem uma compreensão crítica sobre o envelhecer, criando um espaço de empatia e solidariedade. Assim, a literatura feminista se revela fundamental na promoção de diálogos que enriquecem a experiência feminina em todas as suas fases, especialmente na velhice, ao fomentar um senso de comunidade e apoio mútuo. **OBJETIVOS:** Analisar como o Círculo de Cultura, enquanto instrumento metodológico, e a literatura feminista, como elemento de ação dialógica, contribuem para os processos de leitura, reflexão e diálogos intergeracionais sobre as vivências de autocuidado de mulheres no envelhecer. **MÉTODOS:** A pesquisa utilizará uma abordagem qualitativa exploratória com ênfase na narrativa, focando na historicidade oral e na subjetividade das participantes. Essa metodologia visa capturar as experiências das mulheres em envelhecimento, reconhecendo a importância da literatura feminista em suas reflexões. Através de encontros nos Círculos de Cultura, serão promovidas discussões que estimularão a troca de saberes e a reflexão crítica sobre o envelhecimento. Os dados coletados serão analisados para identificar padrões e transformações nas percepções das participantes. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que a pesquisa demonstre que a produção literária feminina é crucial para a ampliação da percepção sobre o envelhecer feminino, revelando sua importância para a reflexão crítica sobre experiências de envelhecimento e a intersecção dessas vivências a um contexto social mais amplo.

Agradecimento*: Bolsa institucional da Universidade São Judas Tadeu.

95 - A RELAÇÃO ENTRE O USO EXCESSIVO DE TELAS E O DESENVOLVIMENTO DE ANSIEDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA

MÔNACO, V. R.; SIQUEIRA, F. P. C.

Faculdade de Medicina de Marília

monacovitoria11@gmail.com

INTRODUÇÃO: Diante da convivência com crianças e adolescentes, tanto em ambiente familiar quanto social, observa-se que estes têm utilizado telas de forma excessiva, como celulares, *tablets*, videogames, televisão e computadores, o que tem causado mudanças comportamentais. Esse uso excessivo fragiliza a interação entre eles e com os familiares, além de gerar reações de ansiedade. **OBJETIVO:** Identificar na literatura a relação entre o uso excessivo de telas e o desenvolvimento de ansiedade em crianças e adolescentes. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa conduzido pela pergunta norteadora “Quais as influências do uso de telas na ansiedade em crianças e adolescentes?”. Para tanto, utilizou-se das bases de dados nacionais e internacionais Portal da BVS, selecionados do mesmo 12 artigos, utilizando-se descritores controlados (DeCS) e palavras-chave, LILACS, BDENF - Enfermagem, IBECs, Index Psicologia Period e Scielo, sendo três artigos, nos últimos 10 anos. Os descritores foram criança, pré-escolar, adolescente, ansiedade e tempo de tela. Foram excluídos estudos sobre dissertações, teses e aqueles que associam ansiedade e depressão ao período da Sars-Cov 2. **RESULTADOS:** Apontam aumento na prevalência do tempo de utilização da internet pelos celulares e a relação com sintomas de dependência, bem como stress, ansiedade e depressão. Crianças e adolescentes usam telas e internet como distração, o que prejudica o brincar saudável, afeta as relações e compromete o desenvolvimento infantil. **CONCLUSÃO:** Pesquisas indicam um aumento no uso da internet por celulares, associado a sintomas de dependência, estresse, ansiedade e depressão. Crianças e adolescentes têm utilizado telas como distração, o que prejudica o brincar saudável e compromete o desenvolvimento e as relações sociais. O uso excessivo, sem supervisão, também os expõe a situações de violência. Apesar dos malefícios, algumas pesquisas mostram benefícios das tecnologias quando usadas de forma controlada, especialmente em crianças com paralisia cerebral e autismo. Recomenda-se evitar celulares precoces, estabelecer limites de tempo e alertar sobre os danos ao desenvolvimento.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

96 - ACOLHIMENTO NA PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

FERRACINI, E. R.; FRANCISCHETTI, I.

Faculdade de Medicina de Marília

ferracinico@gmail.com

INTRODUÇÃO: O processo de acolhimento na Estratégia de Saúde da Família (ESF) busca a qualificação do cuidado por meio da organização do processo de trabalho e melhoria do acesso dos usuários. O acolhimento deve ser entendido como uma tecnologia, postura e atitude que facilitam a coordenação do cuidado e acesso aos serviços de saúde, visando à substituição de ações centradas no modelo biomédico, por um trabalho guiado pelas necessidades dos usuários, facilitando a integralidade do cuidado nas ações de saúde. Sendo assim é importante que o enfermeiro da ESF compreenda o processo de acolhimento, visto que este assume papel de liderança e organização da equipe no processo de trabalho, o que embasa a pergunta de pesquisa “Qual a percepção do enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família quanto ao acolhimento?”

OBJETIVO: Analisar a percepção dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família do município de Adamantina/SP quanto ao acolhimento.

MÉTODO: Pesquisa de campo de abordagem qualitativa com intervenção e estudo antes e depois. O cenário será composto pelos 11 enfermeiros das Estratégias de Saúde da Família do município de Adamantina/SP, selecionados não intencionalmente. Os dados serão coletados por meio de grupo focal (GF), onde será gravado em áudio o debate guiado por perguntas disparadoras sobre o objetivo do estudo. O conteúdo das gravações será transcrito e analisado seguindo a técnica de análise do conteúdo de Bardin. Será promovida intervenção educativa a todos os participantes voltada a suprir as fragilidades diagnosticadas. A intervenção será avaliada por meio da aplicação de questionário antes e depois com perguntas abertas cujas respostas também terão seus conteúdos analisados na modalidade temática, respeitando as diretrizes e normas que regulamentam pesquisas com seres humanos.

RESULTADOS ESPERADOS: Sendo o enfermeiro o principal responsável pela organização do acesso, busca-se compreender a percepção dos enfermeiros das equipes de ESF sobre o acolhimento e promover atividade educativa capaz de fomentar melhorias no processo de trabalho e qualidade da atenção.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

97 - ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL PARA A LÍNGUA PORTUGUESA DE UM QUESTIONÁRIO SOBRE ANTIBIOTICOTERAPIA E RESISTÊNCIA BACTERIANA

SOUZA, L.L.; CASAGRANDE, V.; PINHEIRO, O.L.

Faculdade de Medicina de Marília

leticia_limasouza21@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A resistência aos antibióticos representa um problema de saúde pública, uma vez que reduz a eficácia dos tratamentos disponíveis, limita as opções terapêuticas e favorece a disseminação de infecções causadas por microrganismos resistentes. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015, em um estudo envolvendo 12 países, verificou o conhecimento e as práticas da população a respeito dos antibióticos. O estudo utilizou um questionário com três áreas de abrangência: uso de antibióticos, conhecimento sobre antibióticos e conhecimento sobre resistência aos antibióticos. Entretanto, não foram incluídos países lusófonos e não foi adaptado para a língua portuguesa. Dessa forma, torna-se necessária a validação transcultural para o português, a fim de compreender a realidade dos países de língua portuguesa. **OBJETIVO:** Realizar a adaptação transcultural do questionário “*Antibiotic resistance: multi-country public awareness survey*” para a língua portuguesa. **MÉTODO:** A adaptação transcultural envolverá a tradução inicial do questionário, síntese da tradução, tradução de volta a língua original (*back-translation*), a revisão por especialistas e a aplicação em um grupo de pacientes. A consistência interna será verificada por meio do teste de Alfa de Cronbach. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se criar um questionário conciso e capaz de refletir o real conhecimento da população sobre os antibióticos, o seu uso e a resistência antimicrobiana, auxiliando na realização de outros estudos em países de língua portuguesa.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

98 - ANÁLISE DA CITOGENOTOXICIDADE DE FORMULAÇÃO À BASE DE N TOSILINDOL EM CÉLULAS HUMANAS

POMPEI JÚNIOR, O. C.¹; CAVALCANTE, S. C. H.²; MAISTRO, E. L.³

1.Mestrando do PPG em Saúde e Envelhecimento - Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). ; 2.Professor do PPG em Ciências Farmacêuticas-UFS. 3. Orientador no PPG em Saúde e Saúde e Envelhecimento da Faculdade de Medicina de Marília (Famema)..

enfermeiro.osvaldo@gmail.com

INTRODUÇÃO: O *Aedes aegypti* é um vetor de arboviroses importantes, representando sérios problemas de saúde pública, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. O controle das populações desse artrópode é crucial, porém a resistência aos larvicidas comerciais tem se tornado uma preocupação crescente, tornando necessário o desenvolvimento de novas alternativas. Nesse contexto, a formulação larvicida com N tosilindol (1-(4-metilfenil)sulfonilindol) tem demonstrado excelente potencial ao reduzir a Concentração Letal 50 (CL50) necessária para a mortalidade das larvas, superando o composto não formulado e outros larvicidas. O composto atua efetivamente nas larvas de *Aedes aegypti* ao inibir a síntese de quitina, comprometendo o exoesqueleto e interferindo no desenvolvimento e levando à mortalidade por meio de múltiplos mecanismos de ação. No entanto, a segurança dessa formulação quando adicionada à água ainda precisa ser avaliada, especialmente em relação à citotoxicidade e genotoxicidade em águas destinadas ao consumo humano.**OBJETIVOS:** Determinar o efeito citotóxico da formulação, investigar seu potencial mutagênico e avaliar a genotoxicidade em células humanas mononucleares e em células de carcinoma hepatocelular HepG2/C3A, contribuindo para a área ecotoxicologia, analisando indicadores de exposição em organismos não-alvo.**MÉTODOS:** incluem ensaios in vitro com a exposição de culturas celulares a diferentes concentrações da formulação, que compreende N-tosilindol como ingrediente ativo, fase aquosa, surfactante PPG-5-CETETH-20 e óleo de soja. A formulação promove a formação de micelas que solubilizam o N-tosilindol na água, aumentando sua biodisponibilidade e eficácia em atingir as larvas. Serão realizados ensaios de viabilidade celular (MTT), avaliação de danos ao DNA (ensaio Cometa) e análise de micronúcleos para detectar mutações, seguindo as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD).**RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se identificar uma concentração segura da formulação para os tipos celulares selecionados. Os dados obtidos poderão ajudar a compreender os efeitos citogenotóxicos de compostos tosilindólicos, contribuindo para a avaliação de riscos à saúde humana e ao meio ambiente, além de promover avanços na área da genética toxicológica.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

99 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CUNHA, G. M.; CHIRELLI, M.Q.; GIMENEZ, F.V.M.

Faculdade de Medicina de Marília

gabimartinezcunha@gmail.com

INTRODUÇÃO: A alimentação humana é considerada essencial na qualidade de vida, visto ser um fator importante para promoção e proteção da saúde. Diversos fatores estão associados às escolhas dos alimentos, como os biológicos, socioeconômicos e psicológicos, além do ambiente cultural e psicossocial. Entende-se como comportamento alimentar disfuncional, ou comer transtornado, quando a alimentação é determinada por algum destes fatores. O ambiente de trabalho tem grande influência na saúde das pessoas, em específico, Atenção Primária à Saúde (APS), muitas vezes é apontada como um local de trabalho insalubre e estressante. Desta forma, acredita-se que o processo de trabalho pode estar determinando o comportamento alimentar dos profissionais da saúde. **OBJETIVOS:** Analisar o comportamento alimentar dos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde, além de caracterizar e relacionar o comportamento alimentar e o estado nutricional destes trabalhadores e analisar os determinantes que influenciam no comportamento alimentar. **MÉTODO:** O presente estudo será desenvolvido a partir de pesquisa descritiva exploratória, com abordagem quanti-qualitativa. Será realizado em quatro Unidades da Saúde da Família (USF) de um município localizado no Centro-Oeste Paulista, com os profissionais que compõe a equipe Saúde da Família (ESF). As equipes serão selecionadas por sorteio simples, considerando uma em cada região de saúde do município. O estudo será realizado em duas etapas, sendo a primeira por meio de um formulário impresso composto por questões de identificação pessoal, dados antropométricos e a Escala de Atitudes Alimentares Transtornadas (EAAT). Enquanto na segunda etapa, será realizada por meio de grupo focal. Os dados da etapa quantitativa serão analisados através do teste de correlação de Pearson, e na etapa qualitativa, será feita Análise Temática. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se realizar a caracterização do comportamento alimentar e estado nutricional, além de compreender os determinantes das situações que interferem no comportamento alimentar de profissionais de saúde na APS.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

100 - ANÁLISE DO CONHECIMENTO E AUTOCUIDADO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 MAIORES DE 60 ANOS

COSTA, M.H.¹; CABRERA, M.A.S.²

1.Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Londrina (UEL)

2.Docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Londrina (UEL)

maria.helena.costa@uel.br

INTRODUÇÃO: Com a rápida transição demográfica do país podemos ver grandes taxas de urbanização e com isso o aumento da adoção de hábitos não saudáveis, tornando inevitável o aparecimento do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2).O manejo da doença é feito de diversas formas e a partir do momento do diagnóstico tem-se a necessidade de mudanças contínuas nos hábitos de vida, e por isso é de suma importância entender e conhecer a comorbidade para realizar as estratégias de autocuidado de maneira eficiente. **OBJETIVO:** O objetivo do estudo foi analisar a produção do conhecimento e autocuidado de pacientes com ≥ 60 anos e que conviviam com a DM2, através do questionário “Spoken Knowledge in Low Literacy Patients with Diabetes” (SKILLD) e o Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes (QAD): **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo transversal, observacional. Houve aplicação da escala de Lawton como critério de inclusão (> 7 pontos caracterizado como exclusão), aplicação dos questionários SKILLD e QAD, além do questionário socioeconômico e clínico. O estudo foi aprovado pelo CEP, sob o número de CAAE: 81193024.6.0000.5231. **RESULTADOS:** Tratam-se dos resultados do estudo piloto aplicado na APS do município de Arapongas-PR. Foram coletados dados de 13 pacientes. Predomínio entre o sexo feminino, casada(o), com uma média de escolaridade de 5,08 (3,04) anos de estudo, com ≥ 10 anos da doença. Quanto ao questionário SKILLD 27,50 (18,15) demonstrando baixo letramento, e quanto às atividades do QAD as menos aderentes foram o de examinar os pés 0 (3,00) e a de atividade física minutos totais 2 (1,69). **CONCLUSÃO:** Ainda que previamente o estudo demonstrou baixo letramento em saúde a respeito do Diabetes e também baixa adesão de autocuidado quanto a prática de atividade física e cuidado com os pés. Ressaltando a necessidade da continuidade do estudo para que tenhamos análises mais robustas.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

101 - ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOS: UMA ABORDAGEM ENTRE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

COCA, M. L. L.; TONHOM, S. F. R.; PERES, C. R. F. B.

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

mthscoca@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Atenção Primária a Saúde (APS) é a porta de do Sistema Único de Saúde (SUS). Os serviços devem ser apoiados e complementados por outros de diferentes densidades tecnológicas para a realização de ações especializadas, em busca da integralidade do cuidado. Compreende-se integralidade como o desenvolvimento de ações de prevenção a doenças e promoção à saúde, a partir de serviços funcionando de forma articulada e contínua, visando aspectos individuais e coletivos, atendendo as necessidades de saúde em todos os níveis de atenção do sistema. Questiona-se como se dá a articulação da atenção primária a saúde com o serviço de fisioterapia, visando a integralidade do cuidado. **OBJETIVO:** Analisar a percepção dos profissionais da APS e fisioterapeutas acerca da integralidade do cuidado no contexto do SUS. **MÉTODO:** Pesquisa qualitativa, com referencial metodológico de análise do discurso, que foi realizada em um município do interior paulista. Os participantes dessa pesquisa foram profissionais de uma Rede de Atenção à Saúde (RAS), que contempla seis enfermeiros gestores e médicos das Unidades de Saúde e fisioterapeutas. No local de trabalho de cada profissional as entrevistas foram previamente agendadas, as mesmas foram gravadas e depois transcritas. Um roteiro semiestruturado com questões foi elaborado com perguntas contemplam abordagens sobre a rotina de trabalho, conhecimentos sobre APS e o serviço de fisioterapia, articulação em rede, a inserção do fisioterapeuta na APS, encaminhamentos médicos ao serviço de fisioterapia, conhecimentos pertinentes sobre rede de cuidados, educação, promoção e prevenção a saúde. **RESULTADOS PRELIMINARES:** Identificou-se fragilidade na articulação dos serviços e desconhecimento do funcionamento em rede por alguns profissionais, bem como a não utilização de ferramentas como a contrarreferência nos diferentes níveis de atenção à saúde.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

102 - AS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DOS TESTES GENÉTICOS PREDITIVOS NA PERSPECTIVA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

TAVANTE, R. F.; SEBASTIANI, R. T.

REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

renata.tavante@uol.com.br

INTRODUÇÃO: O avanço dos testes genéticos preditivos, que revelam predisposições a doenças, levanta questões éticas e jurídicas importantes. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) regula o tratamento de dados sensíveis, incluindo os genéticos. Este estudo examina as implicações jurídicas da utilização desses testes, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, discutindo a proteção de privacidade, o consentimento informado e a prevenção de discriminação. **OBJETIVOS:** O estudo tem como objetivos discutir as implicações jurídicas dos testes genéticos preditivos sob a Lei Geral de Proteção de Dados; analisar a caracterização de dados genéticos como dados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados; identificar desafios e responsabilidades legais de instituições de saúde e laboratórios e propor estratégias de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados para garantir a proteção dos titulares de dados. **MÉTODOS:** A metodologia utilizada será uma revisão bibliográfica qualitativa e exploratória. A pesquisa será baseada em legislações, jurisprudências, artigos acadêmicos e publicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A análise focará nos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e nas obrigações legais no tratamento de dados sensíveis, com exemplos práticos da aplicação da lei na saúde, especialmente em testes genéticos preditivos. **RESULTADOS ESPERADOS:** O estudo espera identificar as principais implicações jurídicas dos testes genéticos preditivos, apontando lacunas e desafios na legislação. A pesquisa visa oferecer recomendações para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados por instituições que realizam esses testes, assegurando a proteção dos dados genéticos e os direitos dos titulares. Espera-se também identificar boas práticas para minimizar riscos legais e éticos relacionados ao tratamento inadequado de informações genéticas.

Agradecimento*: Agradecimentos especiais à Rede Gonzaga de Ensino Superior (REGES), bem como ao programa de mestrado profissional Formação Interdisciplinar em Saúde (MP-FIS) da Universidade de São Paulo (USP).

103- ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO AMBIENTE HOSPITALAR: PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DE UNIDADE PEDIÁTRICA

MANCINI, A.P.N.¹; MUGNAI, C.V.²

1.Faculdade de Medicina de Marília

2. Universidade Estadual Paulista Campus de Marília

enfapnm@gmail.com

INTRODUÇÃO: o transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. O ambiente hospitalar bem como o atendimento prestado a essas crianças são um grande desafio tanto para os familiares quanto para as equipes pois as manifestações comportamentais associadas à dificuldade de manejo dos profissionais interferem na assistência que por muitas vezes não é cumprida na sua totalidade. **OBJETIVOS:** Analisar a percepção da equipe de saúde sobre o atendimento hospitalar ao paciente pediátrico com TEA. **MÉTODO:** estudo qualitativo a ser realizado em unidade de Pronto-Atendimento e enfermaria pediátrica de um Hospital Filantrópico do interior paulista. Os critérios de seleção dos participantes serão: funcionários da equipe técnica (nível médio e superior) lotados nestes setores que atuem há pelo menos 6 meses na instituição. Pretende-se alcançar um número de participantes representativo, de acordo com cálculo amostral, em torno de 60 profissionais. O estudo será desenvolvido em duas etapas: a primeira pela aplicação de um questionário sociodemográfico e de uma adaptação da escala de atitudes sociais em relação ao autismo (ATT-AUT); e a segunda pela aplicação de questionário com perguntas abertas sobre experiências prévias de atendimento a crianças com TEA, desafios e sugestões de melhorias no cenário hospitalar, apenas aos enfermeiros. Todos os instrumentos aplicados em formulário *online*. Os dados quantitativos passarão por análises estatísticas descritivas e por testes não-paramétricos para verificar a relação das atitudes acerca do autismo e variáveis sociodemográficas. Os dados qualitativos passarão por análise de conteúdo, modalidade temática. O projeto já foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa com seres humanos. **RESULTADOS ESPERADOS:** subsidiar estratégias para implementação de um atendimento integral e humanizado de crianças com TEA no ambiente hospitalar.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

104 - ATITUDES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO EM RELAÇÃO À INCLUSÃO

BUENO, J. B.; VIEIRA, C. M.

Universidade Estadual Paulista Campus de Marília

jbbunesp@gmail.com

INTRODUÇÃO: O movimento pela inclusão se dá por meio de ações políticas, culturais, sociais e pedagógicas, apoiadas pelas legislações em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, participando do processo de aprendizagem, sem discriminação e segregação. As relações interpessoais na escola são essenciais o processo inclusivo. **OBJETIVOS:** Mensurar as Atitudes Sociais de estudantes do Ensino Médio de escolas estaduais de uma cidade de grande porte no interior paulista em relação à inclusão e suas variáveis sociodemográficas. **MÉTODO:** As vinte e duas escolas de ensino médio serão convidadas; pretende-se constituir uma amostra significativa de alunos do primeiro ao terceiro ano. Será aplicado um Questionário sociodemográfico e a Escala de Atitudes Sociais em relação à Inclusão (ELASI), instrumento brasileiro, validado para este fim, elaborado pelo Grupo de Pesquisa 'Diferença, Desvio e Estigma (DIDE), cadastrado no Diretório do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e vinculado à Universidade Estadual Paulista. Os dados passarão por análises estatísticas descritivas, atribuição de escores à escala e cálculos estatísticos não paramétricos para avaliar as relações das atitudes sociais com outras variáveis, como gênero, idade, série, renda, percepção de qualidade de vida e desempenho escolar, entre outras, desse modo, será possível identificar quais sujeitos possuem mais Atitudes Sociais Inclusivas. **RESULTADOS ESPERADOS:** Mensurar as Atitudes Sociais dos estudantes do município em relação à inclusão e suas variáveis sociodemográficas, de modo a contribuir para futuras ações no contexto escolar que tornem as atitudes mais positivas e favoreçam o processo de inclusão.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

105 - ATIVIDADE FÍSICA, QUALIDADE DO SONO E VARIABILIDADE GLICÊMICA EM CRIANÇAS COM DIABETES TIPO 1: UM ESTUDO TRANSVERSAL

DUMA M.A.; PEREIRA M.S.; ALVES R.A.; CASTRO L.L.; ALVES L.V.; HABER, J.F.S.; CHAGAS, E.F.B.

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

muriloduma@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A atividade física é essencial para o controle glicêmico e a prevenção de complicações em crianças com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Apesar dessa importância, apenas 28% dessas crianças cumprem as recomendações de exercícios físicos, devido, em parte, ao receio de episódios de hipoglicemia e à falta de conhecimento sobre estratégias adequadas de insulinização durante a prática de atividades. Além disso, a qualidade do sono exerce influência significativa na variabilidade glicêmica em portadores de DM1, sendo que noites mal dormidas podem contribuir para maior variabilidade glicêmica e dificultar o controle metabólico. **OBJETIVOS:** Diante disto, o estudo tem como objetivo analisar a relação entre o nível de atividade física (NAF), qualidade do sono e variabilidade glicêmica (VG) em crianças e jovens com diabetes mellitus tipo 1, como também analisar a interferência das estratégias da administração de insulina, alimentação e sono sobre esta relação. **MÉTODOS:** A amostra será constituída por crianças entre 5 e 12 anos com diabetes mellitus tipo 1 que utilizam sensor de monitoramento contínuo (CGM) e sistema de infusão contínua de insulina (SICI). Os dados de (NAF) serão coletados por acelerômetro e monitor de frequência cardíaca durante 6 dias inteiros e no sétimo dia será realizado a retirada dos equipamentos e extração dos dados. Além disso, serão coletados dados clínicos, antropométricos e dietéticos. A composição corporal será avaliada por absorciometria de raios-X de dupla energia (DEXA), método amplamente reconhecido como padrão ouro para esse fim, enquanto a força de preensão manual será mensurada por dinamômetro. A análise estatística incluirá correlações entre variáveis e testes de associação. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que crianças com maior NAF e melhor qualidade de sono apresentem menor VG, indicando melhor controle glicêmico. Também são esperados dados que possam aprimorar as estratégias de insulinização e alimentares durante o exercício físico, além de correlações entre qualidade de sono e controle glicêmico.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

106 - ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO INTERIOR DE SÃO PAULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

FALCÃO, M. E. L.¹; LEITE, A. L. B.¹; MATSUMOTO C. M.¹; GOMES E. D.¹; SOUZA, G. S.¹; SOUZA, G. R.¹; SCAPIM, E. P.²

1. Residente do Programa de Residência Multiprofissional da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)
2. Coordenadora do Projeto e Docente da Faculdade de Medicina de Marília

marcelafalcao4@gmail.com

INTRODUÇÃO: A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência crítica que requer resposta imediata e coordenada para melhorar as chances de sobrevivência. Cerca de 30% das vítimas de PCR não sobrevivem e 15% apresentam sequelas neurológicas^{1,2,3}. O desenvolvimento de um Protocolo de Atendimento à PCR justifica-se pela importância de capacitar equipes para um atendimento de qualidade às vítimas, de modo a garantir cuidados padronizados e eficazes, priorizando a segurança e a maximização das chances de sobrevivência. **OBJETIVO:** Relatar a experiência referente ao desenvolvimento de um Protocolo de Atendimento à PCR em um Hospital Público. **MÉTODOS:** O protocolo foi desenvolvido por residentes multiprofissionais das áreas da enfermagem, fisioterapia e psicologia. As etapas do desenvolvimento foram desde revisão detalhada da literatura, até a apresentação para gestores e capacitação das equipes do hospital. O protocolo foi desenvolvido com base nas vivências das residentes nos respectivos setores, pensando nas particularidades estruturais, de recursos materiais e humanos de cada um deles. **RESULTADOS:** Observou-se uma boa aceitação por parte da gestão na apresentação e implementação do protocolo, porém houve falta em relação ao apoio nas capacitações, por exemplo na comunicação para as equipes e disponibilização de local apropriado para realização de algumas delas. A adesão por parte da equipe foi bastante heterogênea, havendo setores e equipes que demonstraram real interesse e participação ativa durante as capacitações, e outras que optaram por não realizar a mesma. **CONCLUSÕES:** O desenvolvimento deste tipo de atividade, do ponto de vista de residentes multiprofissionais, foi extremamente rico e agregou ainda mais à vivência profissional, uma vez que foi possível vivenciar as potências e fragilidades de se lidar com gestão hospitalar e equipes diversas. Além disso, o fato de ter sido desenvolvido por uma equipe multiprofissional valorizou consideravelmente o protocolo, pois cada núcleo pôde dar a sua contribuição na respectiva atuação durante à PCR.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

107 - AUMENTO DE CONHECIMENTO DE GESTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE AO USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO PARA QUALIFICAÇÃO SOBRE O USO DA AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL

SCHWENGER, L.L.; PANTONI, C.B.F.; SILVA, F.V.L.; VASILCEAC, F.A.; MILAN MATTOS, J.C.; ANSAI, J.H.; GRAMANI-SAY, K.; COSTA-GUARISCO, L.P.; PORCATTI, L. R.; ROMÃO, M.B.; VAROTO, V.A.G.; CARMELO, V.V.B.; GOMES, G.A.O.

Universidade Federal de São Carlos

layanaliss@estudante.ufscar.br

INTRODUÇÃO: A Avaliação Multidimensional de Saúde da Pessoa Idosa (AMD) é um instrumento importante para o monitoramento e gestão da saúde na Atenção Primária à Saúde (APS). Um dos métodos utilizados para o aprimoramento de conhecimento de profissionais frente a AMD são as metodologias ativas, permitindo ações educativas voltadas à promoção, prevenção e tratamento da saúde. Dessa forma, é necessário investigar se a formação por meio de metodologias ativas pode qualificar adequadamente esses gestores. **OBJETIVOS:** Avaliar o grau de aumento de conhecimento dos gestores da APS com relação às metodologias utilizadas nas Oficinas Presenciais (OPs) do Projeto DGeroBrasil. **MÉTODOS:** Durante as OPs, foram utilizadas metodologias ativas com o objetivo de apresentar uma formação conceitual sobre a AMD, com a abordagem de possíveis desfechos de saúde identificados para o rastreio e manejo da saúde dessa população, seus domínios e dimensões, dentre outras informações. Para avaliar o grau de aumento de conhecimento dos gestores sobre a necessidade de planejar ações para o envelhecimento baseado no uso efetivo da avaliação multidimensional no seu território, foi aplicado um formulário com questões fechadas, variando de 1 (nada) a 5 (muito). **RESULTADOS:** 3137 gestores responderam ao formulário pós OPs. Os resultados mostraram que para 2689 (85,7%) gestores a OP aprimorou “muito” a compreensão sobre a necessidade de planejar ações para o envelhecimento baseadas no uso efetivo da AMD no seu estado. **CONCLUSÃO:** Os resultados demonstram que as OPs do Projeto DGeroBrasil foram satisfatórias para aumento de conhecimento dos gestores de saúde sobre o uso da AMD no município, o que fortalece a necessidade de ações de qualificação para os tomadores de decisões municipais.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

108 - AVALIAÇÃO DAS REPERCUSSÕES DO EFEITO WARBURG DURANTE A EVOLUÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS

SANTOS, C.V.; ZANDONA, V.P.; CHAGAS, E. F. B.; BONAMIN, F.; MARTINS, L.P.A.

Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA

cvs5840@gmail.com

Introdução: A doença de Chagas (DC), causada pelo *Trypanosoma cruzi*, é um problema de saúde pública, com manifestações clínicas agudas, intermediária e crônica. A infecção gera inflamação nos tecidos e alterações metabólicas que podem assemelhar-se ao efeito Warburg (EW), onde a glicose é convertida em lactato mesmo em condições aeróbicas. **Objetivo:** Avaliar a presença do EW na evolução da DC em camundongos infectados pela cepa *QM₂* de *T. cruzi*. **Metodologia:** Utilizou-se 72 camundongos Swiss machos, dos quais 36 foram inoculados com $5,0 \times 10^4$ da cepa *QM₂*, e 36 formaram o grupo controle. Os animais foram divididos em três grupos de 12, avaliados aos 30 (G1), 60 (G2) e 120 (G3) dias pós-infecção. Ao final dos períodos, os animais foram eutanasiados para coleta de sangue e análises bioquímicas. O G3 foi pesado e analisado a glicemia (semanal) e lactato (quinzenal). **Resultados/Discussão:** A parasitemia aumentou de forma progressiva, com pico no 17º dia, coincidindo com a redução da glicemia. Há relatos de uma resposta inflamatória intensa acompanhada de dano celular. O estresse oxidativo avaliado no plasma não mostrou alterações significativas no grupo infectado, sugerindo que o material biológico pode ter baixa sensibilidade ou que a via oxidante dependente da tripanotona do parasita esteja envolvida. No grupo infectado o EW foi evidenciado pela glicemia reduzida, utilizada como substrato, e pela maior atividade da lactato desidrogenase, especialmente na fase aguda. O lactato apresentou diferenças significativas apenas no 15º dia, com valores mais altos no grupo controle, proporcionando reciclagem pelo ciclo de Cori para a produção de glicose, compensando a deficiência deste açúcar durante o experimento. Não houve acidose láctica, e os valores de pH, pCO₂ e pO₂ ficaram inalterados. A análise da ureia não houve alterações significativas, mas mostrou-se diminuída no grupo infectado, sugerindo que seus precursores são utilizados para produção de óxido nítrico. **Conclusão:** Não foi possível confirmar a presença do EW, como observado em outros estudos. Portanto, são necessários mais estudos e análises de tecido para validar o desvio para o EW na DC.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

109 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA IDOSOS COM DIABETESMELLITUS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

SEGATELI, L.¹; ROCHA JUNIOR, P.R.¹; NASCIMENTO, G.B.²

1. Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA); 2. Centro Universitário de Adamantina.

leonardo_segatelli@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença poligênica, com forte herança familiar, ligada, principalmente a hábitos dietéticos não saudáveis e inatividade física. O DM é apontado como uma epidemia global e um desafio para os sistemas de saúde, sendo considerado um dos maiores problemas de saúde no mundo. Diante do aumento da incidência e prevalência do DM entre idosos, justifica-se a necessidade de atividades de educação em saúde visando à adesão ao tratamento e à adoção de um estilo de vida saudável voltadas para esse público. **OBJETIVO:** Analisar o efeito de uma intervenção educativa em idosos com DM, no nível de conhecimento, autocuidado, qualidade de vida e variáveis clínicas e laboratoriais. **MÉTODOS:** Ensaio clínico randomizado, realizado com 76 idosos diabéticos, divididos aleatoriamente em grupo intervenção (GI = 38) e grupo controle (GC = 38). O GI participou de cinco encontros educativos grupais com periodicidade semanal, e o GC participou do acompanhamento convencional na Unidade de Saúde. Ambos foram avaliados em três momentos (pré-intervenção, imediatamente após a intervenção e follow-up de 3 meses), responderam a quatro instrumentos: questionário demográfico e clínico; questionário de conhecimento de diabetes (DKN-A); questionário de autocuidado com o diabetes (QAD), questionário de qualidade de vida (DQOL-BRASIL), além da realização de exames laboratoriais. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O projeto está em andamento e serão apresentados os resultados da pré-intervenção. Entre os participantes 65,8% (n=50) são do sexo feminino e 34,2% (n=26) do sexo masculino. A glicemia de jejum apresentou média de 186 mg/dL, já a hemoglobina glicada teve média de 8,85%, e 81% (n=52) apresentaram valores acima de 7%. Ao analisar o IMC, 39,5% (n=30) tinham sobrepeso, 22,8% (n=22) apresentaram obesidade grau 1 e 18,4% (n=14) obesidade grau 2. Cerca de 86% dos idosos apresentou baixo conhecimento em relação à doença. No score de autocuidado, apenas a monitorização da glicemia e medicação apresentaram média superior a 5 dias de autocuidado. Sobre a Qualidade de vida, no domínio preocupações relacionadas ao DM, observou-se que 67% dos idosos possuem preocupação com uma possível complicação da doença. **CONCLUSÃO:** A maioria dos idosos apresentou nível de hemoglobina glicada acima da normalidade, alto índice de obesidade, baixo conhecimento sobre a doença, bem como baixo nível de autocuidado, destacando a importância da realização de intervenções educativas que levem à melhora da adesão dos pacientes ao tratamento e ao autocuidado.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

110 - AVANÇOS CIENTÍFICOS NO CONTEXTO DA COVID-19: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA DA UFSCAR

GOMES, G.A.O.¹; ITRIA, A.¹; GRATÃO, A.C.M.¹; ZANON, C.J.¹; GODOI-JACOMASSI, D.¹; ORLANDI, F.S.¹;VASILCEAC, F.A.¹;ANSAI, J.H.¹;POTT, H.¹;GRAMANI-SAY, K.¹;INOUE, K.¹;COSTA-GUARISCO, L.P.¹;MONTEIRO, L.C.¹; COMINETTI, M.R.¹; ZAZZETTA, M.S.¹; CASTRO, P.C.¹; PAVARINI, S.C.I.¹; ALEXANDRE, T.S.¹; VAROTO, V.A.G.¹; PEDRO, W.J.A.¹; PANTONI, C.B.F.¹

1.Universidade Federal de São Carlos

grace@ufscar.br

INTRODUÇÃO: A pandemia de COVID-19 trouxe consequências para as pessoas idosas e seus familiares. Neste sentido, a sistematização de evidências científicas que contribuam para soluções aos desafios impostos à pessoa idosa é importante. Assim, as pesquisas desenvolvidas pelo Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos (PPGGero) buscam contribuir para o avanço do conhecimento científico e prática clínica no cenário pandêmico. **OBJETIVO:** Descrever os avanços científicos em Gerontologia durante a pandemia COVID-19 com estudos realizados pelo PPGGero da UFSCar. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão narrativa sobre os avanços científicos em Gerontologia no mundo durante a pandemia (englobando o início e o período final) da COVID-19, realizada com dados de pesquisas do PPGGero, entre os anos de 2020 e 2022. **RESULTADOS:** Os principais avanços foram: 1) Adaptação e/ou validação de instrumentos relacionados à COVID-19 para o contexto brasileiro. 2) Avaliações da saúde mental, aspectos físicos e biológicos relacionados a pacientes com COVID-19. 3) Estudos sobre os fatores relacionados à alta vulnerabilidade para a COVID-19 em pacientes com Doença de Alzheimer. 4) Investigação dos níveis circulantes de citocinas inflamatórias em pacientes com COVID-19 e estratificação de acordo com a idade. 5) Papel da idade na relação entre vacinação para COVID-19 e desfechos clínicos adversos. 6) Fragilidade e a diversidade de eficácia vacinal em idosos. 7) Usabilidade e aceitabilidade de intervenções pela internet para cuidadores familiares de pessoas que vivem com demência. 8) Avanço na gestão de casos para prevenção de quedas durante e após a pandemia. 9) Uso de dispositivos tecnológicos para a promoção de saúde e intervenções online para pessoas idosas e seus cuidadores, dentre outros. **CONCLUSÕES:** Houve grande avanço científico nos aspectos biopsicossociais do processo de envelhecimento durante a pandemia de COVID-19. Neste sentido, o PPGGero busca contribuir com o meio científico e com a sociedade, trazendo evidências para melhoria das abordagens à saúde da população idosa.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

111 - CENTRO DIA DO IDOSO E EDUCAÇÃO PERMANENTE: ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS EM EQUIPE

MONTALVÃO, D. B.; PIO, D. A. M.; GIMENEZ F.V.M.

Faculdade de Medicina de Marília

dani.montalvao@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O Centro Dia do Idoso (CDI), é um local propício para a promoção de um envelhecimento ativo, vínculo e interação construtiva entre equipe e usuários, porém há desafios na prática. **OBJETIVO:** Descrever e analisar o processo de implementação e avaliação de Educação Permanente por meio de Oficinas para qualificação do cuidado e gestão no CDI. **MÉTODO:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com referencial da pesquisa-ação, realizada em um CDI de um município do interior paulista, por meio de Oficinas de Trabalho aos profissionais assistenciais e coordenador local do CDI. Nas primeiras quatro oficinas aplicado a estratégia da Espiral Construtivista e nas oficinas temáticas, os temas elencados em equipe. A análise dos dados das primeiras oficinas foi pela Análise de Conteúdo na modalidade Temática e das oficinas temáticas realizado análise descritiva. **RESULTADOS:** No total houve 11 participantes, maioria do sexo feminino, idade entre 50 a 59 anos e casados. A avaliação dos encontros demonstrou que a proposta da EP foi positiva para os participantes, trouxe ações significativas, instrumentos da área da saúde para direcionamento do cuidado e que a participação dos gestores municipais nos encontros é um referencial de organização do trabalho e cogestão. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que as estratégias levantadas neste estudo por meio da EP tornam-se potentes para mudanças significativas a longo prazo no serviço. Ressalta-se o quanto a intersetorialidade aconteceu durante a implementação da EP, com a aproximação da equipe do CDI com a Unidade de Saúde da Família do território e o contato com profissionais da secretaria de saúde do município e de instituições de ensino. Sendo essencial a continuidade da EP nos serviços.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

112 - COMPORTAMENTO DA GLICEMIA AO LONGO DE 12 SEMANAS DE EXERCÍCIO EM IDOSOS COM DIABETES TIPO 2: COMPARAÇÃO ENTRE TREINAMENTO RESISTIDO E COMBINADO

SPÍNOLA, M. M.¹; SILVA, V. C.²; SANTOS, J. R.¹; LINO, M. H. S.^{1,2}; LIMA, A. M. S.^{1,2}; BRECH, G. C.^{1,2}; GREVE, J. M. D. A.¹; ALONSO, A. C.^{1,2}

1.Laboratório do Estudo do Movimento (LEM) do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo;
2.Programa de Pós-Graduação Ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas Tadeu, SP, Brasil.

prof.angelicaalonso@usjt.br

INTRODUÇÃO: O controle glicêmico é um fator crucial na gestão do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Embora o treinamento resistido (TR) (força muscular) e o treinamento combinado (TC) (exercícios aeróbicos e resistidos) sejam conhecidos por melhorar a sensibilidade à insulina e o perfil glicêmico, há uma lacuna em estudos que compararam diretamente esses dois tipos de intervenção. **OBJETIVO:** Analisar as mudanças nos níveis de glicose sanguínea em resposta aos diferentes tipos de treinamento e determinar qual abordagem oferece melhores resultados para o controle do DM2 em idosos. **MÉTODOS:** foi realizado um ensaio clínico randomizado, aprovado no Comitê de Ética da Universidade São Judas sob nº 6.756.107 com 40 homens idosos, diagnosticados com DM2, divididos em dois grupos de 20 participantes cada: Grupo TR e Grupo TC. Os programas de treinamento foram realizados duas vezes por semana, durante 12 semanas. As variáveis glicêmicas foram medidas antes e após o período de intervenção de cada sessão. Ambos os grupos tiveram orientação nutricional. Foram realizadas análises por intenção de tratar com modelos de semi-paramétricos utilizando o software SAS. As 24 sessões foram agrupadas em três tempos, sendo o primeiro, incluindo sessões 1 a 8, o segundo 9 a 16 e o terceiro 17 a 24. **RESULTADOS:** Os grupos TR foram semelhante na linha de base do estudo ($p=0,94$). O efeito na glicemia entre grupos ao longo do programa de exercícios foi identificado entre as primeiras sessões, 1 e 8 ($p<0,05$). O Grupo, onde o grupo TC apresentou uma redução mais significativa na glicemia de jejum ($p<0,05$) com uma redução estimada de $(-3,8882)$ omparado ao TR. As análises comparativas entre tempos e grupos demonstraram variações ao longo do programa de exercícios com redução no início e ao final, porém sem significância estatística entre as sessões 9 a 16 (estimativa 2,5986; $p=0,20$ e 17 e 24 (estimativa $-1,3318$; $p=0,32$). **CONCLUSÃO:** O TC mostrou-se superior ao TR na melhora do controle glicêmico de pacientes com DM2 apenas no primeiro mês de intervenção, mas essa diferença não se manteve até o final do programa.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

113 - COMPREENSÃO DOS ESTUDANTES DO INTERNATO DE MEDICINA SOBRE PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE

CAMPASSI, M.C.; BRACCIALLI, L.A.D.; CARACIO, F.C.C.; MORAES, M.A.A.

Faculdade de Medicina de Marília

milena.ccampassi@gmail.com

INTRODUÇÃO: A segurança do paciente tem sido amplamente discutida ao longo da história, sendo um aspecto central na qualidade dos cuidados de saúde. O conceito de qualidade do cuidado se faz presente em todos os tipos de avaliação em saúde, tratando-se de um conceito de caráter multidimensional que vem se modificando com o passar do tempo. Nesse contexto, destaca-se o papel crucial das instituições de ensino na abordagem dessa temática no meio acadêmico e profissional. **OBJETIVO GERAL:** Avaliar a compreensão dos alunos do internato de Medicina sobre a Segurança do Paciente. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** Propor estratégias para integrar a promoção da segurança do paciente e a prevenção de eventos adversos no currículo do curso de Medicina. Desenvolver um instrumento de ensino que fomente a educação em segurança do paciente no contexto da graduação. **MÉTODO:** O estudo será desenvolvido após uma revisão integrativa da literatura acerca da temática. A pesquisa de campo será do tipo misto, com acadêmicos do internato de medicina, de uma universidade privada do interior de São Paulo. Inicialmente, na pesquisa quantitativa, será aplicado um questionário validado acerca do tema à totalidade dos alunos do internato dessa instituição, com uso de escala Likert e análise descritiva desses questionários. Na pesquisa qualitativa serão realizadas entrevistas semiestruturadas, norteadas pela questão, qual a compreensão sobre as práticas de segurança do paciente nos campos de estágio do internato. O número de entrevistados será definido pela saturação das respostas. As entrevistas serão transcritas e avaliadas mediante análise de conteúdo na modalidade temática de Bardin. Os entrevistados receberão o termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e essa pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que a pesquisa evidencie lacunas no conhecimento sobre segurança do paciente, possibilitando intervenções pedagógicas durante a graduação, com o objetivo de melhorar a assistência prestada e reduzir a incidência de erros assistenciais.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

114 - CORRELAÇÃO ENTRE CÉLULAS BASAIS E ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO NA PROTEÇÃO DA BARREIRA HEMATO-EPIDIDIMÁRIA EM ANIMAIS SUBMETIDOS À RESTRIÇÃO PROTEICA MATERNA

OLIVEIRA, S.G.¹; FERRETI, R.²; DOMENICONI, F. R.³

1. Discente do Programa de Pós-Graduação - Mestrado Acadêmico da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA.
2. Professor do Instituto de Biociências, UNESP- Faculdade de Medicina - Câmpus de Botucatu.
3. Professora do Instituto de Biociências, UNESP- Faculdade de Medicina - Câmpus de Botucatu.

gabriele.soliveira@outlook.com

INTRODUÇÃO: Sabemos que a restrição de proteínas é uma preocupação global nos seres vivos, estudos revelam que a restrição proteica materna prejudica o funcionamento do epidídimo dos filhotes machos em desenvolvimento, uma vez que a expressão de proteínas associadas à regulação e desenvolvimento do órgão são alteradas de forma dependente da idade. Animais submetidos à restrição proteica materna durante a gestação e lactação apresentam atraso na diferenciação celular e alterações nas características do epidídimo, portanto parece interessante relacionar essas alterações à estrutura da barreira hemato-epididimária e a presença de estresse oxidativo. **OBJETIVO:** Verificar se há equilíbrio entre o aumento das células basais e a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) para proteção da barreira hemato-epididimária nos animais submetidos à restrição proteica materna. **MÉTODOS:** Consiste em um estudo experimental com ratos Wistar do Biotério da UNESP Botucatu. Dois grupos maternos serão formados após a prenhez, recebendo ração normo ou hipoproteica durante gestação e lactação (10 fêmeas por grupo). As dietas das fêmeas mães serão mantidas até o desmame dos filhotes. Ao nascimento apenas oito filhotes machos serão mantidos por mãe durante a lactação. Aos 120 dias, os filhotes serão eutanasiados e os epidídimos serão coletados para análise. Os epidídimos serão processados através da técnica de imuno- histoquímica para marcar a proteína CX43 e quantificar as células basais, o plasma sanguíneo será processado para análise das enzimas do estresse oxidativo. Para mensuração das espécies reativas de oxigênio (EROs) e capacidade antioxidante serão medidos o malonaldeído e as enzimas antioxidantes, para verificar se o nível de EROs é controlado ou excessivo, dessa forma a comparação com um grupo controle indicará se a barreira do epidídimo está adaptada ou sob estresse oxidativo, sinalizando possível dano. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que os animais submetidos à restrição proteica materna apresentem aumento das células basais e consequentemente aumento na produção de EROs para proteger a barreira hemato epididimária.

Agradecimento*: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) Programa de Demanda Social. Número do processo: 88887.670520/2022-00.

115 - CUIDADOS PALIATIVOS: PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA TERAPIA INTENSIVA

Silva, A. M.; Silva, L.C.P.

Faculdade de Medicina de Marília; Hospital Beneficente Unimar

alyne_damata@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Os cuidados paliativos são uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e suas famílias que enfrentam doenças progressivas e que ameaçam a vida. A interdisciplinaridade é absolutamente necessária para uma assistência correta e com um planejamento terapêutico que envolva toda a equipe. Porém a abordagem deste tema permanece pouco explorada, e nos ambientes hospitalares ainda são desafiadoras. **OBJETIVO:** Este estudo busca compreender a percepção e prática da equipe multiprofissional, de uma Unidade de Terapia Intensiva adulto, sobre a assistência à saúde prestada a pacientes em cuidados paliativos. **MÉTODO:** Será uma pesquisa exploratório-descritiva com abordagem qualitativa, que se realizará em uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto de um hospital de ensino do interior do Estado de São Paulo, conveniado ao Sistema Único de Saúde, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, dentista, farmacêuticos e terapeuta ocupacional. Todos os participantes assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados ocorrerá por meio de um questionário que constará de abordagens sociodemográficas e a percepção e prática da equipe multiprofissional, sobre a assistência à saúde prestada a pacientes em cuidados paliativos. Para a realização desta pesquisa será utilizado como referencial metodológico o Discurso do Sujeito Coletivo, e para a análise dos dados será utilizado o *software* Qualiquantisoft®. **RESULTADOS ESPERADOS:** Partindo do pressuposto de que os profissionais que atuam na equipe multiprofissional vivenciam dificuldades em desenvolver uma assistência voltada às necessidades integrais destas pessoas em Cuidados Paliativos, faz-se necessária uma análise deste fenômeno para uma proposta de intervenção adequada.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

116 - DESFECHOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES, ECONÔMICOS E SOCIAIS DE PESSOAS IDOSAS NA TELERREABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

OLIVEIRA, F.¹; SILVA, F.V.L.¹; SCIAMANA, C.¹; RODRIGUEZ, T.M.¹; ROSSI, M.B.¹; SERANTOLA, J.C.¹; MILAN-MATTOS, J.C.¹; PANTONI, C.B. F.¹

1.Universidade Federal de São Carlos

fisio.fabriciooliveira@gmail.com

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de alterações clínicas, provocando incapacidade física, de saúde e economia em todo o mundo. A reabilitação cardiovascular (RCV) tornou-se crucial para a prevenção das descompensações hemodinâmicas e para a melhora do indivíduo. Como uma nova alternativa para a RCV convencional, a telerreabilitação cardiovascular (T-RCV) permitiu o contato entre o profissional de saúde e pacientes de diferentes localidades, conectando-os em tempo real; porém, não estão claras, na literatura, as diferenças entre a forma convencional e a telereabilitação quanto a diferentes desfechos. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os principais desfechos clínicos cardiovasculares, econômicos e sociais em pessoas idosas que realizam T-RCV comparado a RCV convencional. **MÉTODOS:** Revisão Sistemática de ensaios clínicos randomizados que realizaram T-RCV comparado a RCV convencional. Serão incluídos estudos, seguindo a estratégia PICOS: P- mínimo de 60 anos, de ambos os sexos; I - T-RCV, realizada por qualquer dispositivo eletrônico; C - presença de grupo controle que recebe atendimento usual ou RCV ambulatorial; O - desfechos clínicos cardiovasculares (pressão arterial sistêmica, nível glicêmico, perfil lipídico, circunferência de cintura abdominal e capacidade funcional), econômicos (custos da realização da reabilitação cardiovascular convencional x telereabilitação, custos em saúde em geral) e sociais (qualidade de vida); S - inglês, espanhol e português. Serão realizadas buscas nos bancos de dados PubMed, Web of Science e PEDro, utilizando a combinação das seguintes palavras chave: "*cardiovascular telerehabilitation*" AND "*telerehabilitation cardiovascular and exercises*" AND "*Cardiac telerehabilitation in the elderly*" AND "*cardiovascular telerehabilitation protocols*", sem limite de tempo nos idiomas de português, inglês e espanhol. A escala PEDro será utilizada para identificar a qualidade dos estudos. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se identificar os benefícios da T-RCV, sob aspectos clínicos cardiovasculares, econômicos e sociais, comparada a RCV convencional.

Agradecimento*: "O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001".

117 - DIETA COM BAIXA INGESTÃO DE IODO – MANUAL DE ALIMENTOS

SILVA, G.O.; KOGA, K.H.; ROMEIRO, F.G.

Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP

gabriela.ongaratto@unesp.br

INTRODUÇÃO: O câncer de tireoide do tipo papilífero e folicular são os mais frequentes, este último acometendo mulheres com mais de 50 anos. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos desta patologia, envolvem o uso de iodo radioativo e, para sua realização recomenda-se uma dieta pobre em iodo. Na literatura, há uma escassez de trabalhos que cite alimentos com baixo teor de iodo e atualmente, a orientação sobre a dieta é baseada na exclusão e liberação de determinados alimentos, o que dificulta a adesão dos pacientes e pode comprometer a efetividade do tratamento. **OBJETIVOS:** Elaborar um manual de alimentos com baixo teor de iodo que especifique seu conteúdo nos alimentos, assim como, a quantidade permitida para pacientes que serão submetidos a procedimentos diagnósticos e terapêuticos com iodo radioativo. **MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com análise da tabela de composição alimentar de alimentos previamente selecionados. Inicialmente, para a seleção dos alimentos que irão compor o manual, será usada como base a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-09 e 2017-18, por apresentar dados sobre os principais alimentos consumidos no país. Os alimentos serão divididos em grupos alimentares e serão excluídos alimentos preparados, processados ou ultraprocessados com adição de sal. O segundo passo será a busca dos alimentos selecionados em bancos de dados de tabelas de composição alimentar de vários países, para encontrar o conteúdo de iodo. Alimentos não encontrados serão excluídos. A quantidade de cada alimento será convertida para medidas caseiras (xícara, colher de sopa, colher de sobremesa e de café), para facilitar a mensuração. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se a construção de um manual com a quantificação de iodo nos alimentos, apresentada em medida caseiras, para auxiliar os pacientes na realização da dieta de baixa ingestão de iodo e assim diversificar a alimentação durante a preparação para procedimentos terapêuticos e diagnósticos. Este manual será disponibilizado impresso e em formato digital (*e-book*).

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

118 - DISFAGIA EM IDOSOS: COMPREENSÃO E PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

GIROTO, T. R.¹; PIO, D.A.M.²; BARBOSA, V.B.A.³

1. PÓS GRADUANDA DO PROGRAMA DEMESTRADO ACADÊMICO SAÚDE E ENVELHECIMENTO DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA
2. DOCENTE DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA
3. DOCENTE DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA

talita.rodrigues24@hotmail.com

Introdução. A disfagia ou alteração de deglutição é identificada como dificuldade de ingestão de alimentos ou líquidos da boca até o estômago, relacionada a perda de movimentos síncronos das estruturas musculares envolvida na deglutição, seja por disfunção neurológica ou por disfunção mecânica, tendo impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos, por contribuir com a morbimortalidade. A disfagia é frequente no idoso, lançando um desafio ao setor público e aos profissionais de saúde, que devem ter um olhar diferenciado e atento à condição de saúde dessa população, com intuito de promover o envelhecimento saudável. Assim, destaca-se a importância da Atenção Primária à Saúde (APS) na vigilância no cuidado do idoso, principalmente por auxiliar no envelhecimento saudável, justamente em um momento de transição demográfica com aumento da população idosa. O manejo adequado dos agravos da disfagia é uma habilidade que deve ser desenvolvida para proporcionar melhora na qualidade de vida do idoso. **Objetivo:** Compreender a experiência de profissionais da APS, acerca da disfagia e propor estratégias de enfrentamento às dificuldades. **Método:** O estudo será qualitativo, de natureza exploratória e de campo, realizado em um município de médio porte do interior paulista. A amostra será intencional, composta por profissionais da saúde que atuam na APS, por pelo menos seis meses, anteriores à coleta dos dados. Será utilizado o Grupo Focal (GF) para coleta de dados, com roteiro semiestruturado, contemplando os objetivos da pesquisa e questionário sociodemográfico e profissional para caracterização da amostra. Os depoimentos do GF serão analisados pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). **Resultados esperados:** Espera-se que os resultados possam elucidar a atuação dos profissionais da APS com relação aos mecanismos de triagem e diagnósticos dos idosos com disfagia, potencializando o olhar para esse cuidado.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

119 - DO SERTÃO AO ASFALTO: A FORÇA DA RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE NA TRAJETÓRIA DO ENVELHECER DE MIGRANTES NORDESTINOS

ALVES, V.O.; MARQUES, B.G.; ORTIZ, S.R.M.

Universidade São Judas

vanessadeoliveira673@gmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento de pessoas idosas nordestinas que migraram para São Paulo é marcado por desafios que vão além das questões de saúde, envolvendo o enfrentamento de condições culturais e sociais distintas. Nesse contexto, a espiritualidade e a religiosidade surgem como possíveis fatores de proteção fundamentais frente ao estresse migratório. **OBJETIVOS:** Analisar a relação entre o estresse migratório e a espiritualidade/religiosidade como fator modulador em pessoas idosas nordestinas que migraram para o estado de São Paulo. **MÉTODOS:** Pesquisa descritiva, exploratória e mista, com entrevistas semiestruturadas. Com a aprovação pelo Comitê de Ética (parecer nº 6.223.901), adotaram-se amostragem em bola de neve e mapeamento de instituições voltadas a pessoas idosas em São Paulo. Foram aplicados questionário sociodemográfico, *Health Organization Quality of Life Group* (WHOQOL-Old), Escala de Religiosidade da Duke e questionário semiestruturado elaborado pelas autoras. Participaram da pesquisa 7 pessoas de 60 a 102 anos. As entrevistas foram analisadas qualitativamente com base na Análise de Conteúdo de Bardin, apoiada na Psicologia Intercultural e Antropológica; demais instrumentos foram analisados por meio de estatística descritiva. **RESULTADOS:** A média de Qualidade de Vida (WHOQOL-Old) foi de 89,28, e os níveis de religiosidade apresentaram-se elevados: 66,7% organizacional (frequência em atividades religiosas formais), 83,3% não-organizacional (atividades religiosas privadas) e 100% intrínseca (profundidade das crenças religiosas e seu impacto diário). Na visão dos participantes, a espiritualidade promove pertencimento e propósito, sendo um recurso essencial para enfrentar os desafios da migração e promover resiliência. Muitos relataram que manter tradições culturais e rituais religiosos ajudou a preservar sua identidade, proporcionando-lhes conforto e estabilidade emocional. **CONCLUSÃO:** Conclui-se, portanto, que a espiritualidade e a religiosidade desempenham um papel crucial na promoção do bem-estar entre as pessoas idosas migrantes, funcionando como mecanismos de autossustentação emocional e cultural.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

120 – EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DE ENDOCRINOLOGISTAS PEDIÁTRICOS NOS PRIMEIROS DOIS ANOS DE DIABETES TIPO 1 – CUIDANDO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL

COELHO, A.P.; PERES, C.R.F.B.

Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA

mandinha.apc@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Brasil é o terceiro país no mundo em prevalência de diabetes tipo 1 entre pacientes com 0 e 19 anos, segundo dados da International Diabetes Federation (IDF). De um total de 8,4 milhões de pacientes em todo o mundo, aproximadamente 18% tem menos de 20 anos. O avanço tecnológico revolucionou o tratamento ao desenvolver sensores de monitoramento contínuo de glicose e sistemas para infusão de micro doses de insulina, adicionando capacidade de prevenção de hipoglicemias e ajuste automático de terapia para correção de hiperglicemias, porém estudos sobre autogestão da doença revelam dificuldades que impactam diretamente o controle, incluindo determinantes sociais de saúde e variável aceitação da doença crônica. **OBJETIVOS:** descrever o cuidado desenvolvido por Endocrinologistas Pediátricos no Brasil para o treinamento de pacientes com diabetes tipo 1 e seus familiares durante os primeiros 2 anos após o diagnóstico, incluindo escolhas alimentares, aplicação de insulinas, monitorização da glicemia, identificação e correção de hipoglicemias (auto gestão da doença). **MÉTODOS:** pesquisa qualitativa com coleta de dados realizada através de entrevista de endocrinologistas pediátricos (presencial ou com auxílio de vídeo chamada), gravação e transcrição integral das falas, adoção do critério de saturação para definir tamanho da amostra e análise por modalidade temática. **RESULTADOS ESPERADOS:** vivências e orientações para ensino do auto cuidado e gestão da doença crônica em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 serão apresentadas, um cenário que ainda não é descrito na Literatura e que não dispõe de roteiros prévios sobre como ofertar e acompanhar as tecnologias leves relacionadas. Nesse contexto, a Educação em Saúde no Brasil não disponibiliza cursos teóricos destinados aos pacientes e cuidadores logo após o diagnóstico de diabetes tipo 1, o que é desenvolvido em outros países, bem como a formação específica de Educadores em Diabetes, iniciativas relacionadas com melhora da qualidade de vida e do cuidado a curto e longo prazo, em adição à prevenção de complicações micro e macrovasculares.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

121 - EFEITOS DO TREINAMENTO MULTIMODAL E DA SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D NA FUNÇÃO MUSCULAR EM MULHERES IDOSAS COM BAIXA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA: ESTUDO RANDOMIZADO, DUPLO-CEGO, CONTROLADO POR PLACEBO, DE 12 SEMANAS, COM ACOMPANHAMENTO DE 6 MESES

BRECH, G.C.^{1,2}; MACHADO-LIMA, A.^{1,2}; BASTOS, M.F.²; MARANGON, E.B.G.²; GREVE, J.M.D.A.¹; ALONSO, A.C.^{1,2}

1.Laboratório do Estudo do Movimento (LEM) do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

2.Programa de Pós-Graduação Ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas Tadeu

guilherme.brech@usjt.br

INTRODUÇÃO: O país aponta para uma estrutura etária cada vez mais envelhecida. A hipovitaminose D pode causar hipotrofia das fibras tipo II (contração rápida e força), que pode aumentar o risco de quedas. **OBJETIVO:** Avaliar a manutenção dos efeitos de 12 semanas de programa de treinamento multimodal e suplementação de vitamina D, na força muscular e capacidade funcional em mulheres idosas com baixa densidade mineral óssea, após 6 meses do período de treinamento. **MÉTODOS:** Ensaio clínico randomizado aprovado pelo CEP da Universidade de São Paulo (306/15) em parceria com a Universidade São Judas Tadeu. 422 participantes selecionados, sendo que 46 atenderam aos critérios de inclusão. Após 6 meses de acompanhamento foram reavaliados, grupo experimental (GE; n = 20) e grupo controle (GC; n = 22). As avaliações de força muscular foram realizadas pelo teste de sentar e levantar de 30 segundos; teste de escada de 15 degraus; dinamômetro de preensão manual e a avaliação da força muscular do joelho pelo dinamômetro isocinético a 60 °/seg. Todas as avaliações foram realizadas em três momentos: pré (linha de base), pós (12 semanas) e acompanhamento (6 meses de acompanhamento). **RESULTADOS:** GE apresenta diferença entre o momento pré e pós ($p=0,0002$) e diferença entre o momento pré e pós (6 meses) ($p=0,0008$) e GC diferença entre o momento pré e pós ($p<0,001$) e diferença entre o momento pré e seguimento (6 meses) ($p<0,001$). Em relação aos resultados da dinamometria de força muscular isocinética ao longo do tempo, o GE apresentou melhora nas variáveis PT/BW em flexão e extensão ($p=0,0005$) e na flexão TW D em relação aos diferentes momentos pré e pós intervenção ($p=0,0051$) e momento pré e seguimento ($p=0,006$). **CONCLUSÃO:** A suplementação de vitamina D foi capaz de manter a força muscular a partir de um acompanhamento de 6 meses após um programa de treinamento multimodal de 12 semanas.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

122 – EFETIVIDADE DO TRATAMENTO ATIVO DIRECIONADO VERSUS CUIDADO PALIATIVO EM PACIENTES COM CANCER TERMINAL: REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-ANÁLISE

BREMER, S. C.¹; HIGA, E. F. R.¹; VALENTI, V. E.²; PINTO, A. A. M.¹

1.Faculdade de Medicina de Marília

2.Universidade Estadual Paulista

soophiabremer@gmail.com

INTRODUÇÃO: ao contrário de outras condições e experiências de vida, que afetam apenas uma certa porcentagem da população mundial, o fim da vida é uma etapa do processo de viver que todas as pessoas enfrentarão. **OBJETIVO:** realizar uma revisão sistemática com meta-análise, compilando os resultados disponíveis e avaliando de forma confiável a eficácia e segurança do tratamento ativo direcionado comparado ao cuidado paliativo em pacientes com câncer terminal. **METODOLOGIA:** será realizada uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, em que a qualidade metodológica dos estudos incluídos será avaliada usando a classificação de risco de viés elaborada pela Cochrane. As pesquisas foram realizadas nas bases de dados Cochrane Library, Medline, Embase, Web of Science, sem restrição de idioma ou data de publicação. Critérios de elegibilidade para a seleção de estudos: qualquer ensaio que investigue os efeitos do tratamento ativo direcionado em comparação com os cuidados paliativos. O protocolo que delimita este trabalho foi registrado no International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO). Os dados dicotômicos serão resumidos usando a razão de risco (RR). Em relação aos dados de tempo até o evento, serão extraídos a taxa de risco (HR) e os intervalos de confiança (ICs) de 95%. O número total de eventos por braço e o valor de p serão obtidos para calcular o valor observado menos esperado e a variância. Os dados de tempo até o evento serão agrupados usando variância inversa genérica sob o modelo de efeitos aleatórios. Todos os dados serão relatados com 95% IC. As análises serão realizadas usando o programa Review Manager Versão 5.4. **RESULTADOS ESPERADOS:** aumentar o nível de evidência disponível em pacientes com câncer terminal submetidos ao tratamento ativo direcionado comparado com os submetidos a cuidados paliativos e ajudar a trazer informações sobre riscos e benefícios dos tratamentos propostos.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

123 - EFICÁCIA DA CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO NA PREVENÇÃO DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM QUADROS RESPIRATÓRIOS HIPOXÊMICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

GRANCIERI, M.J.G.P.; MARIN, M.J.S.; DAMACENO, D.G.

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

mariajuliapelegrina@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A cânula nasal de alto fluxo é uma terapia emergente que aprimora a oxigenação em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica por meio de mecanismos avançados de ventilação. O dispositivo utiliza taxas elevadas de fluxo de oxigênio, gerando pressão positiva nas vias aéreas, o que resulta em uma redução significativa do esforço respiratório e promove a higiene brônquica. Considerando que as emergências respiratórias são as mais comuns em pacientes pediátricos, e que mais de 75% das crianças internadas em unidades de terapia intensiva necessitam de algum tipo de suporte ventilatório, a cânula nasal de alto fluxo tem se destacado como uma alternativa promissora em relação às terapias convencionais. **OBJETIVO:** Avaliar a eficácia da cânula nasal de alto fluxo na prevenção da intubação orotraqueal em pacientes pediátricos com insuficiência respiratória hipoxêmica. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão sistemática com metanálise. A busca bibliográfica será realizada nas principais bases de dados eletrônicas, incluindo PubMed, Embase, Cochrane, Scopus e Web of Science, utilizando combinações de termos relacionados ao uso da cânula nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva e insuficiência respiratória em pediatria. A seleção dos artigos será conduzida por dois revisores independentes com o auxílio de um software de gerenciamento de referências. Em caso de desacordo, um terceiro revisor será consultado. Os desfechos relevantes serão extraídos para a realização da metanálise com o propósito de calcular as medidas de efeito das intervenções. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se fornecer evidências que contribuam para a melhoria da prática clínica e educação em saúde, com foco na redução de desfechos desfavoráveis e prevenção de complicações em pacientes pediátricos com patologias hipoxêmicas, priorizando o bem-estar e a segurança do paciente.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

124 - ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE E-BOOK INTERATIVO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE ANTIBIOGRAMAS VISANDO PRESCRIÇÃO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS

CORACINI, J.A.M.; CASAGRANDE, V.; PINHEIRO, O.L.

Faculdade de Medicina de Marília

julcora@outlook.com

INTRODUÇÃO: Uma das preocupações globais em saúde pública é o uso indiscriminado de antibióticos, tendo em vista a possibilidade de surgimento de bactérias resistentes ao tratamento. Interpretar corretamente o antibiograma é crucial para a escolha de terapias antibióticas eficazes e diminuir a disseminação de microrganismos resistentes. **OBJETIVO:** Elaborar e validar um e-book sobre interpretação de antibiogramas para prescrição racional de antibióticos destinado a estudantes do curso de medicina, na fase final de sua formação (internato). **MÉTODOS:** A versão inicial do E-book será elaborada após revisão da literatura e análise dos protocolos estabelecidos pelo Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade (BrCast). Em seguida, será validado por um painel de juízes (n=10), formado por profissionais da saúde com pós-graduação *Stricto sensu* e que tenham publicações ou participem de projetos nas áreas de microbiologia ou antibioterapia ou validação de materiais educativos. Os especialistas serão selecionados após busca dos currículos disponibilizados na Plataforma Lattes. A validação de conteúdo do material será realizada em relação aos seguintes quesitos: 1) Objetivo (propósitos, metas ou finalidades); 2) Estrutura/Apresentação (organização, estrutura, estratégia, coerência e suficiência) e 3) Relevância (significância, impacto, motivação e interesse). Serão validados os itens que atingirem índice de concordância mínimo de 80%. Também será realizada validação da “Aparência” do material, com ênfase nas formas, cores, imagens, texto e quantidade/tamanho das figuras. O índice mínimo para Validação de Aparência estipulado neste estudo será de 0,78. Os estudantes da 5ª série do curso de medicina (n=80), na condição de público-alvo, irão avaliar a “Usabilidade” do material educativo, por meio da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), com ponto de corte de 73 pontos para validação. **RESULTADOS ESPERADOS:** A produção de um material educativo ilustrado, interativo e atualizado que contribua com a formação de estudantes de medicina para uma futura prescrição racional de antibióticos.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

125 - ENVELHECIMENTO E MERCADO DE TRABALHO: ESTIGMAS, DIFICULDADES E POTENCIALIDADES NA ERA DA TECNOLOGIA

HOKAMA, E.; de LIMA, A. M. S.

Universidade São Judas

erica.hokama@gmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional e a crescente influência da tecnologia no mercado de trabalho configuram um cenário complexo e desafiador para trabalhadores mais velhos. Embora o conhecimento acumulado ao longo da vida profissional represente um valioso ativo, estereótipos e preconceitos relacionados à idade podem gerar barreiras para a permanência no mercado de trabalho. Portanto, é de suma importância, discutir estratégias para superar os desafios e promover saúde mental e qualidade de vida no trabalho. **OBJETIVOS:** Analisar a relação entre envelhecimento, mercado de trabalho, etarismo, burnout, qualidade de vida, inteligência emocional e novas tecnologias. **MÉTODO:** combinando métodos quantitativos e qualitativos, com delineamento de corte transversal. Os instrumentos quantitativos incluem questionário sociodemográfico, escala de etarismo, Bateria Online de Inteligência Emocional, Escala Brasileira de Burnout e Escala de Qualidade de Vida do Idoso, com análise estatística de correlação e regressão. A fase qualitativa será por meio de entrevistas semi-estruturadas e será analisada por meio do discurso do sujeito. A integração dos dados quantitativos e qualitativos permitirá uma análise abrangente e aprofundada da relação entre etarismo, inteligência emocional, burnout e qualidade de vida. **RESULTADOS ESPERADOS:** Através dos resultados, fornecer subsídios para o desenvolvimento de políticas e práticas que promovam um envelhecimento saudável e bem-sucedido no contexto do trabalho, garantindo que os trabalhadores mais velhos possam continuar a contribuir para a sociedade e desfrutar de uma vida plena e produtiva. Contribuir com a área acadêmica, fomentando o avanço do conhecimento sobre etarismo, burnout, inteligência emocional, qualidade de vida e tecnologias no mercado de trabalho, além de formar pesquisadores. Refletir sobre a qualidade de vida dos trabalhadores mais velhos, incentivar a inclusão e valorização da experiência, e auxiliar na adaptação ao futuro do trabalho na era de novas tecnologias, e construir um futuro do trabalho mais justo e inclusivo para todas as gerações.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

126 - ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE TRIAGEM E DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO EM IDOSOS

COSTA, N. S.; TONHOM, S. F. R.

Faculdade de Medicina de Marília

costansousa@gmail.com

Introdução: No Brasil, sintomas depressivos clinicamente significativos em idosos são altamente prevalentes e a taxa média de suicídios chega a valores maiores que na população em geral. Considerando a rápida transição demográfica, principalmente em países em desenvolvimento, como ampliar as abordagens diagnósticas reduzindo a morbimortalidade? **Objetivos:** Geral: Avaliar taxa de diagnóstico e subdiagnóstico de depressão na população idosa. Específicos: descrever o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes avaliados; estimar eficácia da escala Patient Health Questionnaire-2 (PHQ 2) como método de triagem rápido para investigação de depressão e avaliar a aplicação do teste de triagem pelo agente comunitário em saúde e sua relação direta com novos diagnósticos. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa exploratória de campo - de abordagem quantitativa onde serão selecionadas de forma aleatória duas unidades da atenção básica (UBS ou USF) de cada zona da cidade de Marília. Haverá revisão de prontuário de todos os pacientes acima de 60 anos a fim de estimar prevalência de quadro depressivo através da análise do CID. Será realizada, de forma aleatória, visita domiciliar em indivíduos sem diagnóstico prévio de quadro depressivo primeiramente pelo estudante de medicina onde será aplicado o PHQ 2 e posteriormente pelo médico para avaliação e aplicação dos testes Patient Health Questionnaire-9 (PHQ 9) e Escala de depressão geriátrica 15 (EDG 15). **Resultados esperados:** Presume-se que a escala PHQ 2 conferirá significância estatística quando correlacionada com as demais escalas validadas e que a aplicação do teste como triagem por qualquer profissional da área da saúde aumentará o número de diagnóstico de transtorno depressivo na população idosa.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

127 - ESTUDO RETROSPECTIVO DO PROCESSO DE ADOECIMENTO/ACIDENTES DE PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DA ÁREA HOSPITALAR

BARBOSA, R.A.; MARIM, M.J.S.; NARDO, L.R.O.

Faculdade de Medicina de Marília

rodolpho.sst@gmail.com

Introdução: o processo de adoecimento e ocorrência de acidentes entre os profissionais da linha de frente da área hospitalar constituem desafios significativos que demandam análise e compreensão aprofundadas. Estes profissionais, como enfermeiros, fisioterapeutas e colaboradores da limpeza, enfrentam condições de trabalho intensas, exposição a riscos físicos e emocionais, e demandas psicossociais específicas. **Objetivo:** investigar os fatores que contribuem para o processo de adoecimento e a ocorrência de acidentes entre os profissionais da linha de frente da área hospitalar no Hospital de Clínicas de Marília. **Metodologia:** Este estudo será conduzido como uma pesquisa retrospectiva. Serão analisados dados documentais, com o objetivo de investigar condições laborais, o processo de adoecimento e acidentes envolvendo profissionais da linha de frente da área hospitalar. **Resultados esperados:** Os resultados do estudo deverão revelar padrões significativos de adoecimento e acidentes de trabalho entre os profissionais da linha de frente da FUMES e FAMAR. É provável que técnicos e auxiliares de enfermagem, devido ao contato intenso com pacientes e à carga física, apresentem maior incidência de acidentes e afastamentos. Análises por sexo, idade e tempo de serviço poderão mostrar diferenças na suscetibilidade a acidentes, com trabalhadores mais jovens ou menos experientes sendo mais vulneráveis. Espera-se também uma alta prevalência de doenças osteomusculares, lesões relacionadas ao esforço físico, doenças respiratórias e transtornos de saúde mental. Os resultados devem destacar a necessidade de medidas preventivas, como programas de saúde ocupacional e melhorias nas condições de trabalho, para reduzir acidentes e adoecimento.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

128 - ESTUDO SOBRE DELIRIUM EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: ANÁLISE DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS

CREPALDI, G.D.; SIQUEIRA JÚNIOR, A.C.

Faculdade de Medicina de Marília

glauciadellaquacrepaldi@gmail.com

INTRODUÇÃO: Delirium é um distúrbio de início agudo e curso flutuante, com alterações na atenção, percepção, memória e comportamento. Tem alta prevalência entre pacientes hospitalizados, piora a morbimortalidade, aumenta o tempo de internação e acelera o declínio funcional e cognitivo. O diagnóstico é clínico, porém a sensibilidade para o diagnóstico baseado apenas na impressão clínica pode ser baixa, sendo descrita como de 29% nos médicos e 35% nos enfermeiros. Por isso, é fundamental a aplicação de ferramentas. Um instrumento é o Confusion Assessment Method (CAM), já validado para o português. **OBJETIVO:** Identificar o conhecimento de estudantes de medicina e enfermagem de anos finais, e de enfermeiros e médicos de um hospital, sobre conhecimento de delirium. **MÉTODO:** Estudo quantitativo, descritivo transversal com questionário Likert de 5 pontos e 16 perguntas, que foi compartilhado com os participantes física e eletronicamente. Os dados foram tabulados e a análise descritiva feita por meio da frequência absoluta e relativa de cada fator avaliado. A associação entre o padrão de respostas foi obtido por meio do teste de qui-quadrado (X²). As análises estatísticas foram realizadas no Software R Core Team (2022), e adotado um nível de significância igual a 5%. **RESULTADOS:** A amostra resultou em 168 participantes, o que representava 85% da população com critérios de inclusão, 51,79% estudantes e 48,21% profissionais. Foi solicitado que os participantes respondessem se sabiam reconhecer o delirium. Obteve-se como resposta que 85,12% (143) assinalaram sim, e 14,88% (25) declararam não saber reconhecer, no entanto a pergunta de maior acerto ficou abaixo desta expectativa, com 71,43%, e a de menor acerto com 18,56%. Houve diferença significativa ($P < 0,05$) entre o padrão de respostas em concordar totalmente ou parcialmente com as afirmações. **CONCLUSÃO:** O estudo mostrou fragilidade no conhecimento dos participantes, o que interfere no diagnóstico e no tratamento adequado dos pacientes internados com delirium. Considera-se necessário melhorias na formação profissional e na educação sobre o tema.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

129 - EXERCÍCIO FÍSICO ASSOCIADO A CORREÇÃO DA DIETA PROMOVE MELHORA DOS PARÂMETROS ESPERMÁTICOS EM CAMUNDONGOS OBESOS

SOUZA, L.P.S.¹; ALVES, M.G.²; CHIES, A.B.³; SPADELLA, M.A.¹

1.Laboratório de Embriologia Humana, Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, Marília/SP

2.Department of Medical Sciences, University of Aveiro, Aveiro/Portugal

3.Laboratório de Farmacologia, Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, Marília/SP

larissapssouza@outlook.com

INTRODUÇÃO: A obesidade tem se associado à infertilidade masculina. Os benefícios do exercício na perda de peso são conhecidos, mas faltam estudos que comparem seus efeitos mediados pela correção da dieta na melhora da reprodução masculina. **OBJETIVOS:** Investigar se a perda de peso corporal em camundongos obesos somente pelo exercício físico ou associado à correção da dieta pode exercer papel protetor aos parâmetros espermáticos. **MÉTODOS:** No desmame, 50 camundongos Swiss adultos machos foram distribuídos: CTRL (Controle): dieta padrão por 200 dias; HFD (High Fat Diet: 36% gordura): HFD por 200 dias; HFDt: HFD por 60 dias, seguida de dieta padrão por 140 dias; ExHFD: HFD por 200 dias e exercitados 140 dias (esteira rolante sem inclinação, 5 dias/semana, 1h/dia); ExHFDt: HFD por 60 dias, seguida de dieta padrão e exercitados 140 dias. Aos 201 dias, os animais foram pesados e eutanasiados para coleta de espermatozoides do epidídimo. Foram avaliadas: motilidade, vitalidade, concentração e morfologia espermática. Dados paramétricos foram analisados por one-way ANOVA (pós-teste de Tukey) e, os não paramétricos por Kruskal-wallis (pós-teste de Dunn). Diferenças significativas se $P \leq 0,05$. Aprovação CEUA/FAMEMA nº 1070/22. **RESULTADOS:** A partir do 77º dia, o peso corporal no HFD aumentou em relação ao CTRL. Na avaliação espermática, o HFD teve redução da motilidade espermática em comparação ao CTRL, enquanto no ExHFDt houve aumento significativo. A dieta HFD reduziu a vitalidade do gameta, a qual teve recuperação nos grupos ExHFD, HFDt e ExHFDt, embora não atingindo ainda níveis do CTRL. No HFD e HFDt, observou-se redução significativa na concentração espermática em relação ao CTRL. Em HFD, ExHFD e HFDt houve diminuição de espermatozoides normais, sendo que no ExHFDt houve melhora significativa no número de células. **CONCLUSÃO:** O exercício em combinação com a correção da dieta melhorou os parâmetros espermáticos, sendo ainda mais benéfico que o exercício isolado. Isto pode contribuir para propostas terapêuticas da infertilidade decorrente da obesidade.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

130 - EXPRESSÃO DE GENES DO CICLO CELULAR E *MARK4* EM AMOSTRAS DE CÉREBRO DE PACIENTES COM DOENÇA DE ALZHEIMER E CONTROLES

TAKEDA, L.N.¹; ALMEIDA, B.R.¹; CHAGAS, E.F.B.^{1,2}; SMITH, M.A.C.³; CHEN, E.S.³; LABIO, R.W.¹; TURECKI, G.⁴; RASMUSSEN, L.T.¹; PAYÃO, S.L.M.¹

1. Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), Marília, São Paulo, Brasil
2. Universidade de Marília (UNIMAR), Marília, São Paulo, Brasil
3. Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, São Paulo, Brasil
4. The Douglas-Bell Canada Brain Bank, Douglas Mental Health University, Montreal, QC, Canada

larissanaomitakeda@outlook.com

INTRODUÇÃO: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa, cujo desenvolvimento está relacionado ao acúmulo de beta amiloide e hiperfosforilação de tau. As quinases dependentes de ciclina (*CDKs*) estão envolvidas no ciclo celular, e a desregulação de qualquer um dos estágios leva a uma série de doenças, incluindo DA. Além disso, a literatura identificou a quinase de regulação de afinidade de microtúbulos (*Mark*) para regular a fosforilação de tau. **OBJETIVO:** Nosso objetivo foi caracterizar e comparar a expressão gênica de *CDK4*, *CDK6*, *CDK7* e *MARK4* em amostras encefálicas (córtex auditivo e cerebelo) de pacientes com DA e controles idosos saudáveis. **MÉTODOS:** A técnica de PCR quantitativa em tempo real foi usada para caracterizar a expressão de genes alvo de 91 amostras (49 DA e 42 controle). Tecidos cerebrais do córtex auditivo e cerebelo de todos os pacientes foram analisados e comparados. **RESULTADOS:** A análise da expressão gênica quantitativa entre os grupos e regiões cerebrais mostrou um aumento estatisticamente significativo no grupo DA em comparação ao grupo controle para o gene *CDK7* ($p=0,009$), que foi evidente na região do cerebelo ($p=1,03$). Não houve diferença estatisticamente significativa e correlação para outros genes-alvo *CDK4* ($p=0,385$), *CDK6* ($p=0,081$) e *MARK4* ($p=0,568$). No entanto, uma diminuição estatisticamente significativa em *CDK7* foi observada apenas na região do córtex auditivo para o grupo DA ($p=0,79$) em relação ao grupo controle ($p=1,18$). **CONCLUSÃO:** *CDK7* está relacionado ao aumento da expressão na região do cerebelo em pacientes com DA. Também encontramos uma interação entre regiões cerebrais e grupos, bem como diminuição da expressão na região auditiva em pacientes com DA.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

131 - FORTALECIMENTO DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA: INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

CORREA, N. C.; GONÇALVES, L. C. S.; REIS, G. F. P.; BERNARDES, S. R.; SILVA, T. B.; PIROLO, S. M.; SIQUEIRA, F. P. C.; LUZ, G. S.

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

geisaluz.famema@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é uma iniciativa global da UNICEF e OMS para promover a amamentação e melhorar os cuidados infantis, seguindo os "Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno". No Brasil, 300 hospitais são credenciados. A Residência Multiprofissional Materno Infantil da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) é essencial para qualificar os profissionais e fortalecer a prática da IHAC, oferecendo suporte integral à saúde. **OBJETIVOS:** Desenvolver um plano de ação para o fortalecimento do selo IHAC em um hospital materno infantil na região de Marília/SP, integrando ensino-serviço por meio do Programa de Residência Multiprofissional Materno Infantil/ FAMEMA. **MÉTODOS:** A metodologia utilizada foi baseada no método PES (Problema, Estratégia e Solução), por sua simplicidade e eficácia na identificação de problemas, elaboração de estratégias e implementação de soluções. **RESULTADOS:** O plano de ação possui duas etapas: 1) Capacitação das residentes multiprofissionais (R1 e R2) sobre a IHAC; 2) Apoiar a comissão da IHAC nas próximas capacitações do serviço por meio das residentes R2, em 2025. Nos dias de capacitação sobre IHAC, foram abordados temas como benefícios do aleitamento materno para mãe e lactente, manejo e posições para amamentação, fisiologia do leite, complicações (mastite, ingurgitamento, fissuras), e a importância do contato pele a pele. Também se discutiu a legislação e a classificação de medicamentos quanto à segurança na amamentação. Práticas como relactação, translactação e desmame foram exploradas. Dez residentes foram certificadas, nos quais cinco eram R2 e cinco R1. **CONCLUSÕES:** A manutenção do título IHAC representa um desafio, sendo que a capacitação de todos os profissionais do hospital é um dos indicadores fundamentais. Há um grande potencial de fortalecimento por meio do envolvimento de residentes, colaboradores e gestão do ensino / serviço. Em 2025, o plano de ação seguirá com o apoio das novas residentes (R2), que estarão habilitadas para contribuir no aumento das capacitações dos profissionais.

Agradecimento*: "O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001".

132 - GRUPO OPERATIVO COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA IDOSOS DIABÉTICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

SEGATELI, L.¹; ROCHA JUNIOR, P.R.¹; NASCIMENTO, G.B.²

1. Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

2. Centro Universitário de Adamantina.

leonardo_segatelli@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, resultantes de defeitos na secreção de insulina, na ação da insulina ou em ambos. Com o aumento da prevalência global, o DM representa um grave problema de saúde pública, associado a complicações micro e macrovasculares que comprometem a qualidade de vida dos indivíduos afetados. O grupo operativo surge como uma estratégia terapêutica que promove o apoio mútuo e a troca de experiências entre os participantes, visando melhorar a adesão ao tratamento, o autocuidado e a compreensão da doença, com impactos positivos na saúde física e mental dos pacientes. **OBJETIVO:** avaliar a eficácia do grupo operativo como ferramenta complementar no tratamento do Diabetes Mellitus (DM). **MÉTODOS:** trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, quanto à intervenção educativa realizada em julho de 2024, por uma equipe multiprofissional, voltada para idosos diabéticos cadastrados no programa Hiperdia. O grupo contou com a participação de trinta e oito idosos que foram convidados a participar da atividade educativa através de convite feito por agentes comunitárias de saúde. Foram realizados cinco encontros semanais com duração de 90 minutos, conduzidos através de oficinas temáticas com atividades expositivas dialogadas utilizando materiais impressos, demonstrações visuais, moldes, projeção de imagens, vídeos, dinâmicas e desenhos lúdicos. **RESULTADOS:** o grupo operativo proporcionou aos idosos diabéticos estímulo ao protagonismo e autonomia, valorização do saber e das experiências pessoais e a problematização de estratégias de autocuidado para a convivência com o diabetes através de metodologias de ensino participativas e lúdicas. **CONCLUSÃO:** as práticas de educação em saúde por meio de grupos operativos para idosos diabéticos podem contribuir para melhorar a capacidade de lidar com a doença pela (re)construção do conhecimento sobre ela e consequente adoção de comportamentos de autocuidado, proporcionando maior qualidade de vida.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

133 - IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS IDOSAS QUE RECEBEM VISITAS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA

DE OLIVEIRA, M. A.¹; MARIN, M. J. S²

1. Discente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA
2. Docente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA

marcos.abelbeck72@gmail.com

INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento vem ocorrendo de forma acentuada nos últimos anos e, essas pessoas, apresentam condições crônicas de saúde que as tornam dependentes para as atividades de vida diária. A família que representa a principal fonte de apoio aos seus membros, nem sempre tem condição de atender as necessidades, sendo assim, cada vez mais aumenta a demanda para por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Estas, por sua vez, enfrentam grandes dificuldades e carecem de recursos para o atendimento adequado. Frente a este cenário, surge o questionamento de como tem sido a visitação às pessoas idosas institucionalizadas? **OBJETIVO:** Identificar a proporção de pessoas idosas institucionalizadas que recebem dos seus familiares. **MÉTODO:** Estudo quantitativo descritivo realizado em quatro ILPI de um município do interior paulista, sendo três públicas (A, B, C) e uma de caráter privado (D) e para a coleta de dados foi utilizado um formulário eletrônico GOOGLE FORMS onde foram levantadas as informações a partir dos prontuários com parecer favorável do CEP sob o nº 6.741.923. **RESULTADOS:** Em relação as visitas que as pessoas idosas recebem de seus familiares, na Instituição A são 62 (81,6%); na B 20 (45,5%), na C 22 (46,8%) e na D 23(100%) pessoas idosas recebem visitas. **CONCLUSÕES:** Há um contraste entre a instituição A (81,6%) e a Instituição D (100%) em relação as instituições B (54,5%) e C (53,2%) ambas públicas. Estas instituições (A e D) fazem um importante trabalho de aproximação da família às pessoas idosas. Esses dados revelam a importância da abordagem dos familiares quanto a importância da manutenção dos vínculos familiares mesmo que não haja condições de manter a pessoa idosa no domicílio.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

134 - IMPACTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NA QUALIDADE DE VIDA, AUTOCUIDADO E SAÚDE MENTAL DE PESSOAS IDOSAS: UM ESTUDO DESCRITIVO

SILVA, F.V.L.¹; SCIAMANA, C.¹; OLIVEIRA, F.¹; RODRIGUEZ, T.M.¹; ROSSI, M.B.¹; SERANTOLA, J.C.¹; MILAN-MATTOS, J.C.¹; PANTONI, C.B.F.¹

1.Universidade Federal de São Carlos

fernandavlimas@gmail.com

INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca (IC) é um problema de saúde pública que afeta em torno de 26 milhões de pessoas em todo o mundo. A evolução progressiva da doença e as suas características debilitantes resultam em morbidade substancial e uma alta carga de gerenciamento a longo prazo, que afeta negativamente pacientes, famílias e os sistemas de saúde. **OBJETIVOS:** Compreender o impacto do diagnóstico de IC, o conhecimento sobre a doença, o manejo e autocuidado, sintomas depressivos e de ansiedade, e qualidade de vida para a pessoa idosa. **MÉTODOS:** Serão incluídas pessoas idosas, de ambos os sexos, com o diagnóstico de IC (fração de ejeção normal ou reduzida), em tratamento farmacológico, da comunidade, não hospitalizados, cognitivamente preservados e que aceitem participar voluntariamente da pesquisa. Os participantes responderão: 1) Ficha de caracterização para coleta de dados sociodemográficos; 2) Questionário de Qualidade de vida (QV) de Minnesota; 3) Escala de Apoio Social (MOS-SSS); 4) GDS 15, para avaliação de sintomas depressivos; 5) Escala de Confiança no Autocuidado do *Self-Care of Heart Failure Index* (SCHFI) e 6) Escala de Ansiedade e Depressão (HAD). O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos. Serão realizadas análises descritivas utilizando frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão. **RESULTADOS ESPERADOS:** A caracterização desta população a partir do autoconhecimento da doença, QV, ansiedade e depressão pode aumentar as chances de adesão ao tratamento, redução de complicações e novas internações, além de dar condições para otimização da terapêutica utilizada.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

135 - IMPACTO DA SOLIDÃO NA SAÚDE FÍSICA, COGNITIVA E EMOCIONAL DA PESSOA IDOSA

CANUTO, R.M.S.¹; BASTOS, M.F.²; SALLES, R.J.³

1. Programa de Pós graduação Stricto sensu em Ciências do Envelhecimento, Universidade São Judas Tadeu
2. Programa de Pós graduação Stricto sensu em Ciências do Envelhecimento, Universidade São Judas Tadeu
3. Programa de Pós graduação Stricto sensu em Ciências do Envelhecimento, Universidade São Judas Tadeu

canuto.rms@gmail.com

INTRODUÇÃO O envelhecimento é um processo comum a todos os sujeitos, irreversível e subjetivo, marcado por perdas e ganhos de papéis sociais, rede de apoio e vínculos afetivos desenvolvidos no decorrer da vida. Com o aumento da expectativa de vida e o grande crescimento da população idosa, a solidão tem sido apontada pela literatura como um fenômeno que pode estar associado a diversas condições de saúde física, psíquica e biológica da pessoa idosa, como por exemplo: o declínio cognitivo, sintomas depressivos, risco de demência e uma pior qualidade de vida. Contudo, a literatura destaca alguns fatores protetivos na solidão das pessoas idosas como o convívio social e espaços que permitam ao sujeito a manutenção e/ou a construção de novos vínculos. **OBJETIVOS** O projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar a associação entre solidão e adoecimento mental em pessoas idosas de um centro de convivência. **MÉTODOS** O percurso deste projeto de pesquisa será através de um desenho de pesquisa de campo, envolvendo o método misto do tipo explanatório sequencial. A coleta será realizada em duas fases, sendo a primeira fase no que tange a parte quantitativa da pesquisa e a segunda fase qualitativa. Será estimada uma amostra não probabilística por conveniência de 150 participantes, que serão avaliados através de um questionário de caracterização de participante, incluindo informações básicas de saúde, aplicação do teste de rastreio cognitivo (MEEM), da escala de solidão (UCLA-BR), da escala de depressão geriátrica (GDS-15). **RESULTADOS ESPERADOS.** Embasado na literatura, a primeira hipótese deste projeto de pesquisa é de que as perdas decorrentes do processo de envelhecimento podem incorrer na pessoa idosa um estado de solidão. A segunda hipótese é de que as pessoas idosas participantes de um grupo de convivência podem ter menores índices de solidão.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

136 - IMPLEMENTAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA TRIAGEM REUMATOLÓGICA: OTIMIZAÇÃO E VALIDAÇÃO CLÍNICA

TAVARES, V.O.; ROCHA JUNIOR, P. R.; NASCIMENTO, G. B.

Faculdade de Medicina de Marília

viniciustavarescm@gmail.com

Introdução: O aumento da demanda por serviços de reumatologia tem gerado dificuldades na triagem de pacientes na atenção primária. Isso resulta em encaminhamentos desnecessários e diagnósticos imprecisos, sobrecarregando o atendimento terciário e atrasando o diagnóstico de casos graves. O atraso no diagnóstico, especialmente em doenças inflamatórias autoimunes, pode agravar o quadro clínico, aumentar a incapacidade funcional e elevar os custos de saúde pública. **Objetivo Geral:** desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para auxiliar médicos da atenção primária no diagnóstico diferencial e na triagem de pacientes, otimizando o encaminhamento ao serviço de reumatologia. **Objetivos Específicos:** avaliar a eficácia de um bot de IA na triagem e diagnóstico de doenças reumatológicas em pacientes encaminhados da atenção primária, comparando seus resultados com os diagnósticos feitos pelos médicos reumatologistas. **Métodos:** Será coletada uma amostra composta por pacientes novos encaminhados para o serviço de reumatologia. Uma análise estatística acontecerá comparando as hipóteses diagnósticas entre a atenção primária e o diagnóstico final dos reumatologistas, avaliando a divergência ou concordância diagnóstica. Posteriormente, será desenvolvido por meio de uma inteligência artificial, um bot, treinado com base em critérios diagnósticos fundamentados e aprenderá continuamente a partir de dados clínicos de pacientes de triagem, que serão fornecidos a ele. Após um volume adequado de informações, alunos do último ano de medicina aplicarão a IA em pacientes encaminhados da atenção primária, comparando os diagnósticos do bot com os dos reumatologistas. **Resultados Esperados:** Espera-se que o uso da IA melhore a acurácia diagnóstica ao auxiliar na triagem de pacientes com suspeita de doenças reumatológicas. O bot deverá apresentar alta compatibilidade com os diagnósticos realizados pelos reumatologistas no ambiente terciário. O uso da ferramenta poderá fornecer insights valiosos sobre as doenças que podem ser manejadas no nível primário de cuidado, ajudando a otimizar o fluxo de pacientes para o centro especializado.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

137 - INCIDÊNCIA DA DENGUE DE ACORDO COM AS FAIXAS ETÁRIAS NA REGIÃO DE SAÚDE DE ASSIS-SP– NO PERÍODO DE 2014 A 2024

MATHEUS, A.L.G.¹; CALEMAN, G.¹; MARTINS, L.P.A.¹

1.Faculdade de Medicina de Marília

andreclin@hotmail.com

Introdução: A Dengue é uma arbovirose que dá origem a doença infecciosa emergente causada pelo vírus pertencente ao gênero *Flavivirus* e transmitida por meio da picada do mosquito fêmea pertencente ao gênero *Aedes*. O vírus possui quatro tipos presentes no Brasil: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. A infecção pelo vírus da dengue causa um variado espectro clínico, apresentando desde formas brandas a quadros clínicos graves, em alguns casos com manifestações hemorrágicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de janeiro a julho de 2023, foram registrados surtos significativos de dengue na Região das Américas, atingindo quase três milhões de casos suspeitos e confirmados. Este dado supera o total de casos em todo o ano de 2022, que foi de 2,8 milhões. A ocorrência está concentrada principalmente no Brasil, seguido por Peru e Bolívia. A região de saúde do município de Assis, localizado no interior do Estado de São Paulo, representa esta realidade, pois no ano de 2023 registrou 7067 casos positivos para dengue. **Objetivo:** Analisar a incidência da dengue nas diferentes faixas etárias no período de 2014 a 2024 nos municípios que compõem a Regional de Saúde do município de Assis. **Metodologia:** Serão analisados dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde no período de 2014 a 2024, através do sistema de notificação de vigilância epidemiológica referente ao agravo “dengue” do SINAN com as versões Windows (2000 a 2006), SINANNET (2007 a 2013) e SINAN online (2014 e 2020). Os dados serão estratificados dentre as seguintes variáveis: Data de Notificação, Sexo, idade, Logradouro, Confirmação diagnóstica e Sorotipo. **Resultado:** tem-se a expectativa de que esta pesquisa possa fornecer dados científicos para novas estratégias de combate e de tratamento da dengue em regiões de maior vulnerabilidade, contribuindo para diminuição do impacto da doença na saúde das pessoas moradoras na região de Assis.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

138 - INCIDÊNCIA DE HOSPITALIZAÇÕES POR DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS DA REDE REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE X: UMA ANÁLISE DE DEZ ANOS

LABRE, V.¹; MAFRA, G.P.¹; GHEZZI, J.F.S.A.^{2,3}; SPADELLA, M.A.³

1. Curso de Medicina, Faculdade de Medicina de Marília - Famema, Marília/SP
2. Curso de Enfermagem, Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF, Garça/SP
3. Programa de Pós-Graduação em Saúde e Envelhecimento - PPGSE, Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, Marília/SP

vicklabre@gmail.com

INTRODUÇÃO: O aumento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) está fortemente atrelado ao processo de envelhecimento da população. Nessa lógica, o adoecimento crônico passou a ser a principal preocupação nos cenários de saúde pública no Brasil e no mundo. Responsáveis por 75% das causas de mortes precoces, as DCNT trazem impactos globais e se associam a fatores de risco plausivelmente modificáveis, o que denota a relevância de ações de promoção da saúde desenvolvidas a partir do reconhecimento do perfil epidemiológico da população acometida. **OBJETIVO:** Identificar as DCNT mais incidentes responsáveis pelas hospitalizações da Rede Regional de Atenção à Saúde X (RASS 10), no período de 2012 a 2022. **MÉTODOS:** Pesquisa quantitativa, de dados secundários, com delineamento ecológico, na abordagem temporal e espacial. Os dados foram coletados em fontes de domínio público, sendo IBGE e Sistema de Tabulação de Dados TABNET. Para a categorização dos dados foi considerado o município, sexo, faixa etária e cor/raça. A área de análise consistiu na Rede Regional de Atenção à Saúde, a qual envolve os municípios de Marília, Ourinhos, Assis, Tupã e Adamantina. **RESULTADOS:** As doenças cardiovasculares foram as de maior índice hospitalar. Entretanto, em 2022, houve um aumento considerável nos casos de hospitalização por neoplasias. As mulheres foram mais hospitalizadas por neoplasias, enquanto os homens por doenças cardiovasculares. As hospitalizações por doenças cardiovasculares e neoplasias predominaram nas faixas etárias de 20 a 59 anos. Aos 60 anos ou mais, as doenças responsáveis pelo maior número de hospitalizações foram as cardiovasculares. **CONCLUSÃO:** Ainda que se seja predominante as hospitalizações por doenças cardiovasculares, nos últimos anos investigados, houve uma redução do seu número e um aumento considerável em relação às neoplasias, o que se infere certa efetividade no atendimento de doenças cardiovasculares pela Atenção Primária em Saúde. Além disso, revela-se a importância de se caracterizar o perfil epidemiológico de cada região do Brasil, uma vez que cada uma delas apresenta dados particulares.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

139 - INCORPORAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: PERSPECTIVA DE PROFISSIONAIS

ZONTA, V.R.; PIO, D.A.M.; BARBOSA, V.B.A.

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

vi.zonta98@gmail.com

INTRODUÇÃO: As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), em crescente desenvolvimento, são métodos terapêuticos que buscam primordialmente a prevenção, promoção e recuperação da saúde, fundamentando-se no modelo de atenção humanizada e com enfoque na integralidade do indivíduo, colaborando assim, para o fortalecimento dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). As PICS não objetivam substituir a terapêutica tradicional, mas sim, são recursos que irão integrar-se ao tradicional, sendo prescritos por profissionais habilitados, almejando a oferta de um cuidado efetivo e de qualidade, considerando o biopsicossocial e o espiritual. Tem-se nesse sentido como pergunta norteadora da pesquisa: Qual a compreensão dos gestores e dos profissionais da atenção básica, referente às PICS? **OBJETIVOS:** Compreender, na perspectiva dos gestores e de profissionais, como se dá a indicação e o desenvolvimento da prática referente à oferta e utilização das práticas integrativas e complementares disponíveis no SUS. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo qualitativo de natureza exploratória, realizado na Atenção Básica de um município de médio porte, buscando abordar gestores e profissionais de saúde de cenários como: Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Unidade Básica de Saúde (UBS). A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e a análise das informações será realizada utilizando-se o referencial teórico-metodológico da análise de conteúdo na modalidade temática. **RESULTADOS ESPERADOS:** Com a obtenção das respostas, tem-se como finalidade apreender as possíveis aplicações na sociedade, a fim de ressaltar o direito de uso por parte dos usuários, quais destas práticas estão disponíveis para a população no local em que será realizada a pesquisa e a importância da difusão de conhecimentos acerca das PICS.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

140 – INFLUÊNCIA DA DIETA HIPERLIPÍDICA E DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE O SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA PRESENTE NO TECIDO ADIPOSEO

FERREIRA, É.V.A.¹; SOUZA, L.P.S.¹; ALVES, M.G.²; SANTOS, M.A.S.¹; CHIES, B. A.¹

1. Faculdade de Medicina de Marília

2. Universidade de Porto

edipovf@icloud.com

INTRODUÇÃO: O Sistema Renina Angiotensina (SRA) tem estreita relação com a obesidade, uma vez que o tecido adiposo (TA) secreta componentes do Sistema Renina Angiotensina (SRA), que atuam de forma autócrina/parácrina. A hiperplasia/hipertrofia do TA leva ao aumento na produção de componentes do SRA e esses, em contrapartida, estimulam a lipogênese, gerando um ciclo de autoestimulação. A correção dietética pode melhorar o funcionamento do SRA no tecido adiposo de indivíduos obesos, trazendo ganhos a sua saúde no processo do envelhecimento. **OBJETIVOS:** Caracterizar os efeitos de uma dieta hiperlipídica e sua correção, com ou sem exercício, sobre o SRA no tecido adiposo de camundongos. **MÉTODOS:** Estudo experimental desenvolvido em camundongos machos Swiss adultos. Os animais serão distribuídos em cinco grupos: CTRL – alimentados por 200 dias com ração padrão; HFD – Alimentados por 200 dias com dieta hiperlipídica (DH); HFDt – Alimentados por 60 dias com DH e 140 dias seguintes com ração padrão; ExHFDt – Alimentados por 60 dias com DH e 140 dias seguintes com ração padrão e prática diária de exercício físico; ExHFD – Alimentados por 200 dias com DH, após os 60 dias iniciais foram submetidos a prática diária de exercício. Serão realizadas quantificações relativas em amostras de TA periepídimal de renina, ECA1, ECA2, AT1, AT2, MASr e α -tubulina (proteína endógena) por meio de Western Blotting. **RESULTADOS:** O almofariz apresentou concentrações médias mais altas e menor desvio padrão $4,60 \pm 0,70$, comparado ao moedor de vidro $4,40 \pm 1,11$. A extração foi realizada e as seguintes concentrações em mg/ml obtidas: CTRL: $3,35 \pm 0,27$; HFD: $4,08 \pm 0,88$; ExHFD: $3,63 \pm 0,94$; HFDt: $3,38 \pm 0,59$; ExHFDt: $4,96 \pm 2,90$. Os primeiros ensaios do Western Blot foram realizados e já contamos com algumas imagens, ainda não analisadas. **CONCLUSÕES:** As marcações proteicas no TA de camundongos são viáveis e o estudo está avançando de forma positiva, permitindo novas análises.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

141 - INFLUÊNCIA DA RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE NA ADESÃO À TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

COSTA, F. S.; CASAGRANDE, V.; PINHEIRO, O. L.

Faculdade de Medicina de Marília

fernandascosta1999@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), um retrovírus que compromete o sistema imunológico, gera um dos maiores desafios de saúde pública global, especialmente no Brasil, com milhares de mortes decorrentes da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). A introdução da Terapia Antirretroviral (TARV), na década de 1990, transformou a AIDS em uma condição crônica gerenciável, aumentando a expectativa e a qualidade de vida dos pacientes. Contudo, a eficácia da TARV depende da adesão ao tratamento, que pode ser influenciada por fatores sociodemográficos e psicossociais, incluindo a religiosidade e espiritualidade (R/E). **OBJETIVOS:** Verificar a influência da religiosidade e espiritualidade na adesão à TARV em pacientes vivendo com HIV/AIDS. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo observacional e transversal, com questionários de abordagem quantitativa para verificação da religiosidade, espiritualidade e adesão à TARV. Participarão do estudo os pacientes que retiram os medicamentos antirretrovirais em uma farmácia vinculada à um hospital público. Os instrumentos utilizados serão: Questionário para a Avaliação da Adesão ao Tratamento Antirretroviral (CEAT-HIV), Índice de Religiosidade de Duke (P-DUREL) e Escala de Autoavaliação da Espiritualidade (SSRS). A carga viral dos participantes e a contagem de linfócitos (LT CD4+) serão verificadas por meio da análise dos prontuários clínicos. Serão realizados testes de correlação para investigação da influência da R/E sobre a adesão ao tratamento, carga viral e LTCD4+. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que os pacientes com maior religiosidade/espiritualidade possuam melhor adesão ao tratamento e com isso apresentem carga viral indetectável e maior contagem de LT CD4+.

142 - INTERVENÇÕES VOLTADAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO DE ESCOPO

FISCARELLI, I.; RODRIGUES, P.S.; MARIN, M.J.S.

Faculdade de Medicina de Marília

isabellafiscarelligo@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A violência doméstica contra as mulheres se trata de um importante problema de saúde pública, entretanto, a atenção primária carece de propostas de intervenções efetivas sobre a temática, sendo necessário subsidiar os profissionais, bem como identificar lacunas no conhecimento. **OBJETIVO:** Identificar as intervenções voltadas para mulheres vítimas de violência doméstica na atenção primária à saúde. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão de escopo, que irá se utilizar do checklist Preferred Reporting Items for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) As buscas serão realizadas nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), MEDLINE (acesso via PubMed), Web of Science, Scopus, Excerpta Medica Database (EMBASE), Cochrane, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – (BDTD), Network of AO Repositories; utilizando-se os descritores controlados (DeCS) e palavras chaves: Violence(Domestic OR Famil* OR Women OR Woman)) AND (Women OR Woman)AND (Primary Health Care) AND (prevention OR intervention)**RESULTADOS ESPERADOS:** proporcionar evidências acerca das intervenções voltadas para as mulheres vítimas de violência doméstica na APS e, assim, contribuir com os cuidados em saúde e para evidenciar as lacunas do conhecimento e necessidades de avanços frente ao tema

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

143 - LEGALIZAÇÃO DO TESTAMENTO VITAL NO BRASIL COMO GARANTIA DA DIGNIDADE E AUTONOMIA DA VONTADE DA PESSOA IDOSA: PROJETO DE PESQUISA

LOPES, E.M.; MARANGON, E.B.G.; MONTIEL, J.M.; BRESCH, G.C.; GOZZO, D.

Universidade São Judas Tadeu

betemariucci@terra.com.br

INTRODUÇÃO: A dificuldade em aceitar a morte é comum e, muitas vezes, a vida de uma pessoa é prolongada sem garantia de sua qualidade. O testamento vital, também conhecido por Diretivas Antecipadas de Vontade, tem por atributo assegurar a autonomia do paciente, no tocante aos limites dos procedimentos médicos, quando não estiver em posse de suas capacidades cognitivas. O envelhecimento populacional e avanços da medicina evidenciam a urgente necessidade de sua legalização. Vários países já possuem leis sobre o tema, entretanto o Brasil pauta-se apenas em Resolução do Conselho Federal de Medicina, gerando discussões sobre sua validade perante os tribunais e colocando em risco a real vontade do paciente. Assim, existe a necessidade de aprovação de lei brasileira que assegure a autonomia da vontade do paciente de decidir sobre os cuidados que deseja receber. **OBJETIVOS:** O objetivo deste projeto de pesquisa é realizar uma revisão integrativa, analisando as evidências atuais referentes a autonomia da vontade da pessoa idosa quanto ao testamento vital. **MÉTODOS:** Trata-se de um projeto de pesquisa pautada em revisão integrativa em periódicos das áreas do Direito e da Saúde. O levantamento será realizado nas bases de dados Scielo, EBSCO e PubMed. Serão utilizados os seguintes descritores: idosos fragilizados, diretivas antecipadas, testamento vital, recusa de tratamento por pessoa idosa. **RESULTADOS ESPERADOS:** Por meio desta revisão integrativa, espera-se encontrar subsídio científico nas áreas do direito e saúde que demonstrem que o testamento vital representa instrumento importante para garantir o desejo da pessoa idosa em momento tão delicado de sua vida, devendo haver legislação formalmente válida que traga sustentação e efetividade a esse direito amparado pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Uma vez que a maioria das pessoas desconhece tal possibilidade, esse instrumento deve ser difundido para garantia da autonomia existencial de modo devidamente legalizado.

144 - MULHERES 40+ E TRANSIÇÃO DE CARREIRA: REVISÃO DE LITERATURA

HOKAMA, E.; NASCIMENTO, D. B.; MORAES, F. H.; CUSTÓDIO, A. S.; SOUZA, M. O.; CARNEIRO, A. T.A.; NASCIMENTO, S. M. S.; LIMA, A. M. S.

Universidade São Judas

erica.hokama@gmail.com

INTRODUÇÃO: Com as recentes projeções do aumento da expectativa de vida no Brasil e a mulher cada vez mais atuante no mercado de trabalho, faz-se necessária a reflexão sobre a dinâmica profissional e a transição de carreira de mulheres com 40 anos ou mais. Essa transição é impulsionada por fatores sociais, econômicos e culturais, como a redução da empregabilidade, o etarismo e a necessidade de adaptação entre a vida familiar e profissional. Retomar o tema nesta revisão sistemática mostra a necessidade de mais estudos voltados para essa população. **OBJETIVO:** Realizar uma revisão de literatura sobre transição de carreira de mulheres com 40 anos ou mais no Brasil. **MÉTODO:** Para a revisão de literatura, foram pesquisadas as bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Portal de Periódicos CAPES e BVS-Psi, utilizando os descritores “Transição de carreira” e “mulher”. **RESULTADO:** Três artigos, publicados entre 2019 e 2024, atenderam aos critérios de inclusão. As pesquisas discutiram o impacto da transição para a maturidade em três áreas: psicológico e social (significados do trabalho, sofrimento e identidade), papel do corpo no envelhecimento (insegurança com a aparência versus sabedoria e liberdade) e a queda da empregabilidade após os 50 anos. **CONCLUSÃO:** A desigualdade de gênero e o etarismo persistem no mercado de trabalho, afetando a autopercepção dessas mulheres. O corpo envelhecido é visto como um fator limitador, impactando a autoestima e o posicionamento profissional. Por outro lado, a maturidade traz maior serenidade e redefinição de prioridades, com foco crescente na qualidade de vida. A revisão destaca a necessidade de aprofundar as pesquisas sobre os fatores que motivam a transição de carreira em mulheres com mais de 40 anos, incluindo análises mais detalhadas com recortes sociais e raciais. Esse aprofundamento é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de enfrentamento e para a formulação de políticas que promovam a inclusão e equidade no mercado de trabalho para mulheres maduras.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

145 - MULHERES 60+ E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: A INVISIBILIDADE, O ENVELHECIMENTO E OS DESAFIOS DE INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO

BREY, M.B.; MACHADO-LIMA, A.; GOZZO, D.; HOKAMA, E.

Universidade São Judas Tadeu

marcelabbrey@gmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população global desafia o cumprimento das metas dos ODS da Agenda 2030 da ONU. As disparidades persistem em todos os países. O Banco Mundial do Comércio, no relatório *Longevity Economy Principles: The Foundation for a Financially Resilient Future*, publicado em janeiro de 2024, aponta a desigualdade de gênero e o trabalho do cuidado informal e não remunerado desenvolvido expressivamente por mulheres que se retiram do mercado formal de trabalho. **OBJETIVOS:** O presente estudo propõe-se a investigar numa perspectiva *interseccional* os desafios de inclusão da mulher idosa no mercado de trabalho formal e a sua relação frente a crise do cuidado informal não remunerado. **MÉTODOS:** Foi realizada uma investigação fundamentada em revisão bibliográfica narrativa e descritiva, empregando artigos veiculados em periódicos especializados em direitos humanos, sustentabilidade, além de livros e resoluções. Para os artigos, foram usados os seguintes descritores, em especial, nas plataformas Google Acadêmico, EBSCO e Periódico CAPES: *mulheres idosas; sustentabilidade financeira; cuidado familiar; mercado de trabalho*. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se estimular a reflexão sobre a paridade de gênero, considerando que, globalmente, as mulheres idosas (65 anos ou mais) ganham 26% menos em comparação com os homens e a maioria delas (aproximadamente 57% a 81%) podem exercer nessa fase de vida, o papel de cuidadoras informais e não remuneradas. A crise de cuidados e a inclusão ou retenção da força de trabalho das mulheres idosas no mercado de trabalho formal requerem a implementação de políticas públicas que assegurem a sustentabilidade financeira. Elas são urgentes. O olhar *interseccional* viabilizará ações integradas entre o poder público, setor privado e sociedade civil. A sustentabilidade financeira é essencial para o exercício de uma longevidade mais segura e a redução das desigualdades de gênero (ODS 5). Uma vez que o cuidado informal prestado pela mulher idosa que se retirou do mercado de trabalho termina, a vulnerabilidade dela pode ser agravada, especialmente se ela não alcançou a sustentabilidade financeira.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

146 - NECESSIDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO DOMICILIAR

MEDEIROS JUNIOR, E. R.¹; HIGA, E. F. R.²; MORAES, M. A. A.²

1. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília

2. Docente da FAMEMA

jr_med@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Cuidados Paliativos visa a qualidade de vida dos pacientes e familiares frente ao diagnóstico de doença ameaçadora de vida. Essa modalidade de cuidado pode ser desenvolvida em atenção domiciliar, incluindo os cuidados aos profissionais. Os cuidados paliativos são desenvolvidos por equipe multiprofissional, composta pela enfermagem em sua maioria. Esta equipe encontra-se imersa na subjetividade da família em crise em decorrência do adoecimento de um de seus membros. Os profissionais expressam suas dificuldades no desenvolvimento de competências e aspectos emocionais para atuar com pacientes em cuidados paliativos. Estes fatores podem influenciar negativamente na qualidade técnica do cuidado. A literatura aponta para a importância da formação adequada e do desenvolvimento de competências para atuação profissional. **OBJETIVO:** Analisar as necessidades da equipe de enfermagem em relação ao manejo de pacientes em cuidados paliativos na atenção domiciliar. **MÉTODOS:** Pesquisa Qualitativa, cuja característica é elucidar uma interlocução entre o objetivo e resultados da pesquisa que não pode ser interpretado com números. Será desenvolvida em duas etapas: Revisão Integrativa da Literatura que proporciona a síntese do conhecimento de estudos significativos na prática, combina dados da literatura, seguindo seis fases em seu processo de elaboração, tendo como pergunta norteadora “Quais as necessidades consideradas pela equipe de enfermagem no manejo de pacientes em cuidados paliativos na atenção domiciliar?”. E a segunda etapa será a Pesquisa de campo exploratória por ser um método que busca as informações da pesquisa diretamente com a população que será estudada. Será realizada em um serviço de Atenção Domiciliar em Presidente Prudente, com a equipe de enfermagem, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados serão coletados por meio de entrevista semiestruturada e analisados a partir da Análise de Conteúdo, modalidade temática. **RESULTADOS ESPERADOS:** Identificar as necessidades elencadas pela equipe de enfermagem e desenvolver ações educativas a partir dos resultados obtidos e da legislação vigente.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

147 - O CUIDADO AO COMPORTAMENTO SUICIDA DE HOMOSSEXUAIS EM SERVIÇOS DA REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

MACEDO, F.M.; NONATO, A.C; PIO, D.A.M.

Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA

fabiomalvezzi.macedo@gmail.com

INTRODUÇÃO: O suicídio é uma ação intencional para causar a própria morte, envolvendo um processo que pode ir da ideação suicida e, possivelmente, ao ato. Nesse sentido, toma-se como pressuposto que este fenômeno em homens homossexuais é maior devido ao histórico de violência e vulnerabilidade dos grupos de sexualidades dissidentes, e que isso se reflete também na prática do cuidado a essa população na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). **OBJETIVOS:** Investigar como é o cuidado de profissionais da RAPS para homens homossexuais com comportamento suicida. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, com estratégia de busca desenvolvida por meio do acrônimo PICO. Foram recuperados artigos das bases LILACS, Scielo, Web of Science, Medline, Scopus e Index Psicologia. Foram incluídos artigos sobre o cuidado profissional na RAPS em português e inglês sem limite temporal. Dos 1348 artigos, 121 foram incluídos após a leitura de títulos e resumos. Neste momento, procede-se à etapa de análise de conteúdo na modalidade temática. **RESULTADOS PARCIAIS:** A partir do estabelecimento das categorias iniciais, verifica-se que o cuidado a essa população deveria abranger o apoio à saúde mental, o enfrentamento da discriminação e a implementação de intervenções voltadas a populações vulneráveis em risco de suicídio; todavia, na prática, há dificuldades para essa implementação devido a estigmas, falta de formação adequada dos profissionais e também sobrecarga de trabalho, o que também se alinha à visão de profissionais de que o comportamento suicida não seja valorizado e, conseqüentemente, subnotificado. **CONCLUSÃO:** Pode se concluir preliminarmente que os profissionais de saúde devem aprimorar continuamente suas práticas para oferecer um cuidado mais humanizado e acolhedor, livre de estigmas e preconceitos e atento às necessidades específicas dessa população, mas isso perpassa primariamente a formação de qualidade e a garantia de condições dignas de trabalho para que esse cuidado possa de fato atender às necessidades de saúde dessa população.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

148 - O ESTRESSE OCUPACIONAL EM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA

SUEZ, S.O.¹; BRACCIALLI, L.A. D.²; MORAES, M.A.A.²

1. Pós-Graduanda do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde (PPGES), Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)
2. Docentes do PPGES e da Graduação FAMEMA

suellensuezz@gmail.com

INTRODUÇÃO: O estresse ocupacional em professores da rede de ensino público é gerado por sobrecarga de trabalho, falta de recursos adequados, pressão para alcançar metas educacionais e relações interpessoais. **OBJETIVO:** Evidenciar o índice de estresse dos professores da rede pública estadual em relação à segurança do trabalho. **MÉTODO:** Pesquisa qualitativa e quantitativa descritiva que está sendo realizada nas quatro regiões de um município do oeste paulista, com 72 professores do ensino fundamental e médio do ensino estadual, por meio do *Google forms* com instrumento validado no modelo *Likert* dividido por categorias e campos abertos. A Análise dos dados quantitativos será descritiva com frequência simples e a qualitativa será análise de conteúdo na modalidade temática. **RESULTADOS PARCIAIS:** 41,67% afirmam que por vezes há demasiado serviço para o tempo dado; em relação as afirmativas nunca e raramente: 37,50% têm feedback e a mesma porcentagem recebem retorno somente no erro, 62,50% negam conflitos no setor a que pertence com outros setores que trabalham, 58,33% apontam que não há conflitos no setor a que pertence com serviços externos com que colaboram, 58,33% negam falta de compreensão da hierarquia para problemas do setor a que pertence, 55,56% referem que não há indisciplina do pessoal, 51,39% apontam que não há conflitos entre o pessoal, 38,89% que não tomam decisões e responsabilidades mal definidas respectivamente. Analisando é possível identificar que as áreas mais significativas estão relacionadas à sobrecarga de trabalho e à falta de clareza tanto nas responsabilidades quanto nas decisões. Conflitos interpessoais e indisciplinas são reportados com menor frequência 20,83%, sugerindo que o ambiente social no trabalho é menos problemático. O feedback negativo sem reconhecimento de acertos mostra uma questão de estresse. A comunicação na instituição sobre a Segurança do Trabalho 76,39% considera ruim, e apenas 5,56% de forma boa. **CONCLUSÕES:** A pesquisa está em fase de desenvolvimento, contudo, as análises preliminares dos dados apontam para a relevância de um planejamento que atenda a necessidade dos professores.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

149 - O MEDO DO MOVIMENTO ESTÁ ASSOCIADO AO MEDO DE CAIR EM PESSOAS IDOSAS COM DOR CRÔNICA MUSCULOESQUELÉTICA

SANTOS, R. A. N.; ALVAREZ, I. F.; MAGNANI, C. A. L. P.; ZANCA, G. G.

Programa de Pós-Graduação Desenvolvimento Humano e Tecnologias da Universidade Estadual Paulista - Campus de Rio Claro

raphael.alves@unesp.br

INTRODUÇÃO: O medo de cair é um fator de risco para quedas, pois pode desviar a atenção durante a marcha, levando a redução da independência e isolamento social. A literatura sugere que mesmo idosos sem histórico de quedas podem apresentar medo de cair e há indícios de que este é mais prevalente em idosos com dor crônica. Pessoas idosas com medo de cair frequentemente temem perder a independência funcional e tornarem-se um fardo para familiares. A dor crônica musculoesquelética é uma condição muito prevalente na população idosa, uma das principais causas de anos vividos com incapacidade. Frequentemente, a dor crônica está associada também ao medo exagerado do movimento, chamado de cinesiofobia. A hipótese deste estudo é que o medo de cair em idosos com dor crônica pode estar relacionado ao medo irracional e exagerado do movimento. **OBJETIVO:** investigar se há relação entre a cinesiofobia e o medo de cair em idosos com dor crônica musculoesquelética. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo transversal e observacional, aprovado pelo Comitê de Ética da FACIS. Foram avaliados 20 idosos que viviam na comunidade e que relataram ter dor musculoesquelética há mais de seis meses. Para avaliar o medo de cair utilizou-se a *Falls Efficacy Scale International* (FES-I) e para o medo do movimento a Escala Tampa de Cinesiofobia. Os dados foram analisados utilizando o software SPSS 17, por meio de uma regressão linear simples, considerando nível de significância de 5%. **RESULTADOS:** O escore médio obtido na FES-I foi de 27,75 ($\pm 8,78$) e na Tampa foi 42,05 ($\pm 11,53$). Encontrou-se uma correlação significativa ($p=0,024$) moderada ($r=0,52$) entre os resultados da FES-I e da Escala Tampa. Por meio de uma regressão linear simples verificou-se que 25% do medo de cair dos idosos avaliados está relacionado à cinesiofobia ($R^2=0,25$). **CONCLUSÃO:** Os resultados deste estudo indicam que o medo do movimento influencia de forma moderada o medo de cair em idosos com dor crônica. Assim, é recomendado considerar ambas as avaliações para intervenções nessa população.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

150 - O TEMPO COMO DEMARCAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PRÓPRIA VIDA NO ENVELHECER

OGASSAVARA, D.; FERREIRA-COSTA, J.; TIERNO, P.C. L.; SILVA-FERREIRA, T.; DE CARVALHO, A.A.; DE PAULA, A.P.S.S.; ESCOBAR, N.B.F.; MONTIEL, J. M.

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

ogassavara.d@gmail.com

INTRODUÇÃO: Ao refletir sobre as trajetórias normativas do desenvolvimento humano, é necessário contemplar os fenômenos das diferentes dimensões que atravessam as vivências, como as alterações estruturais e funcionais de ordem biológica, cognitiva, emocional e socioeconômica. As percepções de si e de mundo são representações que são constantemente alteradas no decorrer do tempo e que podem ser pautadas em critérios objetivos ou subjetivos. **OBJETIVOS:** O presente estudo teve como objetivo discutir a autopercepção no curso de vida, com enfoque na concepção de perspectivas intrapessoais e interpessoais. **MÉTODOS:** Realizou-se uma revisão de literatura narrativa ao ter sintetizado contribuições da literatura científica em um enquadramento temporal único para conceber perspectivas panorâmicas acerca da temática investigada. Foram captados materiais no formato de artigos publicados em periódicos científicos e livros em plataformas de busca, como SciELO e PubMed, utilizando os descritores “desenvolvimento humano”, “envelhecimento” e “autopercepção”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A concepção de si enquanto indivíduo e de suas potencialidades é permeada pela percepção do próprio desempenho, comparações sociais, influências de ordem social e dos estados biológicos. Reconhece-se, meio às diversas formas de viver, o efeito exercido pelo estilo de vida sobre o estado individual e suas potencialidades, como exemplificado pelo efeito das práticas de autocuidado ao longo da vida. Nisto, aponta-se a formação identitária e a noção de eu como uma questão muito pautada na relação dialógica com os meios sociais e seus integrantes, desta maneira é ressaltada a participação social em grupos sociais íntimos como meio de significação da vida ao serem estrutura presentes ao longo do decorrer da trajetória de vida. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Concluiu-se que a participação de outros indivíduos e contexto são elementos que agregam diferentes significados à existência individual, mas também se sugere que o tempo cronológico enquanto um demarcador para a própria existência e entendimento de si, sendo uma métrica da própria vivência individual.

151 - OS EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA NO EEG NO AUTISMO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

GAZETTA, A. P. N.¹; VALENTI, V. E.²

1.Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Fonoaudiologia da FFC UNESP.

2.Docente do Programa de Pós-graduação em Fonoaudiologia da FFC-UNESP.

apngazetta@gmaila.com

INTRODUÇÃO: O Transtorno do espectro autista (TEA) é um transtorno desenvolvimento neurológico de diagnóstico clínico originado provavelmente da combinação de fatores genéticos e ambientais, caracterizado por dificuldades de comunicação e interação social com comportamentos repetitivos ou restritos. Estudos revelam um aumento na prevalência mundial, 1 em cada 36 crianças apresenta TEA. Apesar de ser possível a detecção entre 1 e 2 anos, a média de diagnóstico ocorre entre 4 e 5 anos. A detecção precoce e a intervenção intensiva tem sido associada a ganho significativo no funcionamento cognitivo e adaptativo da criança, o que explica a intensa investigação científica nessa área em busca de indicadores diagnósticos, e terapias. **OBJETIVO:** O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática em andamento com o objetivo de analisar os efeitos da estimulação magnética transcraniana (EMTC) no EEG no TEA. **MÉTODO:** A revisão foi reportada de acordo com as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Page et al, 2021). As buscas foram realizadas nas bases de dados EMBASE, MEDLINE/PubMed (via National Library of Medicine), Biblioteca Cochrane, CINAHL, Scopus e Web of Science com a submissão das palavras-chave "Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva" OU "Estimulação Magnética Transcraniana de Pulso Único" OU "Estimulação Magnética Transcraniana, Pulso Pareado" OU "Estimulação Magnética Transcraniana" E "Eletroencefalografia" OU "Eletroencefalograma" OU "Eletroencefalograma" OU "EEG" E "Autismo". **RESULTADOS:** Foram registrados 432 estudos que após processo de seleção de acordo com a declaração PRISMA resultou em 10 estudos que foram incluídos para revisão. Após extração dos dados dos estudos primários os mesmos serão apresentados em tabela. Será realizada análise estatística: quanto ao risco de viés, certeza das evidências (GRADE), análise qualitativa. **CONCLUSÃO** Espera-se que os resultados dessa revisão contribuam para validação das evidências em relação aos efeitos da EMTC no EEG, corroborando para a utilização dessa no tratamento dos sintomas cognitivos e comportamentais associados ao TEA.

152 - PAPEL DOS RECEPTORES DE MINERALOCORTICOIDES NAS ALTERAÇÕES DO TECIDO ADIPOSEO PERIVASCULAR EM RATOS ACOMETIDOS PELA ARTRITE

NASCIMENTO, I.F.S.¹; SPADELLA, M.A.²; CHIES, A. B.¹

1.Laboratório de Farmacologia, FAMEMA, Marília/SP

2.Laboratório de Embriologia Humana, FAMEMA, Marília/SP,

isafiosou@outlook.com

INTRODUÇÃO: A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica autoimune, que pode afetar o tecido adiposo perivascular (PVAT). Em estudo prévio observamos que a artrite induzida por adjuvante (AIA) promove alterações inflamatórias no PVAT caracterizadas por infiltração de células inflamatórias e aumento do estresse oxidativo. Essas alterações são mais evidentes 36 dias após a indução do modelo. Essas alterações podem envolver ativação de receptores mineralocorticoides (RM) e levar ao comprometimento da função anticontrátil, devido ao um predomínio da ação da angiotensina II (Ang II), produzida pela enzima conversora da angiotensina-1 (ECA-1), em receptores subtipo AT1 em relação à ação da angiotensina 1-7 (Ang 1-7), produzida pela ECA-2, em receptores MAS. **OBJETIVO:** Estudar o envolvimento dos RM na infiltração de células inflamatórias e no estresse oxidativo, assim como no balanço Ang II/AT1 vs Ang1-7/Mas que pode levar à perda da ação anticontrátil, promovidas pela AIA no PVAT de aorta torácica e abdominal de rato, 36 dias após a indução. **MÉTODOS:** Ratos Wistar machos (10 semanas) serão subdivididos em 3 grupos: Controles (falso imunizado e tratados com veículo); AIA [(submetidos administração intradérmica de *Mycobacterium tuberculosis* (3,8mg/mL) na pata e tratados com veículo)]; AIA+EPL (animais AIA tratados com Eplerenona 30mg/Kg por gavagem). Passados 36 dias da indução, esses animais serão sacrificados e amostras de PVAT das aortas torácica e abdominal serão obtidas para determinação de RM, ECA-1, ECA-2, AT1 e MAS, por Western blotting. Nessas amostras também serão mensurados TBARS (colorimetria), TNF-alfa, IL-1 β e IL-6 (ELISA), além de análise histopatológica. Também será estudada a participação desses PVATs nas respostas vasculares à fenilefrina em banho de órgãos. Os dados serão comparados por análise de variância ou teste Kruskal-Wallis, com diferenças significativas se $p \leq 0,05$. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que as alterações promovidas pela AIA no PVAT sejam prevenidas ou mitigadas pelo bloqueio dos RM.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

153 - PERCEPÇÃO DAS MULHERES SOBRE OS EFEITOS COLATERAIS DA BRAQUITERAPIA NO TRATAMENTO DO CÂNCER GINECOLÓGICO

TELES, J. M., HIGA, E. F. R.; MORAES, M. A. A.

Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde- Famema

julie.munhozz@gmail.com

INTRODUÇÃO: No mundo, uma em cada seis mortes está relacionada ao câncer. O câncer de colo de útero é a terceira causa mais prevalente em mulheres. No Brasil, no ano de 2020, ocorreram 6.627 mortes em decorrência de tumores de colo de útero. A Braquiterapia ginecológica é considerada uma Radioterapia interna, este tratamento é realizado posteriormente a Teleterapia. **OBJETIVO:** Analisar a compreensão das pacientes com câncer ginecológico sobre os efeitos colaterais da Braquiterapia. **MÉTODO:** Pesquisa Qualitativa desenvolvida em duas etapas: Revisão Integrativa da Literatura seguindo as seis etapas metodológicas e Pesquisa de Campo. Foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e audiogravadas, na Unidade de Radioterapia em um hospital de médio porte do interior paulista, referência em oncologia. **RESULTADOS:** Foram identificados 1.252 artigos, que após exclusão por não atenderem aos critérios de inclusão elegeu-se 28 artigos para a RIL, nos quais inicialmente emergiram as categorias: Disfunções sexuais; Toxicidade geniturinárias; Toxicidade gastrointestinal; Reações cutâneas e Alterações na qualidade de vida. Na Pesquisa de Campo, 15 pacientes foram entrevistadas e os resultados serão analisados pela Técnica de Análise de Conteúdo na modalidade Temática. **CONCLUSÃO:** Em elaboração, contudo, espera-se compreender a percepção das mulheres sobre os efeitos colaterais da Braquiterapia e fornecer subsídios para a melhoria desse cuidado.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

154 - PERCEPÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES SOBRE A SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS: CONTRIBUIÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

OLIVEIRA, J.A.A.; CHIRELLI, M.Q.

Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde- Famema

jrst.oliveira45@gmail.com

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, o ensino na área da saúde tem passado por diversas mudanças, movendo-se do modelo tradicional, onde o professor era o principal transmissor de conhecimento, para métodos mais eficazes que utilizam metodologias ativas de aprendizagem. Essas metodologias se baseiam em uma abordagem pedagógica crítico-reflexiva que promove a interação entre os diversos atores envolvidos, permitindo uma construção coletiva do conhecimento. A Simulação Realística é uma estratégia com metodologia ativa de ensino que imita uma situação real a partir da criação de um ambiente artificial, com o objetivo de capacitar, avaliar e desenvolver a compreensão dos discentes sobre sua prática profissional. Dada a complexidade das situações enfrentadas pelos profissionais de enfermagem, a inclusão dessa metodologia no currículo de graduação é uma estratégia educacional importante para a formação de profissionais qualificados e seguros. **OBJETIVO:** Analisar a visão dos professores e estudantes sobre como a simulação realística contribui para a formação do enfermeiro na graduação considerando a organização curricular. **MÉTODOS:** pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa, que será realizada com docentes e discentes da graduação em enfermagem, utilizando-se um roteiro semiestruturado com dados sociodemográficos e com as questões norteadoras sobre a utilização da estratégia articulada com a proposta curricular. Para analisar os dados será utilizada a análise de conteúdo, modalidade temática que consiste em três fases: pré-exploratória do material, seleção das unidades de análise e processo de categorização e subcategorização. **RESULTADOS ESPERADOS:** as contribuições da simulação realística para a formação do enfermeiro numa determinada organização curricular. Fornecer informações úteis para a gestão do curso de graduação em enfermagem, que possam ser utilizadas para aprimorar a formação dos estudantes e ajustar as metodologias de ensino de acordo com as necessidades identificadas durante a pesquisa.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

155 - PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SOBRE O PROGRAMA AGITA ASSIS: UMA FERRAMENTA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE

DELCHIARO, C. M.¹; TONHOM, S. F. R.²; PERES, C. R. F. B.²

1.Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

2.Docentes da FAMEMA

camisdelchiaro@gmail.com

INTRODUÇÃO: A atividade física é uma importante ferramenta na promoção da saúde, contribuindo para o bem-estar físico, emocional e social. A prática em grupo favorece interações sociais, cooperação, comunicação e estimula o pertencimento em comunidade. Nessa perspectiva, o Programa Agita Assis, há 22 anos desenvolve ações de prevenção ao sedentarismo na Atenção Primária em Saúde. Conta com dez profissionais de educação física e práticas corporais em seis territórios, o programa envolve 21 grupos que realizam exercícios duas vezes por semana, visando acesso universal. Diante disso, surge o questionamento: Qual a percepção dos usuários do Programa Agita Assis sobre sua condição de saúde após a prática das atividades? **OBJETIVO:** Analisar a compreensão dos usuários sobre as atividades propostas e sua relação com a saúde. **MÉTODOS:** Pesquisa qualitativa com 16 usuários, acima de 60 anos, que frequentam o Programa ao menos duas vezes por semana há seis meses. A questão disparadora buscou a compreensão dos usuários sobre as atividades do programa nas suas vidas. A amostra foi definida por saturação teórica dos dados, que foram processados por meio de Análise de Conteúdo, modalidade temática, seguidas as fases de Pré-análise, Exploração do Material e Tratamento dos Resultados. Emergiram quatro núcleos de sentido: o reconhecimento da importância do Programa para a prática de atividade física; a valorização das relações interpessoais; o reconhecimento das atividades na promoção da saúde e prevenção de doenças/agravos e o comprometimento com as atividades do grupo. **RESULTADOS PARCIAIS:** Os participantes apontam a importância do acesso ao Programa para a prática de atividade física, que é reconhecida como promotora de saúde e prevenção de doenças. Além disso, a participação nos grupos promove e amplia as relações interpessoais e sociais pelo comprometimento que desenvolvem com as atividades. **CONCLUSÃO:** A participação no Programa contribui não só para benefícios físicos na promoção da saúde e prevenção de doença, como favorece a ampliação das relações sociais, melhorando a condição de saúde de forma mais ampliada.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

156 - PERCEPÇÃO DOS PACIENTES SOBRE O PRÉ-OPERATÓRIO

CONTRERA, E. D. G.¹; PIROLO, S. M.²

1. Residente do Programa de Residência Multiprofissional da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

2. Docente da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

edilainedias29@gmail.com

INTRODUÇÃO: O procedimento cirúrgico é um ato invasivo crucial para diagnósticos e tratamentos que podem aliviar incapacidades e reduzir riscos de morte. As cirurgias são classificadas por porte, finalidade e contaminação do sítio. O perioperatório abrange várias fases, incluindo o pré-operatório mediato e imediato, transoperatório, e pós-operatório. Para qualificar a prática da enfermagem, o presente estudo busca a percepção da pessoa a ser operada, sobre os cuidados realizados no pré-operatório. Ao compreender o conhecimento e entendimento do cliente será possível contribuir para a melhoria do serviço e atendimento, utilizando-se práticas acolhedoras, seguras, menos traumáticas e humanizadas. **OBJETIVOS:** avaliar a percepção dos clientes sobre as orientações e assistência de enfermagem no período pré-operatório. **MÉTODOS:** Pesquisa de campo com tipo de estudo descritivo, de abordagem qualitativa, utilizando-se questionário. Foram entrevistados 30 pacientes que estavam aguardando consulta de pré ou pós operatório no ambulatório Mario Covas. **RESULTADOS:** Observou-se uma necessidade de um domínio maior dos pacientes sobre o ato cirúrgico e o seu preparo, visto que a maioria dos entrevistados tiveram dificuldades em abordar a finalidade de sua cirurgia e como realizar o seu preparo. Nota-se, também, a importância da comunicação com a equipe de enfermagem, com relação às possíveis alergias, a explicação da necessidade do banho e higiene e confirmação da identificação no pré-operatório imediato. A respeito de sanar dúvidas, alguns entrevistados relataram a falta de informações da equipe de saúde sobre sua cirurgia e a ansiedade/medo como obstáculo no pré-operatório. **CONCLUSÕES:** O desenvolvimento deste trabalho foi de grande valia para identificar as informações recebidas pelos clientes no pré-operatório e a falta de algumas orientações; verificar sua compreensão sobre o preparo antes da cirurgia e a importância de esclarecer dúvidas. Assim, reafirmando-se a necessidade de uma assistência de enfermagem no pré-cirúrgico acolhedora, promovendo uma maior comunicação com o paciente, utilizando-se linguagem acessível e comunicação clara.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

157 - PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE INSERIDOS NO CONTEXTO HOSPITALAR SOBRE O MANEJO DA DOR

MATSUMOTO, C.M.¹; NONATO, A. C.²; PIO, D. A. M.³

1. Residente Multiprofissional em Saúde da Atenção Clínica e Cirúrgica da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)
2. Professora voluntária da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)
3. Docente da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

camila.matsumoto@unesp.br

INTRODUÇÃO: A dor desencadeia diversas consequências biopsicossociais. Nesse sentido, enfatizando a necessidade de avaliar, amenizar e eliminar a dor para garantir uma prestação dos serviços de saúde de qualidade, em 1995, a Sociedade Americana da Dor instituiu a dor como 5º sinal vital e reconhece que não deve ser negligenciada, pois o controle adequado não só reduz o sofrimento do paciente, mas impacta positivamente os resultados clínicos. Dado que a dor é uma ocorrência comum entre pacientes hospitalizados, muitas vezes subavaliada e inadequadamente tratada, sugere-se que há deficiências em seu manejo. **OBJETIVOS:** Analisar a percepção dos profissionais da saúde hospitalar em relação ao conceito de dor e as estratégias de manejo tanto do núcleo de atuação como das demais profissões, de modo a compreender a importância dada à integralidade do cuidado a partir da atuação multiprofissional. **MÉTODOS:** Exploratório em vertente qualitativa, orientada pela Teoria Fundamentada nos Dados, conduzido com os profissionais de saúde das enfermarias de um hospital do interior de São Paulo, sorteados dentro de cenários previamente selecionados, e a amostragem definida por saturação teórica. **RESULTADOS PARCIAIS:** Foram realizadas 7 entrevistas até o momento com profissionais de enfermagem, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia. A maioria dos profissionais caracteriza a dor em sua complexidade e multidimensionalidade, indicando seu caráter subjetivo uma das principais dificuldades para seu manejo. Quanto às estratégias de intervenção, houve maiores dificuldades em descrever as atribuições de profissionais de outras áreas. **CONCLUSÕES:** Apesar da relevância dada ao manejo da dor, a subjetividade em um contexto marcado pela técnica e objetividade representa um desafio. Visto que a abordagem multidisciplinar caracteriza-se como um dos princípios orientadores para a intervenção, poucos demonstram esse conhecimento, indicando o foco no cuidado uniprofissional. Entende-se que essa fragilidade deve ser ponto propulsor para a produção de novos conhecimentos acerca do tema, visando promover o avanço da integralidade do cuidado.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

158 - PERSPECTIVA DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM E DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS SOBRE MÉTODO ATIVO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

SOUZA, G.R.¹; SANTOS, I.F.²; CHIRELLI, M.Q.²

1. Residente do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)
2. Docente da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

gabirocha0917@gmail.com

INTRODUÇÃO: As metodologias ativas de ensino são baseadas na educação crítico reflexiva, centradas na participação efetiva do corpo discente na construção do processo de aprendizagem, tendo como proposta o protagonismo e autonomia dos estudantes, enquanto o docente tem o papel de mediar e orientar o processo de aprendizagem. Argumenta-se acerca das diferentes formas de educação na saúde, levando em conta as práticas acadêmicas, diretrizes pedagógicas e orientação curricular, visando a produção e sistematização de conhecimentos pertinentes à formação e ao desenvolvimento profissional, objetivando a atuação em saúde. **OBJETIVO:** Compreender os significados, sentimentos e as expectativas dos graduandos do quarto ano do curso de enfermagem e dos residentes dos programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) sobre o método ativo de ensino-aprendizagem na sua formação e atuação profissional. **MÉTODOS:** A pesquisa está sendo desenvolvida na Faculdade de Medicina de Marília, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, utilizando-se abordagem qualitativa. Compõem a população do estudo dez acadêmicos do quarto ano da graduação em enfermagem e onze residentes do segundo ano da RIMS, selecionados pelo critério de saturação. Realizada coleta de dados através de entrevistas semiestruturada com o auxílio de um instrumento norteador elaborado com perguntas abertas previamente determinadas. O tratamento dos dados está sendo desenvolvido pela análise de conteúdo na modalidade temática, realizada leitura intensa das entrevistas, elaborados os códigos, a síntese de cada código, construídos temas agrupando códigos conforme coerência de significados; na continuidade os temas serão revisados e definidos. **RESULTADOS ESPERADOS:** Por intermédio deste estudo espera-se compreender como as metodologias ativas influenciam no processo de formação e atuação dos graduandos do quarto ano do curso de enfermagem e dos residentes dos programas de RIMS.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

159 - PLANEJAMENTO PARA APOSENTADORIA DE TRABALHADORES TRANSGÊNERO: REVISÃO DE LITERATURA

HOKAMA, E.; SOUZA, M. O.; CARNEIRO, A. T. de A.; NASCIMENTO, D. B.; MORAES, F. H.; CUSTÓDIO, A.S.; NASCIMENTO, S. M.S.; LIMA, A. M. S.

Universidade São Judas

erica.hokama@gmail.com

INTRODUÇÃO: A questão da aposentadoria para indivíduos transgêneros no Brasil apresenta diversas complexidades, muitas delas relacionadas à marginalização social, à discriminação e preconceito no mercado laboral e aos obstáculos no acesso aos direitos previdenciários. Apesar das normas gerais de aposentadoria serem teoricamente equivalentes para todos, a realidade vivida por indivíduos transgêneros no Brasil torna esse processo consideravelmente mais desafiador e, frequentemente, inviável. **OBJETIVO.** Realizar uma revisão de literatura sobre o planejamento para aposentadoria de trabalhadores transgênero. **MÉTODO.** Foram pesquisadas as bases de dados Scielo, Bireme e Portal de Periódicos CAPES. Os descritores utilizados foram “aposentadoria” e “transgênero”, enquadrados em um período de 2019 a 2024. **RESULTADOS.** Foram identificados 6 artigos, dos quais 4 foram selecionados, pois abordavam os temas dos descritores. Os artigos apresentaram discussões sobre como as experiências discriminatórias sofridas por pessoas trans são profundamente enraizadas em estruturas sociais e culturais, culminando em desafios enfrentados por essa comunidade no mundo do trabalho e consequentemente na dificuldade no planejamento para aposentadoria. Tais resultados destacaram a falta do reconhecimento da transição e identidade de gênero como um agravante na complexidade dos direitos. Ressaltaram a importância criar espaços de reflexão sobre as demandas deste grupo populacional e propor mudanças nos critérios para aposentadoria. **CONCLUSÕES.** A aposentadoria de trabalhadores transgênero é uma questão complexa e requer uma abordagem mais ampla e inclusiva. A ausência de políticas públicas voltadas para pessoas trans evidencia a necessidade de uma maior atenção e iniciativas que garantam uma aposentadoria digna e justa no Brasil. Portanto, é importante proporcionar formas de planejamento para aposentadoria, que englobe saúde, finanças e um projeto de vida na maturidade para pessoas transgênero no Brasil.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

160 - POLIFARMÁCIA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UM ESTUDO DESCRITIVO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NO INTERIOR PAULISTA

De Oliveira, M. A.¹, Marin, M. J. S²

1.Discente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA

2.Docente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA

marcos.abelbeck72@gmail.com

INTRODUÇÃO: As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), são destinadas ao atendimento integral a idosos, dependentes ou não, sem condições familiares ou domiciliares para a sua permanência na comunidade de origem. Os idosos, especialmente os residentes em ILPI apresentam maior fragilidade e, com isso, são mais propensos à polifarmácia, ou seja, ao uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos. Esse uso representa um grande desafio visto que a polifarmácia está associada a um aumento significativo no risco de eventos adversos, como quedas, hospitalizações e mortalidade, especialmente quando há prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados (MPIs). Frente a este cenário, surge o questionamento de como tem sido o uso dos medicamentos pelos idosos institucionalizados? **OBJETIVO:** Analisar a quantidade de medicamentos usados pelos idosos que vivem em ILPIs. **MÉTODO:** Estudo quantitativo descritivo realizado em quatro ILPIs de um município do interior paulista, sendo uma de caráter privado e três públicas. Para a coleta de dados foi utilizado um formulário eletrônico GOOGLE FORMS onde foram levantadas a partir dos prontuários dos idosos os medicamentos utilizados. **RESULTADOS PARCIAIS:** Em relação aos medicamentos que os idosos institucionalizados usam diariamente a Instituição A 49 idosos usam de 5 ou mais medicamentos diariamente (64,5%) enquanto que 27 usam de 1 a 4 medicamentos diários (35,5%). Na Instituição B 21 idosos usam de 5 ou mais medicamentos diariamente (47,7%) enquanto que 23 idosos usam de 1 a 4 medicamentos diariamente (52,3%). Na Instituição C 35 idosos usam de 5 ou mais medicamentos diariamente (74,5%) enquanto que 12 idosos usam de 1 a 4 medicamentos diariamente (25,5%). Na instituição D 21 idosos usam de 5 ou mais medicamentos diariamente (91,3%) enquanto que 2 idosos usam de 1 a 4 medicamentos diariamente (8,7%). **CONCLUSÕES:** Em relação ao uso de medicamentos pelos idosos, segundo os dados coletados, em todas as Instituições se evidencia a prática da polifarmácia. Na Instituição D por exemplo, o uso de 5 ou mais medicamentos ultrapassa 90%.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

161 - PRODUTOS DE GLICAÇÃO AVANÇADA EM PESSOAS IDOSAS COM DOENÇAS CRÔNICAS QUE FREQUENTAM CENTRO DE CONVIVÊNCIA

CARVALHO, J.V.O.¹; LINO, M. H. S.²; BITENCOURT, G.G.³; ALVES, A. C. S. ⁴; CALABRO, M.⁵; RODRIGUES, A. T.⁶; LIMA, A.M. S.⁷

1. Aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Envelhecimentos da Universidade São Judas Tadeu; 2. Aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Envelhecimentos da Universidade São Judas Tadeu; 3. Aluna de iniciação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Envelhecimentos da Universidade São Judas Tadeu; 4. Mestre em Ciências do Envelhecimento pela Universidade São Judas Tadeu; 5. Aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Envelhecimentos da Universidade São Judas Tadeu; 6. Aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Envelhecimentos da Universidade São Judas Tadeu; 7. Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Envelhecimentos da Universidade São Judas Tadeu

prof.adrianalima@usjt.br

Introdução: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são um dos principais problemas de saúde pública em pessoas idosas. Os produtos de glicação avançada (AGE) podem acelerar o processo de envelhecimento e uma piora do prognóstico das DCNT. **Objetivos:** Caracterizar pessoas idosas que vivem com DCNT que frequentam um Centro de Convivência e correlacionar os AGE com a escolaridade e força de preensão palmar. **Métodos:** Estudo de campo quantitativo aprovado pelo CEP parecer 4.026.750 e CAAE 30592019.4.0000.0089. A amostra foi composta por 92 participantes com idade superior a 65 anos, portadores de pelo menos uma DCNT. Foram realizadas avaliações através do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), teste de força de preensão palmar (FPP), questionários sociodemográficos, cálculo do índice de massa corporal (IMC), avaliação do escore de consumo de AGE e a medida de autofluorescência da pele para avaliar o conteúdo de AGE. Foi realizada a correlação de *Spearman*. **Resultados:** 92 participantes tinham ao menos 1 DCNT idade 70 ± 6 anos, IMC $28,4 \pm 5,1$ Kg/m², MEEM $26 \pm 3,7$, escore de AGE $5,3 \pm 3$, autofluorescência $2,7 \pm 0,9$ U, FPP $22,3 \pm 7,4$ Kgf. 46% tinham uma DCNT, 37% duas e 16% três. Houve correlação negativa entre IMC e idade [$p=0,008$; $r=-0,291$]. Quanto maior a quantidade de medicamentos, menor a FPP [$p=0,077$; $r=-0,306$]. Correlação negativa entre FPP e idade [$p=0,077$; $r=-0,0295$]. **Considerações finais:** O déficit cognitivo parece estar associado ao envelhecimento e não às DCNT, o que sugere que a queda nas funções cognitivas pode ser uma consequência natural do processo de envelhecimento, independente da presença de doenças crônicas. Esse resultado reforça a importância de monitorar e apoiar o desempenho cognitivo em pessoas idosas, mesmo quando eles mantêm um controle razoável de suas condições crônicas. Ações de promoção à saúde são extremamente importantes para garantir um envelhecimento saudável.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

162 - PROFICIÊNCIA DE PESSOAS IDOSAS COMUNITÁRIAS SOBRE O USO DE SMARTPHONES

LINS, C.C.S.A.; MENDES, C.E.T.M.; NASCIMENTO, T.; BATISTA, R.L.S.; BORBA, A.K.O.T.; SILVA, V.L.; CORIOLANO, M.G.W.S.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

carla.santos@ufpe.br

INTRODUÇÃO: O uso de tecnologias no dia a dia tem sido cada vez mais frequente, e pessoas idosas tem vivenciado obstáculos ou dificuldades que impedem ou restringem a inclusão dos dispositivos tecnológicos em suas vidas cotidianas. **OBJETIVOS:** Avaliar a proficiência de pessoas idosas comunitárias sobre o uso de smartphones. **MÉTODOS:** Estudo seccional realizado de abril a novembro de 2023, desenvolvido no Programa Pró-idoso da Universidade Federal de Pernambuco e nos grupos de convivência de pessoas idosas no distrito sanitário 4 da Cidade de Recife PE. Aplicou-se como instrumentos de avaliação um questionário sociodemográfico, e a versão brasileira do questionário de proficiência em dispositivos móveis (MDPQ Brasil) que possui 46 questões dividido em 8 subescalas: noções básicas, comunicação, armazenamento de dados e arquivos, internet, calendário, entretenimento, privacidade e solução de problemas e gerenciamento de software. A pontuação é realizada por uma escala Likert de cinco pontos, variando de 08 a 40 sendo categorizados em: de 08 a 16 pontos baixa proficiência; acima de 16 até 24 pontos moderada proficiência; e acima de 24 a 40 pontos representa alta proficiência. Realizou-se a análise descritiva dos dados. **RESULTADOS:** Foram avaliadas 311 pessoas idosas com média de idade de 70 (± 6) anos, 86% eram do sexo feminino, com média de escolaridade de 11 (± 5) anos de estudo, e 43% recebiam de um a três salários-mínimos. A maioria das pessoas idosas da amostra (n=135, 43%) apresentou moderada proficiência, seguido de (n=126, 41%) com baixa proficiência no uso do telefone celular de acordo com o MDPQ – Brasil. **CONCLUSÃO:** Verificou-se que grande parte das pessoas idosas apresentaram uma proficiência de moderada a baixa para o uso dos smartphones, indicando que se faz necessário mais ações de ensino-aprendizagem no uso de aplicativos móveis buscando diminuir a infoexclusão.

Agradecimento*: FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Edital FACEPE No 14/2022 Inovação Inclusiva no Combate à Exclusão Digital em Pernambuco - INCLUI.PE DIGITAL.

163 - PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NO CAPS AD: RELATOS DA COMPREENSÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CUIDADO

BERNARDES, J.B.; PIO, D.A.M.; ANGELI, O.A.

Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA

juliabernardes1997@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) é o equipamento de referência da Rede de Atenção Psicossocial para populações com transtornos mentais graves e persistentes decorrentes do uso de álcool e/ou outras drogas, sustentado pela lógica do cuidado biopsicossocial, que valoriza a integralidade e a participação ativa do sujeito no tratamento. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta potente para a construção e execução do tratamento, alinhada com tal proposta de cuidado. **OBJETIVOS:** Pretende-se analisar a compreensão e operacionalização da equipe do CAPS AD em relação ao PTS, além dos desafios e potencialidades associados ao PTS nas práticas de cuidado. **MÉTODOS:** Pesquisa qualitativa, exploratória, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer nº 6.806.029), estruturada em duas etapas: realização de entrevistas semiestruturadas individuais e Oficina de Construção de Conhecimento com os profissionais da equipe que, no momento das entrevistas, atuam na gerência e/ou assistência deste CAPS AD por, pelo menos, três meses. Após a coleta de dados nas entrevistas e na Oficina, será aplicada a técnica da Análise de Conteúdo, na modalidade temática. **RESULTADOS:** A coleta de dados já contempla os resultados das entrevistas, realizadas com todos os profissionais que preencheram os critérios de inclusão, sendo oito da equipe fixa e dois da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde na área de Saúde Mental. Diversos recursos, como atendimentos grupais e individuais, são apontados como dispositivos de acolhimento. Os relatos caracterizaram o PTS como um momento de discussão de casos em equipe. Frequentemente, os profissionais realizam e planejam as reuniões de equipe. Um dos desafios na prática é a falta de recursos humanos na equipe multiprofissional do CAPS AD. **CONCLUSÕES:** Identificam-se lacunas na compreensão teórica do PTS e disparidades entre demandas e recursos disponíveis, que dificultam a participação ativa dos sujeitos no cuidado. A cooperação da equipe e as reuniões sistematizadas são potências para a construção do conhecimento sobre o uso efetivo do PTS.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

164 - RELACIONAMENTO SORODIFERENTE: PERCEPÇÃO DE ESTIGMAS SOCIAIS NO ENVELHECIMENTO DO PARCEIRO SORONEGATIVO

SARRALHEIRO, V.A.; SALLES, R.J.; LONGO, P.L.

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS

vitor.sarralheiro@gmail.com

INTRODUÇÃO O processo de envelhecimento do ser humano ocorre de forma heterogênea e inevitável trazendo consigo mudanças físicas, psicológicas e sociais. A infecção pelo HIV é marcada por uma série de desinformações onde há margem para o desenvolvimento de mitos, preconceitos e estigmas em relação à sociedade. Pessoas que não vivem com HIV e estão em um relacionamento são atingidos de forma indireta pelo processo de estigmatização causando um impacto negativo que perpassa a relação. **OBJETIVO** Analisar a percepção dos estigmas sociais vivenciados por homens gays que possuem um relacionamento sorodiferente durante processo de envelhecimento. **MÉTODOS** O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa USJT sob o número do parecer 5.397.685. Utilizou-se metodologia de base qualitativa de coorte transversal. Foram coletadas informações a partir de um questionário de caracterização dos participantes e depois realizada uma entrevista semiestruturada, sendo gravadas e transcritas. Participaram deste estudo 6 homens gays com idades de 20 a 50 anos. A análise dos conteúdos foi utilizado o método de análise de Bardin. **RESULTADOS** Os parceiros que não vivem com HIV vivenciam sentimentos como confusão e inospitalidade, pois por não possuírem tal diagnóstico sentem-se desamparados e despreparados para o enfrentamento dos estigmas gerados pelo HIV. Além disso, foi possível observar que há diferença na percepção dos estigmas presentes nas diferentes fases do processo de envelhecimento, pois pessoas mais velhas possuem mais dificuldade no enfrentamento social por conta de crenças enraizadas sobre o HIV. **CONCLUSÃO** A presença de estigmas sociais exerce um impacto negativo na qualidade de vida independentemente do processo de envelhecimento, mas a presença da idade avançada influencia na forma com que os indivíduos lidam com tal situação. As percepções errôneas da sociedade contribuem para que essas pessoas que não vivem com HIV, mas se relacionam com uma sofram por falta de informações assertivas.

165 - RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A COLETA DE DADOS REFERENTE À ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE

MARCHIORI, R. A. R.; REZENDE, K. T. A.; CHIRELLI, M. Q.

Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA

marchiori.rosane@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Serviço Social surge no Brasil sob influência da Igreja Católica e sua relação com o Estado. Como consequência do laicato, houve necessidade de criar ações mais organizadas. Posteriormente, o caráter missionário, de caridade e apostolado se torna especializado, profissional e institucionalizado. Ao longo do tempo, essa transição revela uma diversidade e indefinição da atuação desse profissional. **OBJETIVOS:** Apresentar um relato de experiência sobre a coleta de dados da investigação cuja finalidade é analisar a atuação do assistente social da saúde no cenário da atenção primária e secundária em Marília na perspectiva desse profissional e dos gestores e elaborar estratégias de intervenção para a atuação do assistente social na área da saúde, no cenário da atenção primária e secundária para a promoção do cuidado na perspectiva da integralidade, por meio do produto técnico. **MÉTODO:** Realizou-se investigação com abordagem qualitativa. Participaram dessa, dezesseis assistentes sociais; seis profissionais que compõem a equipe técnica e três gestores. A coleta de dados se deu por meio de uma entrevista semiestruturada com os assistentes sociais e gestores e grupo focal com os demais. A interpretação dos dados será por meio da Análise de Conteúdo, Modalidade Temática. O projeto de pesquisa submeteu-se ao Comitê de ética em Pesquisa (CEP). **RESULTADOS:** A coleta de dados foi significativa, pois proporcionou reflexão sobre a prática profissional; agregou conhecimento sobre as vivências das outras categorias profissionais e do próprio assistente social a respeito deste; foram trabalhadas a flexibilidade, empatia e paciência, além da colaboração mútua e crucial entre pesquisador e entrevistados. **CONCLUSÕES:** Ainda em desenvolvimento, porém, de forma preliminar, a imersão nos dados indica que um planejamento eficaz, uma comunicação clara e uma boa integração entre o entrevistador e o participante são fundamentais.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

166 - REPERCUSSÕES DO PROJETO ASAS DO FUTURO PARA A APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO MOTOR DOS ESTUDANTES NA PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES

FATTINNANZI, E. E. S.¹; MORAES, M. A. A.²; HIGA, E. F. R.²

1. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde – Mestrado Profissional da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

2. Docentes da FAMEMA

eduardofattinnanzi@gmail.com

INTRODUÇÃO: A educação física exerce um papel importante na aprendizagem e no desenvolvimento motor dos escolares, por meio de jogos pedagógicos, atividades esportivas e exercício físico. Durante a pandemia de *Corona Virus Disease* (COVID 19), muitos estudantes foram privados de oportunidades educacionais. Assim, as unidades escolares, no contexto pandêmico, buscaram minimizar os prejuízos e recuperar essa lacuna temporal com estratégias de aprendizagem, sendo os projetos esportivos educacionais amplamente adotados. **OBJETIVO:** Analisar as repercussões do Projeto Esportivo Educacional Asas do Futuro sobre a aprendizagem e o desenvolvimento motor dos estudantes, na percepção dos professores. **MÉTODOS:** A pesquisa será desenvolvida em duas etapas: revisão integrativa de literatura (RIL) e pesquisa de campo com abordagem observacional, transversal e qualitativa. A RIL será realizada em seis etapas, conforme preconiza a literatura: 1) Identificação do problema e pergunta de pesquisa; 2) Busca na literatura; 3) Seleção de estudos; 4) Avaliação crítica dos estudos; 5) Síntese dos dados; e 6) Apresentação dos resultados. A Pesquisa de Campo ocorrerá em uma unidade escolar do interior do Estado de São Paulo, que possui um projeto esportivo educacional em andamento. A amostragem será composta por todos professores da unidade escolar. Os dados serão obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas e interpretados pela Técnica de Análise de Conteúdo na modalidade Temática, constituída por três etapas: 1) Pré-análise; 2) Exploração do material; e 3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A pesquisa será autorizada pela instituição coparticipante e avaliada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes da coleta de dados. **RESULTADOS ESPERADOS:** Explorar as repercussões do Projeto Esportivo Educacional Asas do Futuro para a aprendizagem e o desenvolvimento motor das crianças, na percepção dos professores da instituição de ensino.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

167 - REQUALIFICAÇÃO DE DEMANDA DE PSICOLOGIA EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA

PONTIN, I.A.A.¹; CRUZ, B.R.S.²; TSEN, M.F.S.³

1. Psicóloga, Residência Multiprofissional - Programa de Saúde Coletiva da FAMEMA
2. Psicóloga na Equipe Multiprofissional de APS (eMulti) no Município de Marília
3. Médica de Unidade de Saúde da Família do Município de Marília

iaapbr@gmail.com

INTRODUÇÃO: A demanda de saúde mental tem crescido, levando ao aumento no encaminhamento de usuários para o profissional de psicologia que atua na Atenção Primária à Saúde (APS). No entanto, as Unidades de Saúde da Família (USF) não contam em suas equipes mínimas de referência com profissional de psicologia, tendo como apoio a atuação de profissionais que pertencem à Equipe Multiprofissional. Esta situação, somada à falta de um processo instituído de gerenciamento da lista de espera, gera um acúmulo de encaminhamentos para esta categoria. Tal acúmulo contribui para dificultar o cuidado integral do paciente. **OBJETIVOS:** Avaliar criticamente e propor melhorias ao processo de gerenciamento da fila de espera para ações de atenção psicológica, em uma unidade de saúde da família do município de Marília (SP). **MÉTODOS:** trata-se de uma pesquisa-ação, envolvendo as etapas: 1 - levantamento dos encaminhamentos físicos e na demanda SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo); 2 - estudo do prontuário eletrônico; 3 - contato telefônico; 4 - avaliação da demanda e proposta de forma de cuidado; 5 - reorganização da fila de espera da unidade; 6 - proposta de alteração de processos de trabalho. **RESULTADOS:** o número de pacientes em fila de espera passou de 192 para 22; sendo suas queixas classificadas como: 46% depressão, 18% ansiedade, 18% transtorno do neurodesenvolvimento e 18% não especificado. Foram identificadas possibilidades de melhoria em diversas etapas, como: elaboração do encaminhamento; fluxos internos de documentos da USF; listas de pacientes com necessidades de cuidados em saúde mental; gestão do conhecimento interno sobre o processo de trabalho; comunicação da equipe da USF e e-multi; comunicação da USF com grupo técnico de saúde mental; ampliação das propostas de cuidado em saúde mental para além de atendimentos de psicologia. **CONCLUSÕES:** Nota-se a importância de estimular outras medidas que propiciem cuidado integral do paciente; melhorar a elaboração do encaminhamento com informações importantes para tomada de decisão; aprimorar a gestão de dados e processos de trabalho, visando uso racional de recursos, tendo sempre como foco a garantia da integralidade, universalidade e equidade.

168 - RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE ENTRE OS ENTES FEDERADOS: PROPOSTA DE SOLUÇÃO SISTEMÁTICA A PARTIR DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

SEBASTIANI, R. T.; TAVANTE, R. F.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR

rafael.teixeira.sebastiani@gmail.com / rafaelts@usp.br

INTRODUÇÃO: A judicialização da saúde no Brasil tem gerado um aumento expressivo de demandas judiciais, impondo obrigações aos entes federados, com impacto financeiro significativo. As ações judiciais, ao exigirem o fornecimento de insumos e serviços de saúde, frequentemente resultam em decisões que desafiam as políticas públicas e acarretam multas, agravando os custos para o governo. A ausência de um sistema eficiente de ressarcimento agrava a situação, tornando a repartição de competências entre os entes federados e o Ministério da Saúde fundamental para mitigar esses impactos. **OBJETIVOS:** O estudo visa avaliar a repartição de competências do Ministério da Saúde e seu impacto na distribuição de responsabilidades entre os entes federados, a partir de decisões judiciais sobre a judicialização da saúde emitidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) entre 2021 e 2025, identificando fatores que dificultam o ressarcimento dos custos dessas ações, de modo a propor uma solução sistemática para o ressarcimento dos custos, considerando a repartição de competências. **MÉTODOS:** A pesquisa será qualitativa, com análise documental de decisões judiciais e normas do Ministério da Saúde. Em três etapas, serão coletados dados sobre decisões do TJSP e TRF-3 que envolvam a judicialização da saúde; analisados os padrões e implicações financeiras dessas decisões; e desenvolvida uma proposta de solução integrada para o ressarcimento, alinhada à repartição de competências. **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que o estudo contribua para a harmonização entre o acesso à justiça e a sustentabilidade financeira da saúde pública, com a criação de mecanismos administrativos e judiciais para ressarcimento automático e eficiente. A pesquisa pretende influenciar o Judiciário para explicitar a repartição de responsabilidades financeiras nas sentenças, promovendo uma gestão pública mais eficiente e justa.

Agradecimento*: Agradecimentos especiais ao programa de mestrado profissional Formação Interdisciplinar em Saúde (MP-FIS) da Universidade de São Paulo (USP).

169 - RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS IDOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

MORAES, E.D.; BASTOS, M.F.

Programa de Pós-graduação *Stricto sensu* em Ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas Tadeu, São Paulo/SP, Brasil

meio.br.edson@gmail.com

INTRODUÇÃO: O aumento da expectativa de vida pode impactar a forma como uma pessoa lidará financeiramente com suas necessidades por um longo período, o que torna crucial entender a relação entre a consciência financeira ao longo da vida e a qualidade de vida na velhice. **OBJETIVOS:** Verificar se a existência ou não de um planejamento financeiro prévio afeta a qualidade de vida de pessoas acima de 60 anos. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo transversal quantitativo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas (parecer nº 6.773.583). Pessoas acima de 60 anos do Estado de São Paulo foram convidadas por mídias sociais a participar do estudo e após leitura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido responderam a um questionário estruturado com perguntas relacionadas à caracterização sociodemográficas, econômicas, culturais. Além disso, os participantes responderam a um questionário sobre consciência financeira e a versão resumida do Questionário de Qualidade (WHOQoL-bref). **RESULTADOS:** Foram incluídos no presente estudo 246 pessoas com idade $68,5 \pm 6,2$ anos, com maioria residente na capital paulista (73,6%), brancos (80,9%), casados (61,4%). Houve equilíbrio quanto ao número de mulheres (50,4%) e homens (49,6%) e elevada proporção de pessoas com ensino superior (41,8%) e pós-graduação (42,7%) quando comparado aos níveis básicos de ensino. Além disso, a maioria dos participantes autodeclarou ter renda acima de 4 salários-mínimos (73,6%). Os escores para todos os domínios do WHOQoL-bref indicaram boa qualidade de vida dos participantes. No entanto, devido a alta variação, a qualidade de vida foi comparada entre os participantes que se preparam financeiramente para a velhice ($n=151$) e aqueles que não ($n=85$), revelando menores escores para domínio físico, psicológico, das relações sociais e ambiental para os participantes que declararam não terem se preparado financeiramente para a velhice ($p<0,05$). **CONCLUSÕES:** Resultados preliminares para a população estudada mostraram que o preparo financeiro prévio pode impactar a qualidade de vida na velhice.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

170 - REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA E A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE A ALTA HOSPITALAR RESPONSÁVEL

SOARES, Q-H.¹; MORAES, M. A. A.²; HIGA, E. F. R.²

1.Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

2.Docentes da FAMEMA

hapuquesoares@gmail.com

INTRODUÇÃO: A alta hospitalar responsável é essencial para garantir a continuidade do cuidado integral na Rede de Atenção à Saúde (RAS), especialmente em casos de altas complexas, promovendo desospitalização segura. O enfermeiro desempenha um papel fundamental nesse processo, ao conectar o paciente e sua família à RAS, capacitar cuidadores e preparar o ambiente domiciliar, visando a continuidade e integralidade do cuidado. Nesse contexto a questão norteadora para esta pesquisa foi: Qual é a representação social dos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde sobre a Alta Hospitalar Responsável e descrito na literatura? **OBJETIVO:** Analisar o que a literatura descreve e a representação social dos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde sobre a Alta Hospitalar Responsável. **MÉTODOS:** Revisão Integrativa da Literatura, constituída por seis etapas: Elaboração da questão de pesquisa; Busca na literatura e critérios de inclusão e exclusão; Classificação e extração de dados; Interpretação dos resultados; Exposição de resultados. Pesquisa de campo fundamentada na Teoria das Representações Sociais. Desenvolvida em um município do Oeste Paulista, com 15 enfermeiros da Atenção Primária à Saúde, por meio de entrevista semiestruturada via *Google Meeting*. Os dados estão sendo analisados pela Técnica de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo, que é estruturado pelas seguintes figuras metodológicas: Expressão-chave, Ideia Central, Ancoragem e Discurso do Sujeito Coletivo. **RESULTADOS PARCIAIS:** Revisão Integrativa - foram observadas as seguintes categorias: 1. Continuidade dos cuidados, 2. Desafios do cuidado pós alta e 3. Cuidado centrado no paciente e na Família. Na pesquisa de campo - as primeiras leituras dos dados indicam convergência com os achados da RIL. Os resultados estão sendo analisados pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. **CONCLUSÃO:** em elaboração, no entanto, *a priori*, a imersão nos dados indica a importância do planejamento eficaz, comunicação clara e integração entre a equipe multiprofissional, família e recursos comunitários.

Agradecimento: O presente trabalho tem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001.

171 - SATISFAÇÃO DE GESTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) FRENTE AO USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO PARA QUALIFICAÇÃO SOBRE O USO DA AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL

GOMES, G.A.O.¹; ANSAI, J.H.¹; MILAN-MATTOS, J.C.¹; GRAMANI-SAY, K.¹; COSTA GUARISCO, L.P.¹; VAROTO, V.A.G.¹; VASILCEAC, F.A.¹; VASSIMON-BARROSO, V.¹; SCHWENGER, L.L.¹; SILVA, F.V.L.¹; PORCATTI, L.R.¹; ROMÃO, M.B.¹; PANTONI, C.B.F.¹

1.Universidade Federal de São Carlos

grace@ufscar.br

INTRODUÇÃO: As metodologias ativas são estratégias de ensino que colocam o educando no centro do processo de aprendizagem, tornando-o protagonista, sendo úteis para o aprimoramento de conhecimento de profissionais e permitindo ações educativas voltadas à promoção, prevenção e tratamento da saúde. **OBJETIVOS:** Avaliar o grau de satisfação dos gestores da Atenção Primária à Saúde (APS) com relação às metodologias utilizadas nas Oficinas Presenciais (OP) do Projeto DGEROBrasil. **MÉTODOS:** O Projeto DGEROBrasil, desenvolvido pelo Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa na Atenção Primária em Saúde do Ministério da Saúde teve, como objetivo, sensibilizar os gestores da APS para implementação da Avaliação Multidimensional da pessoa idosa (AMD). Uma das etapas do projeto foram as oficinas presenciais (OP), que aconteceram nas cinco regiões brasileiras. Durante as OPs, foram utilizadas metodologias ativas para apresentar aos gestores uma formação conceitual sobre a AMD, com a abordagem de possíveis desfechos adversos à saúde e que podem auxiliar no rastreamento e manejo de condições de saúde da população idosa. Para avaliar o grau de satisfação dos gestores sobre as informações e metodologias utilizadas, foi aplicado um formulário eletrônico imediatamente após o término do encontro com questões do tipo Likert, graduadas entre 1 e 5 (sendo 1 insatisfatório e 5 muito satisfatório). **RESULTADOS:** Em relação às respostas de satisfação, 3.136 gestores responderam ao formulário pós-OP. Os resultados apontaram que 11% dos gestores indicaram que a metodologia utilizada foi “satisfatória” e 88% a classificaram como “muito satisfatória”. Não houve respostas classificadas como “insatisfatória”. **CONCLUSÕES:** A metodologia descrita se mostrou muito satisfatória e adequada para qualificações oferecidas para gestores de saúde e pode ser uma ferramenta valiosa em contextos em que se deseja aproximar a prática da teoria proposta.

Agradecimento*: * COPID/MS

172 - SEXUALIDADE NA MULHER IDOSA: DEFINIÇÕES, PARADIGMAS E TABUS

FARIA, G.P.; ESCOBAR, N.B.F.

Universidade São Judas Tadeu

giovannaenfermagem@gmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento envolve transformações físicas, psicológicas e sociais, afetando várias dimensões da vida, incluindo a sexualidade. Sabe-se que as mulheres constituem a maior parcela da população idosa, vivendo em média oito anos a mais que os homens. As mudanças do envelhecer são acompanhadas por estigmas, como a visão restrita da sexualidade ao ato sexual, ignorando aspectos emocionais e relacionais, o que colabora em um entendimento cultural de que, após a menopausa, a mulher não deve mais exercer sua sexualidade. **OBJETIVO:** Compreender a sexualidade da mulher idosa, destacando definições, os paradigmas e tabus associados. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura qualitativa, caracterizada como levantamento e análise de materiais relacionados ao tema. Foram utilizados os descritores: sexualidade, saúde da mulher e envelhecimento para buscar em bases de dados nacionais como BVS e SCIELO, resultando na seleção de 11 artigos dos últimos 10 anos. Três artigos foram excluídos por tratarem de temas como HIV e envelhecimento masculino. **RESULTADOS:** A sexualidade no envelhecimento vai além do ato sexual, incluindo sentimentos como afeto, respeito, autoestima, e prazer. No entanto, persiste o estigma de que as mulheres idosas não devem expressar sua sexualidade, o que as coloca em uma posição marginalizada. Mesmo havendo queda nos níveis hormonais no envelhecimento, o interesse sexual não é eliminado, mas pode se manifestar de formas dissemelhantes, como por meio de afetos e autocuidado. **CONCLUSÕES:** Se faz evidente que enfrentam desafios específicos, como desigualdades de gênero e preconceitos que reprimem sua sexualidade. É necessário repensar a sexualidade da mulher idosa como um fenômeno multifacetado, que inclui não apenas o ato sexual, mas também outras expressões de intimidade e bem-estar, promovendo autoconhecimento e autocuidado.

173 - UMA PERSPECTIVA RACIAL DO ENVELHECIMENTO

LOPES, B. S. F.; TORRES, Q. B.; MARQUES, B. G.; LIMA, A. M.S.; MONTIEL, J. M.

UNIVERSIDADE DE SÃO JUDAS TADEU

PSICOLOGOBRENNER@GMAIL.COM

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo ininterrupto dos aspectos biopsicossociais, podendo ser definida por uma ideia preconcebida e preconceituosa, e que a pessoa idosa se torna incapaz e improdutivo. Entretanto, é importante salientar que as desigualdades raciais se tornam um elemento que reforça as vulnerabilidades e são pontos que devem ser levados em consideração. Sobre as desigualdades raciais é importante abordar a interseccionalidade que surge a partir das lutas das mulheres negras que não se reconheciam nas lutas feministas eurocentristas. A interseccionalidade é um tema que vai englobar questões raciais, porém vai além, conectando gênero, classe social. Falar de interseccionalidade é falar também das lutas anticoloniais e de dominação do modelo de pensar eurocentrista. Com isto é importante relacionar o envelhecimento com a interseccionalidade para verificar como ela interfere no processo de envelhecimento. **OBJETIVO:** Relacionar como a interseccionalidade interfere no processo de envelhecimento. **MÉTODO:** Foi realizada uma revisão literária integrativa, no qual analisou artigos publicados nos últimos 6 anos em revistas indexadas na *Scielo*, sendo empregados os seguintes descritores: interseccionalidade e idoso; racial e idoso; determinantes sociais e idoso. Foi feita uma análise de produção científica desses artigos. **RESULTADOS:** Ao todo foram encontrados 9 artigos, sendo 3 artigos de cada descritor, destes 2 artigos se repetem e um foi retirado por acreditar estar fora do tema, com isto restou se 7 artigos. Através das leituras dos artigos foi realizada a análise de conteúdo dos textos. As palavras com mais destaque são: saúde, idoso, social, mulher, raça, velhice, preto e negro. São palavras que por sua vez expressam essa visão da interseccionalidade na sociedade. **CONCLUSÃO:** Nos artigos foi possível perceber a dificuldade da construção e análise de dados, e a divergência de resultados. A partir dessa pesquisa percebe-se que é um tema com pouco material científico e com algumas divergências, com isto é importante a produção de mais pesquisas sobre o tema.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

174 - VALIDAÇÃO DA ESCALA PARA AVALIAÇÃO DA AUTOPERCEPÇÃO DO ENVELHECIMENTO

ESPOSITO, S.C.¹; MONTIEL, J.M.²; BASTOS, M.F.²

1. Curso de Graduação em Psicologia da Universidade São Judas Tadeu campus Unimonte
2. Programa de Pós-graduação *Stricto sensu* em Ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas Tadeu (USJT)

sandra.esposito@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é uma das maiores conquistas mundiais e tem suscitado reflexões sobre como será compreendido tanto pela sociedade atual, quanto pelo próprio indivíduo que envelhece, fomentando assim, a necessidade de se ampliar o conhecimento sobre essa complexa temática. **OBJETIVOS:** Verificar as evidências de validade de constructo da escala para avaliação da autopercepção do envelhecimento e redigir a versão final do instrumento. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo quantitativo, com característica descritiva-exploratória, que contemplará a aplicação da versão-piloto da escala em público-alvo, composto por participantes com idade 40+, bem como, as devidas análises estatísticas multifatoriais dos dados coletados para se aferir a validade do instrumento. **RESULTADOS ESPERADOS:** Validar a escala para avaliação da autopercepção do envelhecimento, obtendo-se, com isso, a versão final do instrumento, que poderá agregar conhecimento acerca de processos subjacentes ao envelhecimento percebido e apoiar ações preventivas destinadas a promover o envelhecimento bem-sucedido.

Agradecimento*: “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

REALIZAÇÃO



FAMEMA



REPRINTE